

Invertébrés Armoricaains, les Cahiers du GRETIA

Directeur de publication :
Olivier Durand

Rédacteur en chef :
Jean-Paul Quinette

Relecture de ce numéro :
Jean-Paul Quinette

Mise en page :
Sylvain Barbier et Emmanuel Jacob

Invertébrés Armoricaains est une revue éditée par le Groupe d'étude des invertébrés armoricaains (GRETIA), association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, créée le 22 mars 1996.

Les buts de l'association sont :

- de regrouper les personnes intéressées par les invertébrés et de développer les relations entre elles ;
- d'assurer la formation de ses membres, de faciliter leur accès à l'information et de contribuer à l'initiation et à la sensibilisation d'un public plus large ;
- de promouvoir et développer des études sur les invertébrés, notamment sous leurs aspects écologiques, et leur application à la préservation de la biodiversité et à la gestion de l'espace ;
- de rassembler et de favoriser la diffusion des informations sur les invertébrés par tous les moyens médiatiques existants ;
- de promouvoir la conservation des espèces et des habitats ;
- de représenter le groupe auprès des autres associations et des instances administratives.

Le GRETIA publie un bulletin trimestriel de liaison et d'information, le Bulletin du GRETIA, rassemblant de courtes notes, des informations liées à la vie de l'association (comptes rendus de stages et de sorties, résumés d'études) et aux invertébrés armoricaains en général (publication d'ouvrages ou d'articles, sites internet, activités associatives...). Deux Assemblées générales annuelles, des stages, pour débutants et confirmés, et des sorties privilégient la rencontre et l'échange de savoirs et de savoir-faire. Son site internet diffuse des informations vers un large public.

L'association, au travers de son équipe salariée et de ses bénévoles, réalise des travaux d'acquisition de connaissances sur la faune des invertébrés du Massif armoricain et gère une base de données.

Siège social :

Bâtiment 25, Université de Rennes 1
35042 Rennes cedex
<http://www.gretia.org/>
<https://www.facebook.com/assogretia>

Pour commande un ou des numéros de la revue :
secretariat@gretia.org / Tél. : 02.23.23.51.14

Si vous désirez citer cet ouvrage nous vous recommandons ce référencement bibliographique :

LECHAPT, J.-P., 2018. Curculionoidea (Insecta, Coleoptera) de la collection Ernest Hervé (1836-1914) des collections du musée de zoologie de Beaulieu (Université de Rennes1). *Invertébrés armoricaains, les Cahiers du GRETIA*, **18** : 1-76.

Conception graphique de la couverture : Stéphanie Mahélin / www.stephaniemahelin.com

Illustration de couverture : *Otiorhynchus sulcatus*, photographie Gaël LECHAPT



Curculionoidea (Insecta, Coleoptera) de la collection Ernest Hervé (1836-1914) des collections du Musée de zoologie de Beaulieu (Université de Rennes1)

Jean-Paul LECHAPT¹

Mots-clés – Curculionoidea, inventaires, collection

Résumé – L'auteur dresse l'inventaire et révisé la collection de Coléoptères Curculionidae de Ernest Hervé, déposée au Musée de Zoologie de la Faculté des Sciences de Rennes-Beaulieu (Ille-et-Vilaine).

Abstract – The author inventories and revises Ernest Hervé's collection of Coleoptera Curculionidae, deposited at the Zoological Museum of the Rennes-Beaulieu Faculty of Sciences (Ille-et-Vilaine).

Introduction

Ernest Hervé (1836-1914), notaire à Morlaix, s'investit dans l'entomologie et contribua à la création de la Société d'Etudes Scientifiques du Finistère où il assura de nombreuses années le secrétariat. S'il fut un coléoptériste, les Curculionoidea prirent une part importante dans ses récoltes au point où sa publication, le *Catalogue des Coléoptères du Finistère* édité en 1892 reste la seule référence historique jusqu'à nos jours pour ce groupe sur l'ensemble de la Bretagne.

Le legs de « sa belle collection entomologique, admirablement classée et en excellent état, à la Station entomologique de l'Université de Rennes »* date du 24 décembre 1913, l'inventaire du Musée de zoologie de l'Université de Rennes 1 précisant : collection de coléoptères de M. Hervé et deux meubles la contenant.

Si Ernest Hervé n'a jamais quitté son Finistère natal, d'où provient l'essentiel de sa collection, il reçut cependant de nombreux spécimens d'Europe, de Russie, du Liban, d'Algérie de quelques correspondants dont le plus fidèle fut l'Alsacien Édouard Muhlenbeck. Cette collection que nous avons inventoriée regroupe ainsi 1 254 taxons dont la répartition est la suivante :

- 60% des spécimens soit 739 proviennent de France et parmi ceux-ci, 47% du Finistère,
- 28% des spécimens, soit 352 viennent d'autres pays européens ou ne font pas partie de la faune de France,
- enfin 12 %, soit 159 espèces ont été récoltées en dehors de l'Europe.

Les spécimens de France ont été réexposés dans de nouvelles boîtes de collection et mis à disposition, au sein de notre laboratoire, afin de servir de boîtes de référence et d'approche pédagogique de ce groupe de coléoptères. Le reste de la collection est également accessible à tout coléoptériste qui en fait la demande. C'est à la fois le but de ce catalogue de faire connaître la richesse des collections détenues dans ce musée de zoologie et de permettre à tous d'accéder à l'observation et à la

comparaison de spécimens qui représentent en outre une page d'histoire locale ou plus lointaine de références historiques.

En ce qui concerne cet ouvrage, les désignations taxonomiques utilisées suivent celles du Catalogue des Coléoptères de France (Tronquet, 2014) et pour chaque espèce, nous avons indiqué :

- le nombre d'individus,
- le lieu de récolte lorsqu'il était indiqué en conservant le nom de l'époque (fin du XIX^e siècle). Si besoin était, un nom actuel a été ajouté.
- le numéro donné par E. Hervé dans sa collection (chaque numéro est associé aux exemplaires précédemment cités pour chaque espèce).
- la répartition actuelle de l'espèce en se référant aux données fournies par Fauna Europaea (<http://www.fauna-eu.org>).

Enfin, en hommage au regretté Rémy Lemagnen ont été insérées quelques-unes de ses photos qu'il m'avait autorisé à utiliser.

Enfin, cet inventaire n'aurait pu se réaliser sans l'aide de Gaëlle Richard, assistante des collections de zoologie et membre de la Commission de culture scientifique et technique de l'Université de Rennes 1, qui m'a permis l'accès à toutes les collections du Musée de Zoologie. Je remercie également Gérard Tiberghien, grand spécialiste des Coléoptères et des collections bretonnes, qui m'a encouragé à publier ce travail qui avait débuté en 2009.

* *Miscellanea entomologica*, n°1, Vol XXIII, juin 1915.



RHYNCHITIDAE

Rhynchitinae

Auletini

***Auletes tubicen* Schoenherr, 1826**

5 ex., localité non précisée (N°8877).
France méditerranéenne, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Turquie.

***Auletobius (Auletobius) sanguisorbae* (Schrank, 1798)**

2 ex., localité non précisée (N°3962).
Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Slovénie, Russie, Turquie.

***Aletinus maculipennis* (Jacquelin du Val, 1854)**

1 ex., Biskra, Algérie (N°8552).
Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Eomesauletes politus* (Lepelletier & Serville, 1825)**

1 ex., Corse (N°5498) ; 4 ex., Corse, sous le nom d'*ilis* (N°1855).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie, Russie.

***Mesoletobius pubescens* (Kiesenwetter, 1851)**

6 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex., Toulon, Var (83) (N°4566) ; 1 ex., Collioure, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *cisticola* (N°8552).
Portugal, Espagne, France, Italie, Sardaigne, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce.

Byctiscini

***Byctiscus betulae* (Linnaeus, 1758)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29), mâles et femelles, (N°516).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Byctiscus populi* (Linnaeus, 1758)**

1 ex., Paris, Seine (75).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Byctiscus rugosus* (Gebler, 1830)**

1 ex., Sibérie, Russie (N°9664).
Est de la Russie.

Deporaini

***Caenorhinus mannerheimii* (Hummel, 1823)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pennelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1891 (N°9059).
Europe moyenne, Russie.

***Chonostropheus seminiger* (Reitter, 1880)**

1 ex., Caucase, Russie.

France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Russie, Turquie.

***Chonostropheus tristis* (Fabricius, 1794)**

4 ex., Prague, Tchéquie (N°5608).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Deporaus betulae* (Linnaeus, 1758)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pennelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) (N°1500).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Rhynchitini

***Involvulus (Involvulus) cupreus* (Linnaeus, 1758)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2168).
Europe continentale moyenne et centrale, Scandinavie, Russie.

***Involvulus (Teretriorhynchites) caeruleus caeruleus* (De Geer, 1775)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *conicus* ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Troyes, Aube (10) ; 1 ex., Hongrie (N°4425).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Involvulus (Teretriorhynchites) pubescens* (Fabricius, 1775)**

5 ex., Troyes, Aube (10) sous le nom de *parallinus* ; 1 ex., Tyrol, Autriche (N°5139).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Lasiiorhynchites (Coccygorhynchites) sericeus* (Herbst, 1797)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) (N°3297).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Lasiiorhynchites (Lasiiorhynchites) cavifrons* (Gyllenhal, 1833)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *pubescens* ; 1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) (N°1630).
Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bulgarie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Lasiiorhynchites (Nelasiiorhynchites) olivaceus* (Gyllenhal, 1833)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pennelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1890 (N°6524).
Europe moyenne.

***Lasiiorhynchites (Nelasiiorhynchites) praeustus* (Boheman, 1845)**

1 ex., Grèce (N°7041).
France, Italie, Sicile, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Lasiorhynchites (Stenorhynchites) coeruleocephalus* (Schaller, 1783)**

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2169).
Espagne, France, Allemagne, Suisse, Italie, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie, Ukraine.

***Mecorhis (Mecorhis) ungarica* (Herbst, 1784)**

4 ex., Hanovre, Allemagne ; 1 ex., Dalmatie, Croatie
(N°961).
Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Croatie,
Bosnie, Bulgarie, Grèce, Macédoine, Turquie.

***Mecorhis (Pseudomecorhis) aethiops* (Bach, 1854)**

4 ex., Styrie, Autriche (N°4143).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Neocoenorhinus (Neocoenorhinidius) interpunctatus* (Stephens, 1831)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*alliariae* ;
1 ex. Meudon, Hauts-de-Seine (92) (N°6593).
Une bonne partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Neocoenorhinus (Neocoenorhinidius) pauxillus* (Germar, 1824)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-
Rhin (67) (N°2246).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Neocoenorhinus (Neocoenorhinus) germanicus* (Herbst, 1797)**

1 ex., Concarneau, Finistère (29) 1883 ; 4 ex., Morlaix,
Finistère (29) ; 1 ex., Kerlaudy, Plouéan, Finistère (29)
1885 (N°2556).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Neocoenorhinus (Schoenitemnus) minutus* (Marsham, 1802)**

(= *Curculio aeneovirens* Marsham, 1802)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom
d'*aeneovirens* ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous
le nom d'*aeneovirens* (N°2171).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Rhodocyrthus cribripennis* (Desbrochers, 1869)**

3 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Dalmatie, Croatie
(N°6523).
Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce,
Turquie, Russie.

***Rhynchites (Epirhynchites) auratus* (Scopoli, 1763)**

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67), mâles et femelles ;
2 ex., Bonifacio, Corse (N°2167).
Espagne, France, Corse, Suisse, Italie, Sardaigne,
Sicile, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie, Croatie, Bosnie, Roumanie, Bulgarie,
Macédoine, Grèce, Turquie, Russie.

***Rhynchites (Epirhynchites) giganteus* Krynicki, 1832**

2 ex., Dalmatie, Croatie sous le nom de *versicolor*
(N°7434).

France, Italie, Sicile, Autriche, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce,
Ukraine, Russie, Turquie.



Rhynchites giganteus (© RL)

***Rhynchites (Rhynchites) bacchus* (Linnaeus, 1758)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°514).
Espagne, France, Italie, Sicile, Allemagne, Suisse,
Autriche, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Roumanie, Bulgarie, Turquie, Russie.

***Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 3 ex. Barcelone,
Espagne (N°575) ; 2 ex., Constantinople (Istanbul),
Turquie sous le nom de *ruber* (N°5895).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Temnocerus coeruleus* (Fabricius, 1798)
(= *Rhynchites tomentosus* Gyllenhal, 1839)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
tomentosus ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous
le nom de *tomentosus* (N°9403).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Temnocerus nanus* (Paykull, 1792)**

9 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Térrenez,
Finistère (29) 1883 (N°2170).
Europe, Russie.

ATTELABIDAE

Apoderini

***Apoderus coryli* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°512).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Compsapoderus erythropterus* (Gmelin, 1790)**

1 ex., Pologne ; 1 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°4389).
France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Pologne,
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Russie.

Trachelophorini

***Paracycnotrachelus longiceps* (Motschulsky, 1860)**

1 ex., Sibérie, Russie (N°9665).



Est de la Russie, Sibérie.

Attelabini

***Attelabus nitens* (Scopoli, 1763)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°573) ; 5 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom d'*atricornis* (N°1854).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Attelabus variolosus* (Fabricius, 1801)**

1 ex., Algérie (N°9986).
Espagne.

APIONIDAE

Apionini

***Apion cruentatum* Walton, 1844**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Dourduff, Finistère (29) 1885 (N°2681).
Europe moyenne, Scandinavie, Turquie.

***Apion frumentarium* (Linnaeus, 1758) (= *Curculio sanguineum* De Geer, 1775) (= *Apion miniatum* Germar, 1833)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *miniatum* (N°510) ; 3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *sanguineum* (N°2662) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kérarmel, Plouezoch, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Bonifacio, Corse (N°1351).
Toute l'Europe, Turquie.

***Apion rubens* Stephens, 1839**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2663).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Aplemonini

***Aizobius sedi* (Germar, 1818)**

3 ex., Roscoff, Finistère (29) (N°8352).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Helianthemapion aciculare* (Germar, 1817)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2148).
Espagne, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Grèce.

***Helianthemapion velatum* (Gerstaecker, 1854)**

2 ex., Lyon, Rhône (69) (N°8335).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Onychapion tamarisci* (Gyllenhal, 1839)**

3 ex., Martigues, Bouches-du-Rhône (13) (N°6523).
Espagne, France, Sardaigne, Sicile, Turquie.

***Perapion (Erosapion) lemoroï* (C. Brisout, 1880)**

5 ex., La Bernerie, Loire-Atlantique (44) (N°6945).

Angleterre, Espagne, France, Allemagne, Italie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Moldavie, Ukraine, Turquie.

***Perapion (Perapion) affine* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) 1813, 1881, 1885 (N°2160).
Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Perapion (Perapion) curtirostre* (Germar, 1817)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*humile* (N°1708).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Perapion (Perapion) hydrolapathi* (Marshall, 1802)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2660).
Europe, Turquie.

***Perapion (Perapion) marchicum* (Herbst, 1797)**

1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) (N°2198).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Perapion (Perapion) violaceum violaceum* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2152).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Phrissotrichum (Phrissotrichum) tubiferum* (Gyllenhal, 1833)**

3 ex. Bonifacio, Corse (N°1853).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Crète, Turquie, Chypre.

***Phrissotrichum (Phrissotrichum) wenckeri* (Ch. Brisout, 1863)**

2 ex., localité non précisée (N°2884).
Espagne, France.

***Phrissotrichum (Schiskyapion) perrisii* (Wencker, 1859)**

4 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) (N°3687).
Portugal, Espagne, France.

***Phrissotrichum (Schiskyapion) revelieri* (Perris, 1869)**

2 ex. Bonifacio, Corse (N°3747).
Corse, Sardaigne.

***Phrissotrichum (Schiskyapion) rugicolle* (Germar, 1817)**

3 ex. Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2157).
France, Belgique, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Italie, Hongrie.

***Pseudaplemonus artemisiae* (Moravitz, 1861)**

4 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2775).
Russie, Turquie.

***Pseudaplemonus chevrolati* (Gyllenhal, 1833)**

3 ex. Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3636).
Portugal, Espagne, France, Suisse, Italie, Sicile,
Croatie.

***Pseudaplemonus limonii* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°5188).
Portugal, Espagne, France, Angleterre, Belgique,
Pays-Bas, Allemagne.

***Pseudoperapion brevirostre* (Herbst, 1797)**

3 ex. Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex. Kereliza,
Morlaix, Finistère (29) 1888 (N°2143).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Pseudostenapion simum* (Germar, 1817)**

2 ex. Paris, Seine (75) ; 5 ex. Le Plantay, Ain (01)
(N°6443).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Aspidapiini

***Alocentron (Alocentron) curvirostre* (Gyllenhal, 1833)**

3 ex., Autriche (N°4154).
Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie,
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Russie, Turquie.

***Aspidapion (Aspidapion) radiolus radiolus* (Marshall, 1802)**

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Morlaix,
Finistère (29) (N°2159).
Toute l'Europe.

***Aspidapion (Aspidapion) validum* (Germar, 1817)**

4 ex. Prague, Tchéquie (N°5123).
Europe moyenne, centrale, Russie, Turquie.

***Aspidapion (Koestlinia) aeneum* (Fabricius, 1775)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°508).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Ceratapiini

***Acentrotypus brunripes* (Boheman, 1839)**

1 ex. Kéarmel, Plouézoch, Finistère (29) (N°8909).
Europe occidentale, centrale, Turquie.

***Ceratapion (Acanephodus) onopordi onopordi* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 2 ex., Kergollo,
Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Plouézoch,
Finistère (29) ; 1 ex., Barnévez, Plouézoch, Finistère
(29) ; 1 ex., Kerfaven, Ploujean, Finistère (29) 1879
(N°2146).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Ceratapion (Ceratapion) carduorum* (W. Kirby, 1808)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex. Le Cosquérou,
Ploujean, Finistère (29) 1885 (N°2658).

Toute l'Europe, Turquie.

***Ceratapion (Echinostroma) penetrans caullei* (Wencker, 1858)**

4 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex.,
Penarlorzou, Ploujean, Finistère (29) sous le nom
de *caullei* ; 1 ex., Parc au Duc, Morlaix, Finistère
(29) 1881 (absence de numéro).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceratapion (Echinostroma) scalptum* (Mulsant & Rey, 1858)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Bonifacio, Corse
(N°5893).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie,
Sardaigne, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine, Grèce, Bulgarie, Ukraine, Turquie.

***Diplapion confluens* (W. Kirby, 1808)**

2 ex., Kéarmel, Plouézoch, Finistère (29) 1885 ;
2 ex. Le Plantay, Ain (01) (N°8952).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Diplapion sareptanum* (Desbrochers, 1867)**

5 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2966).
Roumanie, Russie, Turquie.

***Diplapion stolidum* (Germar, 1817)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) 1885 (N°8465).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Omphalapion beuthini* (Anton Hoffmann, 1874)**

1 ex., Plouézoch, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Morlaix,
Finistère (29), 1892 (absence de numéro).
Royaume-Uni, France, Corse, Espagne.

***Omphalapion dispar* (Germar, 1817)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
brisouti ; 1 ex., Kéarmel, Plouézoch, Finistère (29)
1885 (N°8911).
Europe moyenne, centrale, Turquie.

***Omphalapion hookerorum* (W. Kirby, 1808)**

1 ex., France, localité non précisée (N°8807).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Omphalapion laevigatum* (Paykull, 1792)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *sorbi*,
mâles et femelles (N°8910).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Taphrotopium sulcifrons* (Herbst, 1797)**

2 ex., Croatie (N°8459).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Exapiini

***Exapion difficile* (Herbst, 1797)**

6 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Kéreliza,
Morlaix, Finistère (29) (N°2151).

Portugal, Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Italie.

***Exapion fuscirostre fuscirostre* (Fabricius, 1775)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1805).
Europe moyenne et septentrionale.

***Exapion genistae* (W. Kirby, 1811)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°1852) ; 5 ex., Le Plantay, Ain (01) sous le nom de *funiculare* (N°8944).
Angleterre, France, Portugal, Espagne, Italie, Grèce.

***Exapion uliciperda* (Pandellé, 1867)**

2 ex., Poitiers, Vienne (86) (N°6598).
Portugal, Espagne, France.

***Exapion ulicis* (Forster, 1771)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1103).
Irlande, Angleterre, France, Italie, Tchéquie, Pologne.

***Lepidapion (Hidryocneme) cretaceum* (Rosenhauer, 1856)**

1 ex., Madrid, Espagne (N°4334).
Espagne, France, Turquie.

***Lepidapion (Lepidapion) squamigerum* (Jacquelin du Val, 1854)**

1 ex., Portugal (N°9050).
Portugal, Espagne, France, Sardaigne, Sicile.

Ixapiini

***Trichopteration holosericeum* (Gyllenhal, 1833)**

1 ex., Grèce (N°6375).
France, Italie, Sicile, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Ukraine, Roumanie, Moldavie, Macédoine, Bulgarie, Turquie., Lettonie.

Kalcapiini

***Kalcapion pallipes* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Paris, Seine (75) (N°6442).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Kalcapion semivittatum semivittatum* (Gyllenhal, 1833)**

6 ex., Bonifacio, Corse (N°3975).
Europe, Russie, Turquie.

***Melanapion minimum* (Herbst, 1797)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2659).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Squamapion atomarium* (W. Kirby, 1808)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2155).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Squamapion elongatum* (Germar, 1817)**

3 ex., Autriche (N°7491).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Squamapion vicinum* (W. Kirby, 1808)**

4 ex., Dijon, Côte-d'Or (21) ; 1 ex., Baie de Terrenez, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 4 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) 1885 (N°6441).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Taeniapion rufescens* (Gyllenhal, 1833)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1705).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Suisse, Slovénie, Hongrie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Taeniapion rufulum* (Wencker, 1864)**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°3745).
Europe, Russie, Turquie.

***Taeniapion tyrrhenicum* Alonso-Zarazaga, 2011**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°5894) sous le nom de *Taeniapion distinctirostre* Desbroch.
Corse, Sardaigne.

***Taeniapion urticarium urticarium* (Herbst, 1784)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°509).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Malvapiini

***Malvapion malvae* (Fabricius, 1775)**

1 ex., Dourduff, Plouezoch (29) (N°1702).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Pseudapion fulvirostre* (Gyllenhal, 1833)**

1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) (N°3688) ; 3 ex., Toscane, Italie (N°6751).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Pseudapion rufirostre* (Fabricius, 1775)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°3937).
Toute l'Europe, Turquie.

***Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807)**

3 ex., Sarepta (Sarafand), Liban, mâles et femelles (N°3937).
Toute l'Europe.

Metapiini

***Metapion candidum candidum* (Wencker, 1864)**

5 ex., Bormes les Mimosas, Var (83) (absence de numéro).
Portugal, Espagne, Italie.

Oxystomatini

***Betulapion simile simile* (W. Kirby, 1811)**

1 ex., Le Launay, Morlaix, Finistère (29) (N°5200).
Toute l'Europe., Russie, Turquie.

***Catapion curtisii* (Stephens, 1831)**

(= *Catapion curtulum* Desbrochers, des Loges, 1870)

2 ex., Kérarmel, Plouézoch, Finistère (29) 1885 (N°3746) ; 3 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°6944).

Angleterre, France, Corse, Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Catapion pubescens* (W. Kirby, 1811)**

2 ex., Angers, Maine-et-Loire (49) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 9 ex., Quimper, Finistère (29) 1883 (N°2196).

Toute l'Europe, Turquie.

***Catapion seniculus* (W. Kirby, 1808)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1710).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Catapion seriatosetosulum* (Wencker, 1864)**

2 ex., Dalmatie (N°8062) ; 2 ex., Avignon, Vaucluse (84) (N°8062).

Portugal, Espagne, Baléares, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Autriche, Hongrie, Croatie, Bulgarie.

***Cyanapion (Bothryorrhynchapion) gyllenhalii* (W. Kirby, 1808)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 3 ex., Baie de Terrenez, Finistère (29) 1885 (N°8913).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Cyanapion (Bothryorrhynchapion) platalea* (Germar, 1817)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1888 (N°2145).

Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Cyanapion (Cyanapion) alcyoneum* (Germar, 1817)**

6 ex., Autriche (N°7490).

Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sicile, Allemagne, Pologne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Grèce.

***Cyanapion (Cyanapion) columbinum* (Germar, 1817)**

2 ex., Palatinat, Allemagne (N°8464).

Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Turquie.

***Cyanapion (Cyanapion) spencii* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Paris, Seine (75) ; 1 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 3 ex., Kérarmel, Plouézoch, Finistère (29) ; 2 ex., Baie de Terrenez, Finistère (29) 1875 (N°6525).

Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Eutrichapion (Cnemapion) vorax* (Herbst, 1797)**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°2552).

Toute l'Europe, Turquie.

***Eutrichapion (Eutrichapion) ervi* (W. Kirby, 1808)**

6 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 2 ex., Coadesq, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 2 ex., Trobidon, Plouézoch, Finistère (29) 1885 (N°2142).

Toute l'Europe., Russie, Turquie.

***Eutrichapion (Eutrichapion) viciae* (Paykull, 1800)**

3 ex., Bonifacio, Corse ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Port-Launay, Finistère (29) (N°2244).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Eutrichapion (Psilocalymna) punctiger* (Paykull, 1792)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *punctigerum* ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2144).

Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Turquie.

***Hemitrichapion (Dimesomyops) pavidum* (Germar, 1817)**

1 ex., Troyes, Aube (10) (N°5144).

Europe, Turquie.

***Hemitrichapion (Tinocyba) lanigerum* (Gemminger, 1871)**

(= *Hemitrichapion lanuginosum* (Wencker, 1864))

1 ex., Gannat, Allier (03) ; 3 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°5170).

Espagne, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie.

***Hemitrichapion (Tinocyba) reflexum* (Gyllenhal, 1833)**

1 ex., Mulhouse, Haut-Rhin (68) ; 4 ex., Cannes, Alpes-Maritimes (06) (N°6258).

Europe, Russie, Turquie.

***Holotrichapion (Apiops) pisi* (Fabricius, 1801)**

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) (N°2141) ; 2 ex., Hongrie, sous le nom de *cyanipenne* (N°8615).

Toute l'Europe, Turquie.

***Holotrichapion (Holotrichapion) ononis* (W. Kirby, 1808)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 3 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 2 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) 1888 (N°5830).

Toute l'Europe, Turquie.

***Holotrichapion (Legaricapion) aethiops* (Herbst, 1797)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Baie de Terrenez, Finistère (29) 1885 (N°2156).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Holotrichapion (Legaricapion) gracilicolle* (Gyllenhal, 1839)**

5 ex., Gannat, Allier (03) (N°2117).

Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Allemagne, Tchéquie, Autriche, Hongrie, Croatie, Moldavie, Grèce, Turquie.

***Ischnopterapion (Chlorapion) virens* (Herbst, 1797)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2154).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ischnopterapion (Ischnopterapion) loti* (W. Kirby, 1808)**

1 ex., Santec, Finistère (29) 1887 ; 1 ex., Coadesq, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 4 ex., Dourduff, Plouezoch, Finistère (29) sous le nom d'*angustatum* ; 1 ex., Barnévez, Plouézoch, Finistère (29) 1885 (N°4828).

Europe entière, Russie, Turquie.

***Oryxolaemus flavifemoratus* (Herbst, 1797)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2147).

Europe moyenne et centrale.

***Oxystoma cerdo* (Gerstaecker, 1854)**

2 ex., Pologne (N°4391).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Oxystoma cracca* (Linnaeus, 1767)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29), mâles et femelles (N°1354).

Europe entière, Turquie.

***Oxystoma ochropus* (Germar, 1818)**

1 ex., Laillé, Ille-et-Vilaine (35) 1916 (absence de numéro).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Oxystoma opeticum* (Bach, 1854)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Haut Bugey, Nantua, Ain (01) (N°2158).

Europe, Russie, Turquie.

***Oxystoma pomonae* (Fabricius, 1798)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1706).

Europe, Turquie.

***Pirapion immune* (W. Kirby, 1808)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1707).

Irlande, Angleterre, Portugal, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suisse, Autriche, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Italie.

***Protopirapion atratum* (Germar, 1817)**

(= ***Protopirapion striatum* Marsham, 1802**)

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *striatum* (N°1353).

Irlande, Angleterre, Portugal, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, Italie, Sicile, Bulgarie.

***Stenopterapion (Cobosotherium) scutellare* (W. Kirby, 1811)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1352).

Irlande, Angleterre, Portugal, Espagne, France.

***Stenopterapion (Stenopterapion) intermedium* (Eppelsheim, 1875)**

2 ex., Thuringe, Allemagne (N°8463).

Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Stenopterapion (Stenopterapion) meliloti* (W. Kirby, 1808)**

2 ex., Dobruschka, Tchéquie (N°8054).

Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Stenopterapion (Stenopterapion) tenue* (W. Kirby, 1808)**

1 ex., Troyes, Aube (10) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kérarmel, Plouézoch, Finistère (29) 1885 ; 4 ex., Pennélé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1884 (N°5143).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Synapion ebeninum* (W. Kirby, 1808)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2656).

Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

Piezotrachelini

***Protapion apricans* (Herbst, 1797)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 7 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) (N°2150).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Protapion assimile* (W. Kirby, 1808)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2153).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Protapion dentipes* (Gerstaecker, 1854)**

2 ex., Italie (N°8063).

Portugal, Espagne, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Protapion difforme* (Germar, 1818)**

3 ex., Grèce ; 7 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°8460).

Angleterre, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Protapion dissimile* (Germar, 1817)**

2 ex., Berlin, Allemagne (N°8462).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Protapion filirostre* (W. Kirby, 1808)**

1 ex., Gannat, Allier (03) ; 4 ex., Bugey, Ain (01) ;

1 ex., Saint-Girons, Ariège (09) (N°5197).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Protapion fulvipes fulvipes* (Geoffroy, 1785)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *dichroum* (N°2657).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Protapion laevicolle* (W. Kirby, 1811)**

2 ex., La Bernerie, Loire-Atlantique (44) (N°7587).

Angleterre, Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie, Slovaquie.

***Protapion nigrirtase* (W. Kirby, 1808)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°511).

Europe, Turquie.

***Protapion ononidis* (Gyllenhal, 1827)**

(= *Apion ononicola* Bach, 1854)

1 ex., Transylvanie, Roumanie, sous le nom d'*ononicola* (N°8461).

Europe entière, Russie, Turquie.

***Protapion trifolii* (Linnaeus, 1768)**

8 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2149).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Protapion varipes* (Germar, 1817)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1709).

Europe, Russie, Turquie.

***Pseudoprotapion astragali astragali* (Paykull, 1800)**

4 ex., Toscane, Italie (N°6750).

Toute l'Europe, Turquie.

***Pseudoprotapion elegantulum* (Germar, 1818)**

7 ex., Gannat, Allier (03) (N°4474).

Europe, Russie, Turquie

NANOPHYIDAE

Corimaliinae

***Allomalía quadrivirgata* (Costa, 1863)**

4 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *sexpunctatus* (N°1861).

France, Corse, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Hongrie, Grèce, Bulgarie, Turquie, Chypre.

***Corimalia pallida* (Olivier, 1807)**

4 ex., Bonifacio, Corse (N°2583) ; 4 ex., Algérie sous le nom de *centromaculatus* (N°9658).

Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce, Turquie.

***Corimalia postica* (Gyllenhal, 1838)**

5 ex., Alpes-de-Haute-Provence (04) (N°2247).

Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile.

***Corimalia tamarisci* (Gyllenhal, 1838)**

5 ex., France méridionale (N°815) ; 1 ex., sud de la Russie sous le nom de *languidus* (N°5504).

Portugal, Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile.

***Corimalia tetrastigma* (Aubé, 1863)**

1 ex., Narbonne, Aude (11) (N°4899).

Portugal, Espagne, France, Italie.

***Hypophyes pallidulus* (Gravenhorst, 1807)**

1 ex., sud de la Russie sous le nom de *minutissimus* (N°5505) ; 3 ex., Iles Baléares, Espagne sous le nom de *liliputanus* (N°8468) ; 4 ex., Bonifacio, Corse (N°2584).

Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile.

Nanophyinae

***Dieckmanniellus gracilis* (Redtenbacher, 1849)**

7 ex., Le Plantay, Ain, (01) ; 1 ex., La Boissière, Ploujean, Finistère (29) 1901 (N°9155) ; 3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *geniculatus* (N°4336).

Espagne, France, Angleterre, Italie, Sardaigne, Sicile, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Grèce, Bulgarie.

***Dieckmanniellus nitidulus* (Gyllenhal, 1838)**

1 ex., Espagne (N°5423) ; 3 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *chevrieri* (N°2582).

Portugal, Espagne, France, Corse, Suisse, Italie, Sardaigne, Sicile, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Nanodiscus transversus* (Aubé, 1850)**

7 ex., Bonifacio, Corse (N°2580).

Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie.

***Nanomimus hemisphaericus* (Olivier, 1807)**

4 ex., Troyes, Aube (10) (N°5138) ; 3 ex., Bonifacio, Corse sous le nom d'*ulmi* (N°2585).

Europe moyenne, Russie, Turquie.

***Nanophyes brevis brevis* Boheman, 1845**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Roscoff, Finistère (29) 1901 ; 1 ex., Lyon, Rhône (69) (N°9404).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Nanophyes globulus* (Germar, 1821)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) 1901 ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Meudon, Hauts-de-Seine (92) (N°4335).

Europe moyenne et centrale, Suède.

***Nanophyes marmoratus marmoratus* (Goeze, 1777)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *lythri* ;
7 ex., baie de Térrenez, Finistère (29) 1883, 1898
(N°532).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Nanophyes rubricus* Rosenhauer, 1856**

2 ex., Corse (N°2581).
Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne,
Sicile, Croatie, Grèce.

***Pericartiellus flavidus* (Aubé, 1850)**

2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3085).
Espagne, France, Allemagne, Russie, Turquie.

BRACHYCERIDAE**Brachycerini*****Brachycerus barbarus* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Bonifacio, Corse (N°1845) ; 1 ex., Algérie sous
le nom de *lateralis* (N°5416) ; 4 ex., Alger, Algérie
sous le nom de *libertinus* (N°6093).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie,
Sardaigne, Sicile.

***Brachycerus callosus* Gyllenhal, 1833**

2 ex., Oran, Algérie sous le nom de *semituberculatus*
(N°8962).
Portugal, Espagne, Sicile, Chypre.

***Brachycerus foveicollis* Gyllenhal, 1833**

1 ex., Tyrol, Autriche (N°8794).
Autriche, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie,
Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Brachycerus junix* Lichtenstein, 1796**

1 ex., Grèce ? (N°9597).
Italie, Sicile, Moldavie, Turquie.

***Brachycerus lutosus* Gyllenhal, 1833**

2 ex., Turquie sous le nom de *cinereus* ; 1 ex., Rome,
Italie (N°8793).
France, Italie, Grèce, Turquie.

***Brachycerus muricatus* Olivier, 1790**

(= *Curculio algirus* Fabricius, 1787)

3 ex., Afrique, sous le nom d'*algirus* (N°3435) ; 1 ex.,
Alger, Algérie, sous le nom de *cirrosus* (N°6091).
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Brachycerus plicatus* Gyllenhal, 1833**

3 ex., Espagne ; 1 ex., Carthagène, Espagne
(N°5303) ; 2 ex., Algérie sous le nom de *teticus*
(N°5304).
Espagne, Baléares, Sicile, Turquie.

***Brachycerus pradierei pradierei* Fairmaire, 1857**

4 ex., Ile de Ré, Charente-Maritime (17) ; 2 ex., Le
Croisic, Loire-Atlantique (44) (N°6084).
France, Espagne.

***Brachycerus scutellaris* Lucas, 1849**

2 ex., Oran, Algérie (N°9035).
Maroc, Algérie, Tunisie

***Brachycerus undatus* Fabricius, 1798**

1 ex., Algérie sous le nom de *pterygomalis* (N°802) ;
4 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom de *corrosus*
(N°2232) ; 1 ex., Dalmatie sous le nom de *corrosus*
(N°4150).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Grèce.

***Piazomias validus* Motschulsky, 1853**

1 ex., Shan-Si, Chine (N°9348).
Chine. Ailleurs, espèce introduite avec *Paulownia*.

DRYOPHTHORIDAE**Dryophthorinae*****Dryophthorus corticalis* (Paykull, 1792)**

1 ex., Paris, Seine (75) (N°2570).
Europe occidentale et septentrionale, Russie.

Rhynchophorinae**Litosomini*****Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°130).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rouen, Seine-
Maritime (76) (N°6166).
Pratiquement toute l'Europe Russie, Turquie.



Sitophilus oryzae (© RL)

Sphenophorini

***Sphenophorus abbreviatus* (Fabricius, 1787)**

3 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) ; 2 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°2841) ; 1 ex., Barcelone, Espagne (N°510).
Europe moyenne, centrale, Russie.

***Sphenophorus meridionalis* Gyllenhal, 1838**

1 ex., Sète, Hérault (34) ; 1 ex., Barcelone, Espagne (N°511).
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Sphenophorus piceus* (Pallas, 1776)**

4 ex., Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex., Barcelone, Espagne (N°2840).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777)**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°1862) ; 1 ex., Clermont, Oise (60) sous le nom d'*ardesia* (N°6262).
Europe moyenne et centrale.

ERIRHINIDAE

Erirhininae

Arthrostenini

***Trichocaulus longipilis* Fairmaire, 1877**

1 ex., Algérie (N°9976).
Algérie, Somalie.

Erirhinini

***Grypus brunnirostris* (Fabricius, 1792)**

1 ex., Prague, Tchéquie ; 1 ex., Allemagne ; 2 ex., Lille, Nord (59) (N°5280).
Europe moyenne et septentrionale.

***Grypus equiseti* (Fabricius, 1775)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°8871).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.



Grypus equiseti (© RL)

***Jekelia notata* (Mulsant, 1867)**

3 ex., Oran, Algérie (N°9033).
Italie.

***Notaris acridulus* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°503).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Notaris aethiops* (Fabricius, 1793)**

2 ex., Muonio, Finlande (N°9085).
Europe moyenne centrale et septentrionale, Russie.

***Notaris scirpi* (Fabricius, 1793)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Lille, Nord (59) ; 1 ex., Sos, Lot-et-Garonne (47) ; 1 ex., Porto-Vecchio, Corse (N°2553).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Procas armillatus* (Fabricius, 1801)**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°3743).
Espagne, France, Corse, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Hongrie, Bulgarie, Turquie.

***Thryogenes festucae* (Herbst, 1795)**

2 ex., Troyes, Aube (10) ; 1 ex., Lille, Nord (59) ; 1 ex., Guingamp, Côtes-d'Armor (22) (N°5140).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Thryogenes nereis* (Paykull, 1800)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2049).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Thryogenes scirrhosus* (Gyllenhal, 1836)**

1 ex., Allemagne ; 1 ex., Lille, Nord (59) (N°5373).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Tournotaris bimaculata* (Fabricius, 1787)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°502).
Toute l'Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

Tanysphyrini

***Tanysphyrus lemnae* (Fabricius, 1792)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1329).
Toute l'Europe.



Tanysphyrus lemnae (© RL)

RAYMONDIONYMIDAE


Raymondionyminae

***Ferreria marqueti marqueti* (Aube, 1863)**

1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06),
France, Suisse, Italie, Croatie.



Ferreria marqueti (© RL)



Aulacobaris cuprirostris cuprirostris (© RL)

***Aulacobaris lepidii* (Germar, 1824)**

2 ex., localité non renseignée (N°533).
Europe moyenne, centrale, Russie, Turquie.

***Aulacobaris picicornis picicornis* (Marshall, 1802)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom
d'*abrotani*
(N°286) ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76)
(N°5540).
Angleterre, France, Allemagne, Italie, Sardaigne,
Sicile, Russie, Bulgarie, Turquie.

CURCULIONIDAE

Baridinae

Apostasimerini

***Limnobaris t-album* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rostrenen,
Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°534).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie,
Turquie.

Baridini

***Aulacobaris chlorizans* (Germar, 1824)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°5541).
France, Italie, Ukraine, Russie.

***Aulacobaris coerulescens coerulescens* (Scopoli, 1763)**

3 ex., Dobruschka, Tchèque (N°7040) ; 2 ex., Bône,
Algérie ; 1 ex., Oran, Algérie (N°4475) ; 5 ex., Morlaix,
Finistère (29) sous le nom de *chloris* (N°1295) ; 1 ex.,
Toscane, Italie sous le nom de *chlorodis* (N°6749).
France, Russie, Yougoslavie, Sicile, Italie, Sardaigne,
Corse.

***Aulacobaris cuprirostris cuprirostris* (Fabricius, 1787)**

3 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) (N°1499) ; 1 ex.,
Algérie sous le nom de *sicula* (N°9648).
France, Italie, Sardaigne, Sicile, Autriche, Allemagne.

***Baris analis analis* (Olivier, 1790)**

4 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3670).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Baris artemisiae* (Panzer, 1794)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 3 ex., Toscane,
Italie (N°5542).
France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Autriche,
Pologne, Suède, Finlande, Ukraine, Biélorussie,
Russie, Turquie.

***Baris limbata* (H. Brisout, 1870)**

1 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°3942).
Russie, Turquie.

***Cosmobaris scolopacea* (Germar, 1824)**

2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2789).
Angleterre, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Autriche, Hongrie, Ukraine, Roumanie, Moldavie,
Bulgarie, Russie, Turquie.

***Eremobaris picturata* (Schoenherr, 1849)**

1 ex., Morée, Grèce (N° ?).
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Russie,
Turquie.

***Labiaticola atricolor* (Boheman, 1844)**

1 ex., Dalmatie (N°8805).
Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Bulgarie, Grèce, Turquie, Russie.

***Maurobaris spoliata* (Boheman, 1836)**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°3752) sous le nom de
Baridius spoliatus
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile.

***Melanobaris laticollis* (Marsham, 1802)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *picina* (N°1294) ; 2 ex., Hyères, Var (83) (N°1294) (N°2860) ; 5 ex., Sud de la France ; 2 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom de *nitens* (N°2860).
Angleterre, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie,

***Melanobaris morio* (Boheman, 1844)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°5547).
Espagne, France, Corse, Allemagne, Autriche, Italie, Sardaigne.

***Melanobaris quadraticollis quadraticollis* (Boheman, 1836)**

1 ex., localité non précisée (N°3028).
Espagne, France, Corse, Sicile.

Madarini

***Cucubaris villae* (Comolli, 1837)**

1 ex., Piémont, Italie (N°5424) sous le nom d'*Aulacobaris villae*.
France, Italie, Sicile, Autriche, Hongrie, Roumanie, Turquie.



Cosmobaris scolopacea (© RL)

Curculioninae

Acalyptini

***Acalyptus carpini* (Fabricius, 1792)**

3 ex., Gannat, Allier (03) (N°2462) ; 1 ex., Allier (03) sous le nom de *rufipennis* (N°2200).
Europe moyenne, Russie.

***Derelomus chamaeropsis* (Fabricius, 1798)**

1 ex., Algérie (N°4823).
Espagne, France, Italie, Sicile.

Acentrusini

***Acentrus histrio* (Schoenherr, 1837)**

3 ex. Digne les Bains, Alpes de Haute Provence (04) (N°1381).
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Bulgarie, Ukraine, Russie, Turquie.

Anoplini

***Anoplus plantaris* (Naezén, 1794)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1278).
Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pologne, Slovaquie, Russie.

***Anoplus roboris* Suffrian, 1840**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) 1888 (N°9405).
Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pologne, Slovaquie, Bulgarie.

Anthonomini

***Anthonomus (Anthomorphus) phyllocola* (Herbst, 1795)**

(= *Curculio varians* Paykull, 1792)

6 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *variens* ; 1 ex., Briançon, Hautes-Alpes (05) sous le nom de *variens* ; Eyne, col de la Perche, Pyrénées-Orientales sous le nom de *pyrenaeus* (N°2885).
Europe moyenne, Centrale, Russie, Turquie

***Anthonomus amygdali* Hustache, 1930**

1 ex., Constantinople (Istanbul), Turquie sous le nom d'*ornatus* (N°6522).
Angleterre, France, Corse, Italie, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Hongrie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Anthonomus conspersus* Desbrochers, 1868**

1 ex., Remiremont, Vosges (88) (N°3305).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Anthonomus pedicularius* (Linnaeus, 1758)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) 1890 ; 1 ex., La Salette, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1894 (N°3673).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Anthonomus phyllocola* (Herbst, 1795)**

6 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *variens* ; 1 ex., Briançon, Hautes-Alpes (05) sous le nom de *variens* (N°2853) ; Eyne, col de la Perche, Pyrénées-Orientales sous le nom de *pyrenaeus* (N°2885).
Europe moyenne, Centrale, Russie, Turquie.

***Anthonomus pomorum* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pannelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1890 (N°521).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Anthonomus pyri* Gyllenhal, 1835**

4 ex., Loiret (45) sous le nom de *cinctus* (N°5529).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Anthonomus rubi* (Herbst, 1795)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1100).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.



Anthonomus rubi (© RL)

***Anthonomus rufus* Gyllenhal, 1836**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°2426) ; 2 ex., Gannat, Allier (03) (N°4472).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Anthonomus spilotus* Redtenbacher, 1847**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2853).
Portugal, Espagne, France, Corse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Tchéquie, Suisse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Russie, Suède.

***Anthonomus ulmi* (De Geer, 1775)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*inversus* (N°1555).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Anthonomus undulatus* Gyllenhal, 1835**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *druparum* ; 1 ex., Gannat, Allier (03) (N°2164).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Brachonyx pineti* (Paykull, 1792)**

8 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom d'*indigena* (N°2849).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Bradybatus creutzeri* Germar, 1824**

6 ex., Autriche (N°4155).
Europe moyenne et centrale.

***Bradybatus kellneri* Bach, 1854**

3 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *subfasciatus* (N°3403).
France, Italie, Allemagne, Danemark, Pologne, Suède, Norvège, Estonie, Lettonie, Lituanie.

Cionini

***Cionellus gibbifrons* (Kiesenwetter, 1851)**

4 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., La Seyne-sur-Mer, Var (83) (N°7038).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Turquie.

***Cionus alauda* (Herbst, 1784)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *blattariae* (N°521).
Europe moyenne et centrale.

***Cionus distinctus* Desbrochers, 1869**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°3973).
Corse.

***Cionus hortulanus* (Geoffroy, 1785)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Plougasnou, Finistère (29) 1880 ; 1 ex., Lyon, Rhône (69) ; 1 ex., Paris, Seine (75) (N°2386).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Cionus longicollis longicollis* C. Brisout, 1863**

4 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) (N°4229).
Angleterre, Espagne, France, Italie, Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Croatie, Bulgarie.

***Cionus merkli* Stierlin, 1882**

2 ex., Turquie (N°8800).
Grèce, Turquie.

***Cionus olens* Fabricius, 1792**

4 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°4541).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie

***Cionus olivieri* Rosenschöld, 1838**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) ; 2 ex., France, localité non précisée (N°530).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Cionus schoenherri schoenherri* C. Brisout, 1863**

6 ex., Briançon, Hautes Alpes (05) (N°4902).
Espagne, France, Corse, Italie, Sicile.

***Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°529).
Toute l'Europe, Turquie.

***Cionus tuberculatus* (Scopoli, 1763)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *verbasci* (N°2165).
Europe moyenne et centrale.

***Cleopus pulchellus* (Herbst, 1795)**

3 ex., Styrie, Autriche (N°6374).
Europe moyenne et septentrionale.

***Cleopus solani* (Fabricius, 1792)**

4 ex., Turquie (N°7426).
Europe moyenne et centrale.

***Stereonychus fraxini* (De Geer, 1775)**

4 ex., Angers, Maine-et-Loire (49) ; 1 ex., Toscane, Italie (2463) ; 4 ex., La Seyne-sur-Mer, Var (83) sous le nom de *phillyrae* (N°7258).

Europe moyenne, Russie

***Stereonychus telonensis* (Grenier, 1864)**

8 ex., Toulon, Var (83) (N°6690).
France, Grèce.

Curculionini

***Archarius crux* (Fabricius, 1776)**

3 ex., France, localité non précisée (N°520).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie,
Turquie.

***Archarius ochreateus ochreateus* (Fahraeus, 1843)**

1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66)
(N°4332).
Espagne, France.

***Archarius pyrrhoceras* (Marsham, 1802)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1104).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Archarius salicivorus* (Paykull, 1792)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
brassicae (N°869).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Curculio betulae* (Stephens, 1831)**

3 ex., Nyons, Drôme (26) sous le nom de *cerasorum*
(N°1713).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.



Curculio betulae (© RL)

***Curculio elephas* (Gyllenhal, 1836)**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°519).
Espagne, France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse,
Autriche, Italie, Sicile, Pologne, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Croatie, Bosnie, Roumanie, Moldavie,
Bulgarie, Grèce.

***Curculio glandium* Marsham, 1802**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *turbatus* ;
1 ex., Armorique (?), 1891 ; 2 ex., Bonifacio, Corse
(N°1856).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Curculio nucum* Linnaeus, 1758**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1712).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Curculio pellitus* (Boheman, 1843)**

3 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3691).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Curculio rubidus* (Gyllenhal, 1835)**

2 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) sous le nom
d'*undulatus* (N°4423).
Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse,
Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie,
Roumanie, Moldavie, Lituanie, Russie, Turquie.

***Curculio venosus venosus* (Gravenhorst, 1807)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2558).
Europe, Russie, Turquie.



Curculio villosus (© RL)

***Curculio villosus* Fabricius, 1781**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°868).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Ellescini

***Dorytomus dejeani* Faust, 1883**

3 ex., Trobidon, Plouézoch, Finistère (29) 1890 ;
1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) 1890 ;
1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°9044) ; 2 ex.,
Porto-Vecchio, Corse sous le nom de *costirostris* ;
1 ex., Lille, Nord (59) (N°2554).
Toute l'Europe.

***Dorytomus dorsalis* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Troyes, Aube (10) (N°959).
Europe moyenne et septentrionale, Scandinavie,
Russie.

***Dorytomus edoughensis* Desbrochers, 1875**

3 ex., Marly, Yvelines (78) sous le nom d'*affinis*
(N°6256).
Toute l'Europe, Russie.

***Dorytomus filirostris* (Gyllenhal, 1835)**

1 ex., France, localité non précisée ; 1 ex., Lille,
Nord (59) (N°5413).
Europe moyenne.

***Dorytomus hirtipennis* Bedel, 1884**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°9057).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Turquie.

Dorytomus ictor* (Herbst, 1795)*(= *Dorytomus validirostris* (Gyllenhal, 1836))**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *validirostris* ; 1 ex., Coadesq, Ploujean, Finistère (29) 1891 ; 2 ex., Troyes, Aube (10) (N°889). Europe moyenne et septentrionale

***Dorytomus longimanus* (Forster, 1771)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *vorax* ; 2 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) 1890 ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 2 ex., Ploujean, Finistère (29) 1890 ; 6 ex., Armorique, 1890 (N°504) ; 1 ex., France, localité non précisée sous le nom de *macropus* (N°2051) ; 1 ex., Porto-Vecchio, Corse sous le nom de *meridionalis* (pas de Numéro). Europe moyenne et centrale, Suède.

***Dorytomus majalis* (Paykull, 1792)**

1 ex., Hongrie (N°7109).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie.

***Dorytomus melanophthalmus* (Paykull, 1792)**

5 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) 1891 ; 1 ex., Penvern, Pleyber-Christ, Finistère (29) 1891 (N°8458) ; 2 ex., Palatinat, Suisse, sous le nom d'*agnathus* ; 2 ex., Trobidon, Plouézoch, Finistère (29) 1890 (N°5412).
Europe moyenne, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Dorytomus nebulosus* (Gyllenhal, 1835)**

3 ex., Lyon, Rhône (69) (N°8527).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Dorytomus occalescens* (Gyllenhal, 1835)**

1 ex., France, localité non désignée ; 1 ex., Bugey, Ain (01) (N°5410).
France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Moldavie, Lettonie.

Dorytomus rubrirostris* Gravenhorst, 1807*(= *Curculio affinis* Paykull, 1800)**

3 ex., Marly, Yvelines (78) sous le nom d'*affinis* (N°6256).
Toute l'Europe, Russie.

Dorytomus rufatus rufatus* (Bedel, 1888)*(= *Dorytomus rufulus* Bedel, 1884)**

2 ex., Ville Chétif, Aube (10) sous le nom de *pectoralis* ; 1 ex., centre de la France, localité non précisée ; 2 ex., Lille, Nord (59) (N°5318) ; 1 ex., Avallon, Yonne (89) sous le nom de *rufulus* ; 2 ex., Bugey, Ain (01) ; 1 ex., mont Canigou, Prades, Pyrénées-Orientales (66) (N°9667).
Europe moyenne et septentrionale, Russie, Turquie.

***Dorytomus salicinus* (Gyllenhal, 1827)**

1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1887 ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2633).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Dorytomus salicis* Walton, 1851**

1 ex., Marly, Yvelines (78) (N°9056).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Dorytomus schoenherri schoenherri* Faust, 1883**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Trobidon, Plouézoch, Finistère (29) ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°9058).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

Dorytomus suratus* (Gyllenhal, 1835)*(= *Curculio flavipes* Panzer, 1799)**

2 ex., Bugey, Ain (01) sous le nom de *flavipes* ; 1 ex., Rhin, 1862 (N°5411).
France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Suède.

***Dorytomus taeniatus* (Fabricius, 1781)**

14 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Val Maggia, Tessin, Suisse (N°8482) ; 4 ex., France, localité non précisée, sous le nom de *maculatus* ; 1 ex., Lille, Nord (59) (N°5319) ; 1 ex., France, localité non précisée, sous le nom de *silbermanni* (N°5317).
Europe moyenne et septentrionale, Russie, Turquie.

***Dorytomus tortrix* (Linnaeus, 1760)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Trobidon, Plouézoch, Finistère (29) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°3264).
Europe moyenne et septentrionale, Russie, Turquie.

***Dorytomus tremulae* (Fabricius, 1787)**

1 ex., Tréfeunténiou, Ploujean, Finistère (29) 1881 (N°505).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Dorytomus villosulus* (Gyllenhal, 1835)**

4 ex., Autriche (N°4153).
France, Corse, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Roumanie, Bulgarie.

***Ellescus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Armorique (?) 1892 ; 1 ex., Keramprat, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1889 (N°527).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Ellescus infirmus* (Herbst, 1795)**

1 ex., France, localité non précisée (N°7420).
France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Biélorussie, Lituanie, Estonie.

***Ellescus scanicus* (Paykull, 1792)**

5 ex., Autriche (N°4156).
Toute l'Europe, Russie.

Mecinini

***Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2032).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Cleopomiarus longirostris longirostris* (Gyllenhal, 1838)**

3 ex., Toscane, Italie, (N°6748) ; 1 ex., Hongrie sous le nom de *scutellaris* (N°9656).
France, Suisse, Italie, Sicile, Bulgarie.

***Cleopomiarus meridionalis* (H. Brisout, 1862)**

2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) ; 2 ex. Oran, Algérie (N°5507).
Espagne, France, Italie, Sicile, Bulgarie.

***Cleopomiarus micros* (Germar, 1821)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°6836).
Europe moyenne, Russie.

***Cleopomiarus plantarum* (Germar, 1824)**

2 ex., Hyères, Var (83) ; 1 ex., Hongrie (N°3341).
Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas, Autriche, Italie, Pologne, Bulgarie.

***Gymnetron beccabungae* (Linnaeus, 1761)**

1 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2562).
France, Angleterre, Allemagne, Danemark, Pologne, Suisse, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Norvège, Suède, Finlande.

***Gymnetron melanarium* (Germar, 1821)**

1 ex., Pennélé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1878 (N°6282).
Europe moyenne, Russie, Scandinavie, Turquie.

***Gymnetron rostellum* (Herbst, 1795)**

1 ex., localité non précisée (N°6444).
Europe moyenne, Scandinavie.

***Gymnetron veronicae* (Germar, 1821)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Moulin Rivoalen, Plouigneau, Finistère (29) 1884 ; 1 ex., La Boissière, Ploujean, Finistère (29) 1883 (N°9672).
Toute l'Europe.

***Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1838**

1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) ; 1 ex., Lille, Nord (59) (N°3884).
Europe moyenne, Turquie.

***Mecinus barbarus* Gyllenhal, 1838**

(= *Mecinus longiusculus* Boheman, 1845)

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *filiformis* ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1885 sous le nom de *longiusculus* ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 *longiusculus* (N°2050).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Mecinus circulatus* (Marshall, 1802)**

3 ex., Saint Michel en Grève, Côtes-d'Armor (22) ;
1 ex., Bonifacio, Corse (N°1350).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Mecinus elongatus* (Desbrochers, 1862)**

2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) (N°3882).
Espagne, France.

***Mecinus ictericus* (Gyllenhal, 1838)**

7 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) (N°3963).
France, Allemagne, Italie, Sicile, Autriche, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Grèce, Russie, Turquie.

***Mecinus janthinus* Germar, 1821**

2 ex., Valenciennes, Nord (59) ; 1 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°3168).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Mecinus labilis* (Herbst, 1795)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°3858).
Europe moyenne, centrale, Turquie.

***Mecinus latiusculus* (Jacquelin du Val, 1855)**

1 ex., Sète, Hérault (34) (N°2561).
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Roumanie, Russie.

***Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813)**

1 ex., Toscane, Italie (N°6747) ; 1 ex., moulin du Pont, Saint-Thégonnec, Finistère (29) 1881 sous le nom de *bicolor* ; 1 ex., Dourduff en Terre, Plouézoch, Finistère (29) 1884 ; 2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) (N°3880).
Toute l'Europe, Turquie.

***Mecinus pyraster* (Herbst, 1795)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°518).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Mecinus setosus* Kiesenwetter, 1864**

1 ex., Grèce (N°9654).
Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Miarus campanulae* Linnaeus, 1767**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) (N°361).
Irlande, Angleterre, France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie, Danemark, Bulgarie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Scandinavie.

***Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2033) ; 5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *noctis* ; 1 ex., Valenciennes, Nord (59) (N°3169).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Rhinusa asellus* (Gravenhorst, 1807)**

1 ex., Gannat, Allier (03) ; 2 ex., Bonifacio, Corse (N°2201).

France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Sardaigne, Sicile, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Bulgarie, Turquie.

***Rhinusa bipustulata* (Rossi, 1792)**

1 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *spilotum* ; 5 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) (N°2711).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Rhinusa collina* (Gyllenhal, 1813)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1885 (N°6835).

France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Bulgarie, Italie, Sardaigne, Estonie, Lituanie, Russie du Nord, Scandinavie.

***Rhinusa herbarum* (H. Brisout, 1862)**

2 ex., Hyères, Var (83) (N°3263).

France, Italie, Sardaigne, Sicile, Autriche, Slovaquie, Bulgarie.

***Rhinusa lanigera* (H. Brisout, 1862)**

4 ex., Bonifacio, Corse (N°3751).

Espagne, Corse, Sicile.

***Rhinusa linariae* (Panzer, 1795)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 3 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1886 ; 1 ex., Trobidon, Plouézoch, Finistère (29) 1881 (N°1934).

Europe moyenne, Russie, Scandinavie.

***Rhinusa littorea* (H. Brisout, 1862)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kérarmel, Plouézoch, Finistère (29) 1885 ; 2 ex., Le Wallace, Plouézoch, Finistère (29) 1885 (N°7571).

France.

***Rhinusa neta* (Germar, 1821)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pennelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) ; 1 ex., Gannat, Allier (03) (N°5506).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792)**

(= *Rhinusa hispida* (Brullé, 1832))

(= *Gymnetron plagiella* Gyllenhal, 1838)

(= *Rhinusa thapsicola* (Germar, 1821))

1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1888 ; 3 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2248).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Rhinusa vestita* (Germar, 1821)**

1 ex., Alger (N°4739).

Portugal, Espagne, France, Italie, Sicile, Bulgarie.

Rhamphini***Isochnus foliorum* (O. F. Müller, 1764)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *saliceti* ; 1 ex., Lille, Nord (59) ; Térrenez, Plougasnou, Finistère (29) 1880 (N°3852).

Europe moyenne et centrale, Norvège.

***Isochnus sequensi* (Stierlin, 1894)**

(= *Curculio populi* Fabricius, 1792)

(= *Rhynchaenus populicola* Silfverberg, 1977)

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *populi* ; 1 ex., Lille, Nord (59) sous le nom de *populicola* (N°2833).

Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie.

***Orchestes (Alyctus) calceatus* Germar, 1821**

(= *Rhynchaenus semirufus* Gyllenhal, 1827)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *semirufus* (N°2335).

***Orchestes (Alyctus) rusci* (Herbst, 1795)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°9670).

Irlande, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pologne, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Russie.

***Orchestes (Alyctus) testaceus* (Müller, 1776)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*alni* (N°1279) ; 1 ex., France, localité non précisée (N°5499) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *semirufus* (N°2335).

Europe moyenne et centrale, Russie.

***Orchestes (Orchestes) alni* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°837) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *melanocephalus* (N°5548).

Angleterre, France, Corse, Allemagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Moldavie, Pologne, Slovaquie.

***Orchestes (Orchestes) betuleti* (Panzer, 1795)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *rufus* ; 1 ex., Armorique, sous le nom de *rufus* 1881 ; 1 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29) 1881 sous le nom de *rufus* (N°2109).

France, Corse, Italie, Sardaigne, Slovaquie, Allemagne, Pologne, Slovaquie, Bulgarie, Moldavie, Ukraine, Suède, Russie. Pologne, Hongrie.

***Orchestes (Orchestes) erythropus* (Germar, 1821)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Trobidon, Plouezoch, Finistère (29) 1888 (N°3713) ; 1 ex., Perpignan, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *tricolor* (N°3301).

Espagne, France, Corse, Italie, Allemagne,

***Orchestes (Orchestes) fagi fagi* (Linnaeus, 1758)**

(= *Curculio calcar* Fabricius, 1781)

1 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°524).

Europe moyenne et centrale.

***Orchestes (Orchestes) hortorum* (Fabricius, 1792)**
(= *Curculio avellanae* Donovan, 1797)

6 ex., Morlaix, Finistère (29), sous le nom de *signifer* ;
Tréfeunténiou, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Saint-
Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°1318).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

Orchestes (Orchestes) irroratus irroratus
Kiesenwetter, 1852

6 ex., Hyères, Var (83) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29)
(N°7684).
Espagne, Baléares, France, Sardaigne, Sicile.

***Orchestes (Orchestes) jota* (Fabricius, 1787)**
(= *Orchestes maurus* Gravenhorst, 1807)
(= *Orchestes shevnini* Legalov, 2007)

5 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) ; 1 ex., Lille, Nord
(59) ; 1 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78)
(N°4708).
Angleterre, France, Allemagne, Pologne, Hongrie,
Italie.

***Orchestes (Orchestes) pilosus* (Fabricius, 1781)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°523).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Orchestes (Orchestes) quedenfeldtii* Gerhardt, 1865**

2 ex., Silésie, Pologne (N°8466).
Allemagne, Italie, Pologne, Slovaquie, Hongrie,
Moldavie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Orchestes (Orchestes) quercus* (Linnaeus, 1758)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°521) (N°522).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Orchestes (Orchestes) sparsus* Fåhraeus, 1843**

3 ex., Landes (40) ; 1 ex., Saint-Germain-en-Laye,
Yvelines (78) (N°5500).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Orchestes (Orchestes) subfasciatus* Gyllenhal, 1835**

2 ex., Vienne, Autriche (N°9060).
Allemagne, Pologne, Autriche, Hongrie, Italie.

***Pseudorchestes cinereus* (Fåhraeus, 1843)**

1 ex., Carniole, Slovaquie (N°8827).
France, Allemagne, Autriche, Italie, Sardaigne, Sicile,
Moldavie, Russie.

***Pseudorchestes pratensis* (Germar, 1821)**

6 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) ; 1 ex.,
Lille, Nord (59) (N°3674).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Pseudorchestes tomentosus* (Olivier, 1807)**

6 ex., La Seyne-sur-Mer, Var (83) sous le nom de
ramphoides ; 2 ex., France, localité non désignée
(N°7247).
Espagne, France, Suisse, Roumanie.

***Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795)**
(= *Rhamphus pullus* Hustache, 1920)

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1271).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Rhamphus subaeneus* Illiger, 1807**

2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) ;
1 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°3711).
Europe moyenne et centrale, Suède.

***Rhynchaenus xylostei* Clairville, 1798**

(= *Curculio lonicerae* Herbst, 1795)
(= *Rhynchaenus lonicerae* Fabricius, 1801)

6 ex., Troyes, Aube (10) sous le nom de *lonicerae*
(N°4447).
France, Italie, Allemagne, Pologne, Slovaquie,
Russie, Finlande.

***Tachyerges decoratus* (Germar, 1821)**

4 ex., Lille, Nord (59) (N°2856).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Tachyerges rufitarsis* (Germar, 1821)**

1 ex., France méridionale (N°2336).
France, Italie, Allemagne, Pologne, Roumanie,
Moldavie, Scandinavie, Russie.

***Tachyerges salicis* (Linnaeus, 1758)**

(= *Orchestes subhirtus* Horn, 1873)
4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°535).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Tachyerges stigma* (Germar, 1821)**

(= *Orchestes confundatus* Schönherr, 1835)
6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1554).
Europe moyenne et centrale, Russie.

Smicronychini

***Smicronyx (Chalybodontus) cyaneus* (Gyllenhal, 1836)**

4 ex., Toulouse, Haute-Garonne (31) (N°4491) ;
2 ex., Maroc, sous le nom de *lallemani* (N°7419).
France méridionale, Italie, Russie du Sud, Algérie,
Maroc.

***Smicronyx (Smicronyx) coecus* (Reich, 1797)**

2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) sous le
nom de *cuscutae* (N°7613).
France, Europe centrale.

***Smicronyx (Smicronyx) jungermanniae* (Reiche, 1797)**

(= *Smicronyx corsicus* Fairmaire, 1861)

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *cicus* ;
1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1885 ;
1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2859).
Europe moyenne et méditerranéenne, Algérie,
Tunisie, Maroc.

***Smicronyx (Smicronyx) tataricus* Faust, 1886**

1 ex., Turcoménie, Turquie (N°9635).

Turkestan, Kazakhstan, Russie centrale.

Storeini

***Aubeonymus carinicolis* (Lucas, 1849)**

2 ex., Daya, Espagne (N°7151).
Espagne, Italie, Sicile.

***Pachytychius asperatus* (Dufour, 1843)**

3 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) sous le nom de *scabricollis* (N°2580).
Portugal, Espagne, France.

***Pachytychius bedeli* Chevrolat, 1881**

1 ex., Daya, Espagne (N°7149).
Syrie ? Aucune donnée valable.

***Pachytychius haematocephalus* (Gyllenhal, 1835)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Saint-Jean-du-Doigt, Finistère (29) (1901) ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) 1898 ; 1 ex., Roscoff, Finistère (29) 1887 ; 2 ex., Santec, Finistère (29) (N°3265).
Angleterre, Espagne, France, Belgique, Allemagne, Tchèque, Suisse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Bosnie, Bulgarie, Grèce.

***Pachytychius kirschi* (Tournier, 1873)**

2 ex., Daya, Espagne (N°7148).
Aucune donnée valable.

***Pachytychius hordei grandicollis* (Waltl, 1835) (= *Tychius squamosus* Gyllenhal, 1835)**

4 ex., Hyères, Var (83) sous le nom de *hordei squamosus* ; 2 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *hordei squamosus* (N°1108).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Albanie, Grèce, Turquie.

***Pachytychius lucasi* Jekel, 1861**

1 ex., Daya, Espagne (N°7150).
Espagne, Sardaigne, Sicile.

***Pachytychius sellatus* (Lucas, 1849)**

2 ex., Oran, Algérie (N°8973).
Sicile.

***Pachytychius sparsutus* (Olivier, 1807)**

4 ex., Toulouse, Haute-Garonne (31) (N°1109) ; 4 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) sous le nom d'*obesus* (N°4331).
Europe moyenne et centrale, Russie.

Styphlini

***Geranorhinus brannani* Schaufuss, 1867**

1 ex., Biskra, Algérie, sous le nom d'*elegans* (N°8539).
Espagne.

***Geranorhinus pusillus* (Motschulsky, 1851)**

1 ex., Caucase, Russie, sous le nom de *seidlitzii* (N°9638).
Sicile, Méditerranée (Libye).

***Orthochaetes insignis* (Aubé, 1863)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2339) ; 2 ex., îles Lavazzi, Corse (N°2339).
Irlande, Angleterre, Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile.



Orthochaetes insignis (© RL)

***Orthochaetes setiger* (Beck, 1817)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *setulosus* ; 2 ex., Santec, Finistère (29) 1902 ; 1 ex., Kervellec, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 2 ex., Le Huelgoat, Finistère (29) ; 1 ex., Trévidy, Plouigneau, Finistère (29) 1882 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°6834).
Europe moyenne, centrale, et septentrionale.

***Pseudostyphlus pillumus* (Gyllenhal, 1835) (= *Rhynchaenus pilumnus* Gravenhorst, 1807)**

7 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) ; 1 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°4667).
Europe, Turquie.

***Styphlus penicillus* Schoenherr, 1826 (= *Styphlus penicillus* Gyllenhal, 1836)**

1 ex., La Seyne-sur-Mer, Var (83) (N°7246).
France, Baléares, Chypre.

Tychiini

***Lignyodes enucleator* (Panzer, 1798)**

2 ex., France, localité non précisée (N°526).
Europe moyenne, centrale, Russie, Turquie.

***Sibinia (Dichotychius) meridionalis* H. Brisout, 1867**

3 ex., Béziers, Hérault (34) (N°5522).
France, Corse, Italie, Sardaigne, Croatie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Sibinia (Dichotychius) sodalis* Germar, 1824**

1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) (N°5520) ; 1 ex., Grèce sous le nom de *statices* (N°9984).

Espagne, France, Angleterre, Allemagne, Danemark,
Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Italie, Grèce.

***Sibinia (Sibinia) arenariae* Stephens, 1831**

2 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Jersey, 1875 (N°3974).
Angleterre, France, Corse, Espagne, Italie,
Sardaigne, Grèce, Turquie, Chypre.

***Sibinia (Sibinia) attalica* (Gyllenhal, 1836)**

6 ex., Bonifacio, Corse (N°1860) ; 1 ex., Lyon, Rhône
(69) sous le nom de *lateralis* ; 2 ex., Bonifacio, Corse
sous le nom de *lateralis* (N°3972) ; 2 ex., Villeneuve-
sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) sous le nom de *silenes*
(N°3693).

Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne,
Sicile, Croatie, Albanie, Macédoine, Bulgarie, Grèce,
Roumanie, Turquie.

***Sibinia (Sibinia) pellucens* (Scopoli, 1772)**

4 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) sous le nom de
cana ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) 1901 (N°1526).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sibinia (Sibinia) phalerata* (Gyllenhal, 1835)**

5 ex., Italie (N°3081).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Sibinia (Sibinia) pyrrhodactyla* (Marsham, 1802)
(= *Sibinia potentillae* Germar, 1824)**

2 ex., Valenciennes, Nord (59) sous le nom de
potentillae ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) 1901 sous
le nom de *potentillae* ; 1 ex., Pernelé, Saint-Martin-
des-Champs, Finistère (29) 1901 sous le nom de
potentillae (N°5508).

Une bonne partie de l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Sibinia (Sibinia) seriata* (Desbrochers, 1873)**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°5509).
Corse, Sardaigne.

***Sibinia (Sibinia) signata* (Panzer, 1809)
(= *Sibinia primita* (Herbst, 1795))**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *primita* ;
1 ex., Madrid, Espagne, sous le nom de *primita*
(N°2047).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sibinia (Sibinia) variata* (Gyllenhal, 1835)**

1 ex., Santec, Finistère (29) (N°3974).
Espagne, Portugal, France, Corse, Italie, Sardaigne,
Sicile, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Turquie.

***Sibinia (Sibinia) viscaria* (Linnaeus, 1761)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Carantec,
Finistère (29) 1878 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor,
1884 ; 1 ex., Saint-Efflam, Plestin-les-Grèves, Côtes-
d'Armor (22) 1878 (N°2166) ; 2 ex., Lyon, Rhône (69)
sous le nom de *fugax* ; 2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin
(67) (N°8531).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sibinia (Sibinia) vittata* Germar, 1824
(= *Sibinia indigena* Desbrochers, 1907)**

1 ex., Styrie, Autriche, sous le nom de *zebra*
(N°6377).

Europe moyenne, centrale, Russie, Turquie.

***Tychius (Apeltarius) amplicollis* Aubé, 1850**

1 ex., Sardaigne (N°9983).

Corse, Italie, Sardaigne, Sicile.

***Tychius (Tychius) affinis* Becker, 1864**

1 ex., Turquie (N°5518).

Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) albilateratus* Stierlin, 1863**

1 ex., localité non précisée (N°3941).

Russie.

***Tychius (Tychius) argentatus* Chevrolat, 1859**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°1859).

Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie,
Macédoine, Grèce, Bulgarie, Moldavie, Turquie.

***Tychius (Tychius) astragali* Becker, 1862**

2 ex. Sarepta (?), (Sarafand), Liban (N°3940).

Russie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine.

***Tychius (Tychius) aureolus* Kiesenwetter, 1852**

4 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) sous
le nom d'*albovittatus* (N°4665).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) bivittatus* Perris, 1866**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°1515).

Corse, Sardaigne.

***Tychius (Tychius) capucinus* Boheman, 1843**

2 ex., Corse (N°1858).

Espagne, Baléares, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Grèce.

***Tychius (Tychius) cinnamomeus* Kiesenwetter, 1852**

2 ex., Perpignan, Pyrénées-Orientales (66)
(N°5514) ;

3 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) sous
le nom de *suturalis* (N°4666).

Espagne, France, Italie.

***Tychius (Tychius) consputus* Kiesenwetter, 1864
(= *Tychius acuminirostris* C. Brisout de Barneville,
1866)**

1 ex., Fiume, Italie (N°9671).

Espagne, Corse, Italie, Sicile, Grèce, Macédoine,
Bulgarie, Turquie.

***Tychius (Tychius) corsosardous* Caldara, 2013
(= *Tychius bivittatus* Perris, 1866)**

1 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom de *bivittatus*
(N°1515)

Corse, Sardaigne.

***Tychius (Tychius) cuprifer* (Panzer, 1799)**

4 ex., France, localit  non pr cis e ; 2 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) (N 1581).

Europe moyenne, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) flavus* Becker, 1864**

1 ex., Turquie (N 5517) ; 1 ex., Dobrudscka, Bulgarie sous le nom de *brunnensis* (N 8052).

Corse, Italie, Autriche, Tch quie, Slovaquie, Hongrie, Slov nie, Croatie, Bosnie, Serbie, Mac doine, Bulgarie, Gr ce, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) junceus* (Reich, 1797)**

6 ex., Morlaix, Finist re (29) sous le nom d'*haematopus* (N 8485) (N 3697) ; 1 ex., Roscoff, Finist re (29) (N 8485) ; 5 ex., Morlaix, Finist re (29) sous le nom de *curtus* (N 3696).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) lineatulus* Stephens, 1831**

1 ex., Dunkerque, Nord (59) (N 8896).

Europe moyenne, centrale, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) longicollis* C. Brisout, 1863**

3 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) (N 3695).

Espagne, France, Corse, Italie, Croatie.

***Tychius (Tychius) longulus* Desbrochers, 1873**

1 ex., Russie du Sud (N 5519).

Russie.

***Tychius (Tychius) medicaginis* C. Brisout, 1863**

1 ex., Evreux, Eure (27) (N 6260).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) melloti* Stephens, 1831**

5 ex., Belgique (N 5516).

Toute l'Europe, Russie, Turquie

***Tychius (Tychius) morawitzi* Becker, 1864**

3 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N 1787).

Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) parallelus* (Panzer, 1794)**

(= *Tychius genistae* Boheman, 1843)

5 ex., Morlaix, Finist re (29) sous le nom de *venustus* ; 2 ex., Autriche (N 1097) ; 1 ex., L'Escorial, Espagne sous le nom de *genistaecola* (N 3026) ; 2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *genistae* (N 2858).

Europe moyenne et centrale.

***Tychius (Tychius) picirostris* (Fabricius, 1787)**

8 ex., Morlaix, Finist re (29) (N 6202).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) polylineatus* (Germar, 1824)**

1 ex., Carniole, Slov nie (N 2857).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) pumilus* C. Brisout, 1863**

4 ex., Lyon, Rh ne (69) (N 8530).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Tychius (Tychius) pusillus* Germar, 1842**

2 ex., Corse, sous le nom de *neapolitanus* (N 5896) ; 4 ex., Morlaix, Finist re (29) ; 2 ex.,

Corse, sous le nom de *pygmaeus* (N 1857).

Europe moyenne et centrale, Bi lorussie.

***Tychius (Tychius) quinquepunctatus quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finist re (29) (N 573).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) rufirostris* Schonherr, 1832**

1 ex., Caucase, Russie (N 9651).

Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) schneideri* (Herbst, 1795)**

5 ex., Lyon, Rh ne (69) ; 1 ex., Lille, Nord (59) (N 8529).

Europe moyenne, centrale, Russie.

***Tychius (Tychius) squamulatus* Gyllenhal, 1835**

3 ex., Morlaix, Finist re (29) sous le nom de *flavicollis* ; 1 ex., Vienne, Autriche (N 2048).

Europe moyenne et centrale.

***Tychius (Tychius) stephensi* Sch nherr, 1835**

(= *Curculio tomentosus* Herbst, 1795)

7 ex., Morlaix, Finist re (29) sous le nom de *tomentosus* (N 1111).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Tychius (Tychius) striatulus* Gyllenhal, 1835**

6 ex., Perpignan, Pyr n es-Orientales (66) (N 5513) ; 2 ex., B ne, Alg rie sous le nom de

fuscolineatus ; 1 ex., Andalousie, Espagne (N 8528) ; 4 ex., Barcelone, Espagne sous le nom de *decoratus* (N 4157).

Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Gr ce, Turquie.

***Tychius (Tychius) sulphureus* Faust, J, 1881**

1 ex., Caucase, Russie (N 9652).

Russie.

***Tychius (Tychius) thoracicus* Boheman, 1843**

1 ex., Dalmatie, Croatie (N 7423).

Italie, Sicile, Croatie, Bosnie, Mac doine, Bulgarie, Gr ce, Turquie.

***Tychius (Tychius) tibialis* Boheman, 1843**

2 ex., Corse (N 2559).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

Bagoinae

***Bagous alismatis* (Marsham, 1802)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*Hydronomus alismatis* ; 1 ex., étang de Kerangomar, Taulé, Finistère (29) 1885 sous le nom d'*Hydronomus alismatis* (N°5091).

Europe occidentale et centrale, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Bagous argillaceus* Gyllenhal, 1836**

1 ex., sud de la Russie (N°5538).
Europe, Turquie.

***Bagous claudicans* Boheman, 1845**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Saint-Jean-du-Doigt, Finistère (29) 1870 (N°9045)

***Bagous collignensis* (Herbst, 1797)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *claudicans* ; 2 ex., Saint-Jean-du-Doigt, Finistère (29) 1870 ; 1 ex., Penmarch, Finistère (29) 1885 (N°9045) ; 7 ex., Bordeaux, Gironde (33) (N°2555).

Une bonne partie de l'Europe, Suède, Finlande, Russie.

***Bagous czwalinai* Seidlitz, 1891**

1 ex., Coatconggar, Ploujean, Finistère (29) sous le nom d'*haesleri* (N°6938). 2 ex., Morlaix, Finistère (29), Kéranroux ; 1 ex., La Boissière, Ploujean, Finistère (29), sous le nom de *revelieri* ssp *haesleri* (N°5539).

Angleterre, Allemagne, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Danemark, Suède, Finlande, Ukraine

***Bagous elegans* (Fabricius, 1801)**

1 ex., Allemagne sous le nom de *Dicranthus elegans* (N°9366).

France, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Russie.

***Bagous frit* (Herbst, 1795)**

2 ex., Bonifacio, Corse ; 2 ex., Hongrie (N°506).
Une partie de l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Bagous limosus* (Gyllenhal, 1827)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) 1885, 1905 ; 1 ex., Penmarch, Finistère (29) 1883 (N°6939).
Europe, Turquie.

***Bagous lutosus* (Gyllenhal, 1813)**

4 ex., Paris, Seine (75) (N°7612).
Europe, Russie, Turquie.

***Bagous lutulentus* Gyllenhal, 1813**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *nigratarsis* ; 1 ex., Lesquiffou, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1882 (N°7570).
Europe, Russie, Turquie.

***Bagous lutulosus* (Gyllenhal, 1827)**

1 ex., Kerfaven, Ploujean, Finistère (29) 1884 ;
1 ex., Coatconggar, Ploujean, Finistère (29) 1882 ;
1 ex., Le Launay, Plougasnou, Finistère (29) 1885 (N°7569).
Europe, Russie.



Bagous lutulosus (© RL)

***Bagous nodulosus* Gyllenhal, 1836**

5 ex., Bohème, Tchéquie (N°5002).
Europe, Russie.

***Bagous petro* (Herbst, 1795)**

6 ex., Lille, Nord (59) (N°9668) ; 1 ex., Marly-le-Roi, Yvelines (78) sous le nom d'*aubei* (N°7611).
Angleterre, France, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Italie, Autriche, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie.



Bagous petro (© RL)

***Bagous revelieri* Tournier, 1874**

3 ex., Bonifacio, Corse ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) ?, douteux ; 1 ex., La Boissière, Ploujean, Finistère (29), (N°5539) ?, douteux.
Corse, Espagne

***Bagous subcarinatus* Gyllenhal, 1836**

1 ex., Autriche (N°7488).
Europe, Suède, Turquie.



Bagous subcarinatus (© RL)

***Bagous tempestivus* (Herbst, 1795)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°507).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Bagous tubulus* Caldara & O'Brien, 1994
(= *Curculio cylindrus* Paykull, 1800)**

3 ex., Prague, Tchéquie sous le nom de *cylindrus* ;
4 ex., Lille, Nord (59) sous le nom de *cylindrus* ; 1 ex.,
Le Plantay, Ain (01) sous le nom de *cylindrus*
(N°5122).
Europe occidentale et centrale, Suède, Turquie.

***Bagous validus* Rosenhauer, 1847**

1 ex., Hongrie (N°9636).
Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie,
Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie, Macédoine, Grèce,
Turquie, Russie.

Ceutorhynchinae

Amalini

***Amalus scortillum* (Herbst, 1795)**

(= *Curculio haemorrhous* Herbst, 1795)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom
d'*haemorrhous* (N°1964).
Toute l'Europe, Russie.

Ceutorhynchini

***Amalorrhynchus melanarius* (Stephens, 1831)**

1 ex., France, localité non signalée (N°8054).
Europe moyenne et centrale, Turquie.



Amalorrhynchus melanarius (© RL)

***Boragosirocalus rinderae* (Becker, 1864)**

3 ex., Sud de la Russie (N°2792).
Russie.

***Calosirus apicalis* (Gyllenhal, 1827)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Kergollo,
Ploujean, Finistère (29) 1884 (N°6641).
Europe moyenne, Scandinavie, Russie.

***Calosirus terminatus* (Herbst, 1795)**

1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3878).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus aeneicollis* Germar, 1824**

4 ex., Madrid, Espagne (N°4333).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Ceutorhynchus algericus* C. Brisout, 1869**

2 ex., Espagne (?) (N°8057).
Sicile.

***Ceutorhynchus alliariae* H. Brisout, 1860**

2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78)
(N°6943).
Europe moyenne et centrale.

***Ceutorhynchus arator* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Bohême, Autriche (N°6374).
Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Ukraine,
Roumanie, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792)**

(= *Curculio pleurostigma* Marsham, 1802)

1 ex., Dobrudscha, Bulgarie sous le nom de
granulicollis ; 1 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) ;
3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°8056) ; 1 ex.,
Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 2 ex., Madrid, Espagne
(N°2347).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus atomus* Boheman, 1845**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
setosus ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22)
1884 ; 1 ex., Sainte-Geneviève, Ploujean, Finistère
(29) 1879 (N°4793).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Ceutorhynchus barbareae* Suffrian, 1847**

1 ex., Concarneau, Finistère (29) 1883 ; 1 ex.,
Roscoff, Finistère (29) 1884 ; 1 ex., Kerlaudy,
Ploujean (29) 1885 ; 1 ex., Penvern, Pleyber-Christ
(29) 1878 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22)
(N°6640).
Europe, Russie.

***Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1824**

(= *Ceutorhynchus moguntiacus* Schultze, 1895)

1 ex., Carniole, Slovénie, sous le nom de *timidus*
(N°8814) ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex.,
Penvern, Pleyber-Christ, Finistère (29) 1890 ; 1 ex.,

La Boissière, Ploujean, Finistère (29) 1891 ; 1 ex.,
Kergolio, Ploujean, Finistère (29) 1881 ; 1 ex., Saint-
Eflam, Plestin-les-Grèves, Côtes-d'Armor (22) 1878
(N°2568).

Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget, 1857**

2 ex., Dijon, Côte-d'Or (21) (N°6445).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus cochleariae* (Gyllenhal, 1813)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*atratus* ;
1 ex., Moulin Rivoalen, Plouigneau, Finistère (29)
1884 ; 1 ex., Keramprat, Saint-Martin, Finistère (29)
1889 (N°2042)

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus constrictus* (Marsham, 1802)**

2 ex., France, localité non précisée (N°7429) ; 3 ex.,
Aranjuez, Espagne sous le nom de *fallax* ; 2 ex.,
Oran, Algérie (N°7580).

Europe moyenne, Finlande, Grèce, Turquie.

***Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802)**

(= *Ceutorhynchus minutus* (Reich, 1797)

(= *Ceutorhynchus pallipes* (Crotch, 1866)

(= *Ceutorhynchus flavicornis* (Hustache, 1914)

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Santec, Finistère
(29) ; 2 ex., Saint-Jean-du-Doigt, Finistère (29) ;
1 ex., Kersco, Ploujean, Finistère (29) 1883 ; 1 ex.,
Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) 1890 ; 1 ex.,
Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°2566).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787)**

1 ex., Penalliorzou, Ploujean (29) 1890 ; 2 ex.,
Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Parc-au-Duc, Morlaix,
Finistère (29) (N°539).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus fabrilis* (Faust, 1887)**

1 ex., Turcoménie, Arménie (N°9070).

Sud-est de l'Europe, Sibérie, Kazakhstan, Asie,
Mongolie, Asie Mineure

***Ceutorhynchus flavomarginatus* Lucas, 1846**

1 ex., Bône, Algérie (N°5508).

Espagne.

***Ceutorhynchus fulvitaris* Gougelet & H. Brisout, 1860**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Moulin Rivoalen,
Plouigneau, Finistère (29) 1883 ; 1 ex., Trévidy,
Plouigneau, Finistère (29) 1883 ; 1 ex., Penalliorzou,
Ploujean, Finistère (29) 1886 ; 1 ex., Le Cosquérou,
Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Kerserho, Saint-
Martin, Finistère (29) 1901 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-
d'Armor (22) (N°7566).

Portugal, Espagne, France, Italie, Autriche, Bosnie,
Bulgarie, Grèce

***Ceutorhynchus grenieri* Gougelet & H. Brisout, 1860**

2 ex., France, localité non précisée (N°7432).

Espagne, France, Italie, Sicile, Grèce.

***Ceutorhynchus hepaticus* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°7568).

Angleterre, France, Italie, Turquie.

***Ceutorhynchus hirtulus* Germar, 1824**

1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) ;

1 ex., Saint-Eflam, Plestin-les-Grèves, Côtes-
d'Armor (22) 1878 (N°3682).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus intersetosus* Weise, 1883**

1 ex., Bône, Algérie (N°5526).

Portugal, Espagne, France, Turquie.

***Ceutorhynchus laetus* Rosenhauer, 1856**

1 ex. Hongrie sous le nom de *smaragdinus*
(N°8059).

Espagne, France, Italie, Sicile, Hongrie, Croatie,
Roumanie, Grèce.

***Ceutorhynchus lepieuri* C. Brisout, 1881**

2 ex., Bône, Algérie (N°4169).

Portugal, Espagne, France, Corse, Allemagne,
Italie, Sardaigne, Sicile, Suisse, Autriche, Slovaquie,
Croatie, Bosnie, Pologne, Grèce, Turquie.

***Ceutorhynchus leucorhamma* Rosenhauer, 1856**

3 ex., Madrid, Espagne (N°5527).

Espagne, France.

***Ceutorhynchus micans* C. Brisout, 1869**

2 ex., Oran, Algérie (N°8968).

Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Autriche,
Bosnie.

***Ceutorhynchus nanus* Gyllenhal, 1837**

(= *Ceutorhynchus angustulus* Gyllenhal, 1837)

3 ex., Hongrie (N°7430).

Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus napi* Gyllenhal, 1837**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Saint-
Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°2865).

Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Suisse, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie,
Pologne, Bulgarie, Hongrie.

***Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsham, 1802)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
quadridens (N°2043).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus parvulus* C. Brisout, 1869**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliorzou,
Ploujean, Finistère (29) 1886 (N°2567).

Europe moyenne, Turquie.

***Ceutorhynchus picitarsis* Gyllenhal, 1837**

3 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) ; 1 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Grèce (N°3680).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Ceutorhynchus posthumus* Germar, 1824**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Carantec, Finistère (29) 1878 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°3684).
Europe moyenne, Turquie.

***Ceutorhynchus pulvinatus* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Autriche (N°3879).
Europe, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus pumilio* Gyllenhal, 1827**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Carantec, Finistère (29) 1878 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°3684).
Europe moyenne, Turquie.

***Ceutorhynchus puncticollis* Boheman, 1845**

5 ex., Autriche (N°5131).
Europe moyenne et centrale, Russie

***Ceutorhynchus pyrrhorhynchus* (Marshall, 1802)**

2 ex., Concarneau, Finistère (29) 1889 ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) 1884 ; 1 ex., Santec, Finistère (29) 1870 (N°6842) ; 3 ex., Dobrudscha, Bulgarie, sous le nom d'*achillae* (N°7039).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Ceutorhynchus querceti* (Gyllenhal, 1813)**

5 ex., Lyon, Rhône (69) (N°8533).
Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Italie, Slovénie, Hongrie, Scandinavie, Russie.

***Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Mont-de-Marsan, Landes (40) (N°3889).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Ceutorhynchus rusticus* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2863). Portugal, Espagne, France, Allemagne, Italie, Sicile, Roumanie, Grèce.

***Ceutorhynchus schoenherri* C. Brisout, 1869**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) 1884 (N°7896).
France.

***Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°547) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *cyanipennis* ; 2 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°6645).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Turquie.

***Ceutorhynchus syrites* Germar, 1824**

6 ex., Lille, Nord (59) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2864).
Europe moyenne, centrale, Russie, Turquie.

Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795)*(= *Ceutorhynchus floralis* Paykull, 1792)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 sous le nom de *floralis* ; 1 ex., Le Cosquerou, Ploujean, Finistère (29) 1884 (N°2348).

Toute l'Europe entière, Russie, Turquie.

***Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pennelé, Saint-Martin, Finistère (29), 1892 ; 1 ex., Lille, Nord (59) ; 2 ex., Prague, Tchéquie (N°5124).
Europe, Russie, Turquie.

***Coeliodes ilicis* (Bedel, 1885)**

1 ex., Hyères, Var (83) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°9154).

Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sicile, Sardaigne, Belgique, Allemagne, Bosnie, Grèce.

Coeliodes rana* (Fabricius, 1787)*(= *Curculio dryados* Gmelin, 1790)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *quercus* (N°545).

Toute l'Europe, Turquie.

***Coeliodes ruber* (Marshall, 1802)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°3227).

Europe moyenne, Scandinavie, Turquie.

Coeliodes transversealbofasciatus* (Goeze, 1777)*(= *Curculio cinctus* Geoffroy, 1785)****(= *Curculio erythroleucus* Gmelin, 1790)**

9 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *cinctus* (N°546).

Europe, Turquie.

***Coeliodes trifasciatus* Bach, 1854**

1 ex., Carniole, Slovénie (N°9987).

Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Coeliodinus rubicundus* (Herbst, 1795)**

4 ex., Saint-Eutrope, Saintes, Charente-Maritime (16) (N°1559).

Europe, Russie, Turquie.

***Datonychus angulosus* (Boheman, 1845)**

1 ex., Grandlieu, Loire-Atlantique (44) (N°7579).

Europe moyenne et centrale.

Datonychus arquatus* (Herbst, 1795)*(= *Curculio arquatus* Herbst, 1795)**

2 ex., Lille, Nord (59) ; 2 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°8898).

Europe, Russie.

***Datonychus melanostictus* (Marsham, 1802)**

8 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Lesquiffiou, Pleyber-Christ, Finistère (29) 1901 (N°6644).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Drupenatus nasturtii* (Germar, 1824)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 3 ex., Bonifacio, Corse, (N°1863).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Bulgarie, Turquie.



Drupenatus nasturtii (© RL)

***Ethelcus denticulatus* (Schrank, 1781)**

(= ***Curculio dentatus* Panzer, 1798**)

2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) sous le nom de *dentatus* ; 2 ex., Troyes, Aube (10) (N°3692).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Ethelcus verrucatus* (Gyllenhal, 1837)**

1 ex., Saint-Raphaël, Var (83) (N°6088).
Angleterre, France, Allemagne, Italie, Sicile, Ukraine, Turquie.

***Eucoeliodes mirabilis* (A. Villa & J. B. Villa, 1835)**

1 ex., Dalmatie sous le nom de *Coeliodes zonatus* (N°6080).
Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, Italie, Croatie.

***Glocianus distinctus* (C. Brisout, 1870)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *marginatus* ; 1 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°2344).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Glocianus moelleri* (C. G. Thomson, 1868)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *rotundatus* ; 1 ex., Pennelé, Saint-Martin, Finistère (29) 1881 ; 1 ex., Santec, Finistère (29) 1902 ; 2 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°6844).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Glocianus pilosellus* (Gyllenhal, 1837)**

4 ex., Santec, Finistère (29) ; 1 ex., Kerlaudy, Plouénan, Finistère (29) 1884 (N°6283).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Glocianus punctiger* (C. R. Sahlberg, 1835)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) 1886 ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1886 ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) ; 1 ex., Le Mans, Sarthe (72) (N°6087).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Hadroplontus litura* (Fabricius, 1775)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Saint-Malo, Ille-et-Vilaine (N°5190).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Hadroplontus trimaculatus* (Fabricius, 1775)**

1 ex., Loire-Atlantique (44) ; 1 ex., forêt de Gâvres, Loire-Atlantique (44) ; 2 ex., Madrid, Espagne (N°541).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Micrelus ericae* (Gyllenhal, 1813)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47) (N°2163).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Micrelus ferrugatus* (Perris, 1847)**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°5867).
Portugal, Espagne, France, Corse, Grèce.

***Microplontus campestris* (Gyllenhal, 1837)**

1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 ; 5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1281).
Toute l'Europe, Russie.

***Microplontus molitor* (Gyllenhal, 1837)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Saint-Jean-du-Doigt, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1886 (N°4796).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Suisse, Croatie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.

***Microplontus rugulosus* (Herbst, 1795)**

(= ***Rhynchaenus chrysanthemi* Gyllenhal, 1827**)

(= ***Ceuthorhynchus figuratus* Gyllenhal, 1837**)

(= ***Ceuthorhynchus rubiginosus* Schultz, 1897**)

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *figuratus* (N°2866) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Coatcongarr, Ploujean, Finistère (29) 1881 ; 1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Saint-Pol-de-Léon, Finistère (29) 1884 (N°3877).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Microplontus triangulum* (Boheman, 1845)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Dourduff-en-Terre, Ploujean, Finistère (29) 1888 ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1886 ; 3 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°8484).
Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Mogulones abbreviatulus* (Fabricius, 1792)**

1 ex., France, localit  non pr cis e (N 540).
Europe moyenne et centrale, Russie.

***Mogulones albosignatus* (Gyllenhal, 1837)**

2 ex., Hongrie (N 8058).
France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse,
Autriche, Pologne, Tch quie, Slovaquie, Hongrie,
Ukraine, Slov nie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Mac doine, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Turquie.

***Mogulones asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813)**

4 ex., Morlaix, Finist re (29) ; 1 ex., Carantec,
Finist re (29) 1887 ; 1 ex., Penmarch, Finist re (29)
1889 ; 1 ex., Coatcongarr, Ploujean, Finist re (29)
1882 (N 2867).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Mogulones borraginis* (Fabricius, 1792)**

1 ex., Montpellier, H rault (34) (N 7581).
Europe moyenne et centrale.

***Mogulones geographicus* (Goeze, 1777)**

5 ex., Saint-Malo, Ille-et-Vilaine (35) sous le nom
d'*echii* ; 1 ex., Troyes, Aube (10) (N 538).
Toute l'Europe, Turquie.

***Mogulones javetii* (Gerhardt, 1867)**

1 ex., Autriche (N 9980).
Europe centrale, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Mogulones larvatus* (Schultze, 1897)**

4 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N 8676).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Mogulones pallidicornis* (Gougelet & H. Brisout, 1860)**

2 ex., Lyon, Rh ne (69).
France, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne,
Danemark, Su de, Pologne, Tch quie, Slovaquie,
Hongrie, Slov nie, Roumanie, Moldavie, Bulgarie,
Russie.

***Mogulones peregrinus* (Gyllenhal, 1837)**

5 ex., Barcelone, Espagne (N 6930).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Turquie.

***Mogulones raphani* (Fabricius, 1792)
(= *Ceuthorrhynchus symphiti* Bedel, 1885)**

6 ex., France, localit  non pr cis e (N 2431).
France, Europe centrale.

***Mogulones soricinus* (C. Brisout, 1869)**

1 ex., Oran, Alg rie (N 8989).
Espagne.

***Mogulones t-album* (Gyllenhal, 1837)**

2 ex., Caucase (N 9645).
Ukraine, Turquie.

***Mogulones trisignatus* (Gyllenhal, 1837)**

1 ex., Styrie (?) (N 9981).
Ukraine, Gr ce, Turquie.

***Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finist re (29) (N 2249).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.



Nedyus quadrimaculatus (  RL)

***Neoglocianus albovittatus* (Germar, 1824)**

1 ex., Hongrie (N 8055).
France, Italie, Autriche, Tch quie, Slovaquie,
Hongrie, Gr ce, Bulgarie, Turquie.

***Neoglocianus maculaalba* (Herbst, 1795)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Troyes,
Aube (10) ; 1 ex., Oran, Alg rie (N 2862).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Oprohinus consputus* (Germar, 1824)**

1 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) sous le
nom d'*alboscuteatus* (N 3673).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Oprohinus suturalis* (Fabricius, 1775)**

1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N 3879).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Parethelcus pollinarius* (Forster, 1771)**

5 ex., Morlaix, Finist re (29) (N 2041).
Europe enti re, Scandinavie, Russie, Turquie.



Parethelcus pollinarius (  RL)

***Phrydiuchus topiarius* (Germar, 1824)**

6 ex., Nice, Alpes-Maritimes (06), 1851 ; 1 ex.,
Toulon, Var (83) (N°7582).
Europe moyenne et centrale, Ukraine.

***Poophagus sisymbrii* (Fabricius, 1776)**

2 ex., Valenciennes, Nord (49) (N°548).
Europe, Russie.

***Prisistus obsoletus* (Germar, 1824)**

1 ex., Espagne (N°9982).
Portugal, Espagne, Allemagne, Suisse, Autriche,
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie,
Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Grèce,
Turquie.

***Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal, 1813)
(= *Curculio nigrinus* Marsham, 1802)**

1 ex., Ganat, Allier (03) ; 1 ex., Penmarch, Finistère
(29) sous le nom de *nigrinus* 1889 (N°5525).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sirocalodes mixtus* (Mulsant & Rey, 1858)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Beuzec, Cap-
Sizun, Finistère (29) 1883 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-
d'Armor (22) 1884 (N°5191).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne,
Sicile, Angleterre, Pays-Bas, Croatie, Hongrie,
Roumanie, Turquie, Chypre.

***Sirocalodes quercicola* (Paykull, 1792)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Sainte-
Geneviève, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Kerserho,
Saint-Martin, Finistère (29) ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-
d'Armor (22) 1884 (N°6937).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Stenocarus cardui* (Herbst, 1784)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *guttula* ;
1 ex., Santec, Finistère (29), 1882 ; 1 ex., Le Launay,
Telgruc, Finistère (29), 1879 (N°2038) ;
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Stenocarus ruficornis* (Stephens, 1831)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29), sous le nom de
fuliginosus (N°2037).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Thamiocolus pubicollis* (Gyllenhal, 1837)**

1 ex., Auch, Gers (32) (N°9497).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Thamiocolus signatus* (Gyllenhal, 1837)**

1 ex., Hongrie (N°8804).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Thamiocolus viduatus* (Gyllenhal, 1813)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2040).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie.

***Trichosirocalus barnevillei* (Grenier, 1866)**

3 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie,
Turquie.

***Trichosirocalus dawsoni* (C. Brisout, 1869)**

2 ex., Saint-Efflam, Côtes-d'Armor (22) 1878 ; 1 ex.,
Barnenez, Plouézoch, Finistère (29) 1880 (N°6843).
Irlande, Angleterre, France, Espagne, Portugal.

***Trichosirocalus horridus* (Panzer, 1801)**

3 ex., Santec, Finistère (29) (N°2632).
Europe moyenne et centrale, Turquie.

***Trichosirocalus rufulus* (Dufour, 1851)**

1 ex., Kérarmel, Plouézoch, Finistère (29) 1885
sous le nom de *frontalis* ; 3 ex., Villeneuve-sur-Lot,
Lot-et-Garonne (47) (N°3677).
Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre,
Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Sicile, Pologne,
Hongrie, Croatie, Bosnie, Bulgarie, Grèce.

***Trichosirocalus urens* (Gyllenhal, 1837)**

2 ex., Toscane, Italie (N°7171).
Portugal, Espagne, France, Italie, Sicile, Croatie,
Pologne, Albanie, Grèce, Bulgarie, Turquie.

***Zacladus exiguus* (Olivier, 1807)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2044).
Europe moyenne, Turquie.

***Zacladus geranii* (Paykull, 1800)**

(= *Curculio affinis* Paykull, 1792)

1 ex. Allemagne, sous le nom d'*affinis* (N°2565).
Europe, Russie, Turquie.

Cnemogonini

***Auleutes epilobii* (Paykull, 1800)**

5 ex., France, localité non précisée ; 1 ex.,
Valenciennes, Nord (59) (N°7427).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie.

Hypurini

***Hypurus bertrandi* (Perris, 1852)**

2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3683).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Croatie, Turquie.

***Pseudophytobius acalloides acalloides* (Fairmaire, 1857)**

(= *Pseudophytobius salicorniae* Hustache, 1930)

4 ex., Béziers, Hérault (34) (N°2825).
Espagne, France, Corse, Sardaigne, Sicile.

Mononychini

***Mononychus punctumalbum* (Herbst, 1784)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *pseudoacori* ; 1 ex., Kergolio, Ploujean, Finistère (29), 1901 (N°536) ; 1 ex., Gannat, Allier (03) sous le nom de *salviae* (N°5503).

Toute l'Europe.



Mononychus punctumalbum (© RL)

Phytobiini

***Eubrychius velutus* (Beck, 1817)**

2 ex., localité non fournie (N°7589).

Une bonne partie de l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Marmaropus besseri* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Localité illisible (N°9978).

France, Europe centrale, Ukraine, Russie.

***Neophytobius quadriodosus* (Gyllenhal, 1813)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°6200) ; 3 ex., Lille, Nord (59) ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) ; 2 ex., Moravie, Tchéquie (9063).

Europe, Russie.

***Pelenomus canaliculatus* (Fåhraeus, 1843)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°7573).

Toute l'Europe., Russie.



Pelenomus canaliculatus (© RL)

***Pelenomus commari* (Panzer, 1794)**

(= *Pelenomus comari* (Herbst, 1795))

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rivoalen, Plouigneau, Finistère (29) 1879 ; 1 ex., Lesquiffiou, Pleyber-Christ, Finistère (29) 1891 (N°4795).

Toute l'Europe.

***Pelenomus quadricorniger* (Colonnelli, 1986) (= *Rhynchaenus quadricornis* Gyllenhal, 1813)**

2 ex., Paris, Seine (75) (N°2345).

Une bonne partie de l'Europe, Russie.



Pelenomus quadricorniger (© RL)

***Pelenomus quadrituberculatus* (Fabricius, 1787)**

8 ex., Morlaix, Finistère (29), (N°7574) ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) sous le nom de *notula* (N°2039).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Pelenomus waltoni* (Boheman, 1843)**

9 ex., France, lieu non précisé (N°7428).

Toute l'Europe.

***Phytobius leucogaster* (Marshall, 1802)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Terrévez, Finistère (29) 1886) ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) 1895 (N°7572).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Rhinoncus albicinctus* Gyllenhal, 1837**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Le Plantay, Ain (01) ; 2 ex., Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire (71) (N°5192).

Europe moyenne, Russie, Turquie.

***Rhinoncus bruchoides* (Herbst, 1784)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°4794).

Pratiquement toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Rhinoncus castor* (Fabricius, 1792)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2116).

Europe, Russie, Turquie.

***Rhinoncus inconspicuous* (Herbst, 1795)**

(= *Curculio gramineus* Fabricius, 1792)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *gramineus* ; 3 ex., Penmarch, Finistère (29), 1883 (N°544).

Europe entière, Russie, Turquie.



Rhinoncus inconspectus (© RL)

***Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Santec, Finistère (29) 1889 (N°1099).
Europe entière, Russie, Turquie.



Rhinoncus pericarpus (© RL)

***Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°3262) ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *subfasciatus* ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°7583).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.



Rhinoncus perpendicularis (© RL)

Scleropterini

***Rutidosoma graminosus* Gistel, 1857
(= *Curculio globulus* Herbst, 1795)**

2 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78) (N°2046)
sous le nom de *globulus*.
Europe continentale et centrale, Russie, Turquie.

***Scleropterus offensus* Boheman, 1837**

1 ex., Oberkrain, Slovénie (N°9641).
Italie, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie.

***Scleropterus serratus serratus* (Germar, 1824)**

2 ex., Styrie, Autriche (N°4146).
Europe centrale, Scandinavie, Russie.

***Tapinotus sellatus* (Fabricius, 1794)**

1 ex., Carniole, Slovénie ; 2 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2569).
Europe, Russie.

Conoderinae

Coryssomerini

***Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2850).
Une partie de l'Europe, Russie, Turquie.

Cossoninae

Choerorhinini

***Choerorhinus squalidus* Fairmaire, 1857**

1 ex., Italie (N°9640)
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sicile, Bosnie, Turquie.

Cossonini

***Cossonus (Caenocossonus) cylindricus* Sahlberg, 1835**

4 ex., Autriche (N°3441).
Europe moyenne, Ukraine, Russie, Turquie.

***Cossonus (Cossonus) linearis* (Fabricius, 1775)
(= *Cossonus planatus* Bedel, 1885)**

4 ex., France, localité non signalée, sous le nom de *planatus* ; 1 ex., Prague, Tchéquie, (N°199).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Cossonus (Cossonus) parallelepipedus* (Herbst, 1795)
(= *Cossonus linearis sensu Hoffmann, 1955*)**

1 ex., France, localité non indiquée ; 1 ex., Bohème, Tchéquie (N°5177)
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Mesites aquitanus* Fairmaire, 1859**

2 ex., France, localité non indiquée (N°7175).
Portugal, Espagne, Italie, Turquie.

***Mesites cunipes* Boheman, 1838**

1 ex., Marseille, Bouches-du-Rhône (13) (N°6086).
Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce, Turquie.

***Mesites pallidipennis* Boheman, 1838**

1 ex., France, localité inconnue (N°3806).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie,

Sicile, Sardaigne, Croatie, Grèce, Turquie.

Dryotribini

***Amaurorhinus bewickianus* (Wollaston, 1860)**

1 ex., Sardaigne (N°9634).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Italie, Sicile,
Grèce, Turquie.

***Cotaster uncipes* Boheman, 1838**

1 ex., Caucase, Russie. sous le nom de *cuneipennis*
(N°9364).
Espagne, France, Italie.

***Cotaster cuneipennis* (Aubé, 1850)**

1 ex., Caucase, Russie. (N°9364).
Espagne, France, Italie.

***Echinomorphus ravouxi* (Jacquet, 1888)**

1 ex., Nyons, Drôme (26) (N°8879).
France, Italie.

Onycholipini

***Brachytemnus porcatu* (Germar, 1824)**

4 ex., Porto-Vecchio, Corse (N°2250).
Une bonne partie de l'Europe, Turquie.

***Hexarthrum exiguum* (Boheman, 1838) (= *Rhyncholus culinaris* Germar, 1824)**

2 ex., Pologne (N°4390).
Une bonne partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Pselactus spadix spadix* (Herbst, 1795)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Santec, Finistère
(29) 1878 ; 1 ex., Bonifacio, Corse (N°1864).
Pratiquement toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Pseudophloeophagus truncorum* (Stephens, 1831) (= *Pseudophloeophagus aeneopiceus* (Boheman, 1845)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29), 1882, sous le nom de
Caulotrupodes aeneopiceus ; 1 ex., Rennes, Ille-et-
Vilaine (35), sous le nom de *Caulotrupodes*
aeneopiceus ; 1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-
Garonne (47) sous le nom de *Caulotrupodes*
aeneopiceus (N°2252).
Portugal, Espagne, France, Corse, Suisse, Autriche,
Pologne, Grèce, Russie.

***Stenoscelis submuricata* (Schoenherr, 1832)**

4 ex., Bonifacio, Corse (N°5898) ; 1 ex., Menton,
Alpes-Maritimes (06) sous le nom de *simum*
(N°5320).
Portugal, Espagne, France, Corse, Suisse, Autriche,
Italie, Sicile, Turquie.

***Stereocorynes truncorum* (Germar, 1824)**

2 ex., Belgique (N°6085).
Toute l'Europe, Turquie.

Pentarthrini

***Pentarthrum huttoni* Wollaston, 1854**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penallorizou,
Ploujean, Finistère (29), 1886 ; 1 ex., Coatconggar,
Plujean, Finistère (29), 1882 ; 1 ex., Tréguier,
Côtes-d'Armor (22), 1884, sur Ormes (N°2497).
Europe occidentale, Russie

Rhyncolini

***Melicius cylindrus* (Boheman, 1838)**

6 ex., Bonifacio, Corse (N°3976).
Pratiquement toute l'Europe continentale. Russie.

***Melicius gracilis* (Rosenhauer, 1856)**

4 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Madrid, Espagne ;
3 ex., Nice, Alpes-Maritimes (06) (N°1270).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie,
Sardaigne, Sicile, Allemagne, Pologne, Tchéquie,
Autriche, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Bosnie,
Serbie, Macédoine, Bulgarie.

***Phloeophagus lignarius* (Marshall, 1802)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Coatconggar,
Ploujean, Finistère (29), 1882 (N°2053).
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Rhyncholus (Axenomimetes) reflexus* Boheman, 1838**

4 ex., Espagne (N°1721).
Pratiquement toute l'Europe continentale, Russie.

***Rhyncholus (Rhyncholus) ater ater* (Linnaeus, 1758)**

1 ex., France, localité non précisée, sous le nom de
cloropus (N°6425).
Pratiquement toute l'Europe, Scandinavie, Russie.

***Rhyncholus (Rhyncholus) elongatus* (Gyllenhal, 1827)**

2 ex., Grèce (N°6376) ; 3 ex., Bonifacio, Corse,
sous le nom de *crassirostris* (N°5530).
Toute l'Europe continentale, Russie, Scandinavie.

***Rhyncholus (Rhyncholus) punctatulus* Boheman, 1838**

2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) ; 1 ex.,
Bonifacio, Corse (N°800).
Une bonne partie de l'Europe, Russie

***Rhyncholus (Rhyncholus) strangulatus* Perris, 1852**

4 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3671).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie,
Croatie.

Cryptorhynchinae

Camptorhinini

***Camptorhinus statua* (Rossi, 1790)** (= ***Curculio statua* Fabricius, 1792**)

2 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47)
(N°3672).

France, Allemagne, Suisse, Autriche, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie, Italie, Sardaigne, Turquie.

Cryptorhynchini

***Acallocrates denticollis* (Germar, 1824)**

5 ex., Styrie, Autriche (N°4844).

France, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie,
Serbie, Macédoine, Albanie, Bulgarie, Grèce,
Turquie.

***Cryptorhynchus lapathi* (Linnaeus, 1758)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) 1892 ; 1 ex., France,
localité non signalée (N°535).

Toute l'Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.



Cryptorhynchus lapathi (© RL)

***Acalles aptus* Meyer, 1896**

1 ex., Algérie (N°9977).
Algérie.

***Acalles aubei* Boheman, 1837**

4 ex., Styrie, Autriche ; 1 ex., Gien, Loiret (45)
(N°6359).

Europe moyenne, Russie, Turquie.

***Acalles camelus* (Fabricius, 1792)**

2 ex., Prusse, Allemagne (N°5610) ; 1 ex., Styrie,
Autriche sous le nom de *sophiae* (N°6361).

Europe moyenne et centrale.

***Acalles caucasicus* Reitter, 1891**

1 ex., Caucase, Russie (N°9643).

Arménie, Géorgie, Russie du Sud, Turquie.

***Acalles echinatus* (Germar, 1824)**

1 ex., Caucase, Russie (N°9642).

Europe moyenne et centrale, Russie, Turquie.

***Acalles lemur lemur* (Germar, 1824)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°8483).

France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse,
Autriche, Italie.

***Acalles misellus* Boheman, 1844**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) 1883 ; 1 ex., France,
localité non précisée (N°6360).

Irlande, Angleterre, Espagne, France, Pays-Bas,
Allemagne, Danemark, Pologne, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Suède.

***Acalles parvulus* Boheman, 1837**

2 ex., France, localité non précisée ; 1 ex., Hongrie
(N°5499).

France, Corse, Allemagne, Suisse, Autriche,
Slovénie, Croatie, Italie, Sicile.

***Acalles ptinoides* (Marsham, 1802)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., La Salette,
Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1882
(N°4797).

Portugal, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas,
Angleterre, Allemagne, Pologne, Norvège, Suède.

***Acalles setulipennis* Desbrochers, 1871**

3 ex., Porto-Vecchio, Corse (N°2364).
Corse, Sardaigne.

***Echinodera brisouti* (Reitter, 1885)**

1 ex., Corfou, Grèce (N°9644).

Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie,
Macédoine, Grèce.

***Echinodera valida* (Hampe, 1864)**

2 ex., Hongrie sous le nom de *validus* (N°7421).

Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.

***Ruteria hypocrita* (Boheman, 1837)**

2 ex., Lyon, Rhône (69) ; 1 ex., Gien, Loiret (45)
(N°2563).

Europe moyenne.

***Kyklioacalles (Glaberacalles) punctaticollis* *meteoricus* (Meyer, 1909)**

(= ***Acalles punctaticollis peninsularis* Hustache,
1932**)

3 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) ;
1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex.,
Nyons, Drôme (26) (N°4849).

Espagne, France, Italie.

***Kyklioacalles aubei* Boheman, 1837**

4 ex., Styrie, Autriche ; 1 ex., Gien, Loiret (45)
(N°6359).

Europe moyenne, Russie, Turquie.

***Kyklioacalles (Kyklioacalles) barbarus* (Lucas, 1846)**

1 ex., Oran, Algérie (N°5421).

Espagne (?), Sicile (?).

***Kyklioacalles (Kyklioacalles) teter* (Boheman, 1844)**

3 ex., île Lavazzi, Corse (N°3750).
Sicile.

***Palaeoacalles navieresi* Boheman, 1837**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kersco, Ploujean, Finistère (29) 1884 ; 1 ex., Tréoudal, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1889 ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°5524) ; 2 ex., forêt de Perseigne, Neufchâtel-en-Saosnois, Sarthe (72) sous le nom de *navieresi* (N°6261).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Dichromacalles albopictus* (Jacquet, 1887)**

2 ex., Nyons, Drôme (26) (N°8878).
France, Italie.

***Dichromacalles dioctetianus* (Germar, 1817)**

1 ex., France, localité non précisée (N°3749).
Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie.

***Dichromacalles dromedarius* (Boheman, 1844)**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°3749).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie.

***Dichromacalles lentisci* (Chevrolat, 1861)**

1 ex., Oran, Algérie (N°8972).
Espagne.

***Dichromacalles tuberculatus* (Rosenhauer, 1856)**

5 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°6657).
Portugal, Espagne, France, Sicile.

Gasterocercini***Gasterocercus depressirostris depressirostris* (Fabricius, 1792)**

4 ex., Paris, Seine (75) ; 1 ex., Hongrie (N°3675).
France, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.

Cyclominae**Dichotrachelini*****Dichotrachelus baudii* (Seidlitz, 1875)**

1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) sous le nom de *Trachelemorphus* (N°9761).
France, Italie.

***Dichotrachelus linderi* (Fairmaire, 1852)**

3 ex., pic du Canigou, Pyrénées-Orientales (66) (N°1981).
Espagne (Pyrénées), France (Pyrénées).

***Dichotrachelus muscorum* (Fairmaire, 1848)**

2 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) (N°3961).

Espagne, France (assez rare).

***Dichotrachelus stierlini knechti* Stierlin, 1875**

5 ex., Espagne ; 1 ex., Tyrol (N°2541).
France, Suisse, Autriche, Italie.

***Dichotrachelus verrucosus* (Kiesenwetter, 1852)**

1 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) (N°1819).
Espagne (Pyrénées), France (Pyrénées).



Dichotrachelus verrucosus (© RL)

Hipporhinini***Gronops luctuosus* Chevrolat, 1861**

3 ex., Espagne (N°8976).
Portugal, Espagne.

***Gronops lunatus* (Fabricius, 1775)**

3 ex., îles Lavazzi, Corse ; 2 ex., Madrid, Espagne (N°3080).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Suède, Royaume-Uni, Estonie, Grèce.

***Entomoderus (Pseudorhinus) asper* (Allard, 1870)**

1 ex., Sicile (N°7147).
Sicile.

***Entomoderus (Pseudorhinus) atticus* (Reiche, 1857)**

1 ex., Grèce (N°8048).
Grèce.

***Entomoderus (Pseudorhinus) bonvouloiri* (Ch. Brisout, 1866)**

1 ex., Espagne (N°9621).
Espagne.

***Entomoderus (Pseudorhinus) crispatus* (Boheman, 1842)**

2 ex., Grenade, Espagne (N°4847).
Portugal, Espagne, Baléares.

***Entomoderus (Pseudorhinus) deformis* (Reiche, 1858)**

1 ex., Grèce (N°9620).
Italie, Sicile, Croatie, Grèce.

***Entomoderus (Pseudorhinus) dilatatus* (Fabricius, 1801)**

1 ex., Carthagène, Espagne (N°4845).
Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne.

***Entomoderus (Pseudorhinus) impressicollis* (Boheman, 1834)**

2 ex., Barcelone, Espagne (N°4144).
Espagne, France.

***Entomoderus (Pseudorhinus) interruptus* (Ch. Brisout, 1866)**

2 ex., L'Escorial, Espagne (N°3353).
Portugal, Espagne.

***Entomoderus (Pseudorhinus) laesirostris laesirostris* (Fairmaire, 1859)**

2 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Vernet-les-Bains,
Pyrénées-Orientales (66) (N°1738).
Espagne, France, Corse, Sardaigne.

***Entomoderus (Pseudorhinus) longulus* (Rosenhauer, 1856)**

1 ex., Espagne (N°5305).
Portugal, Espagne, Baléares.

***Entomoderus (Pseudorhinus) plasoni* (Desbrochers, 1911)**

1 ex., Espagne ; 1 ex., Maroc (N°8975).
Espagne.

***Entomoderus (Pseudorhinus) stableaui stableaui* (Fairmaire, 1862)**

3 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66)
(N°1818).
Espagne, France.

***Entomoderus (Pseudorhinus) variabilis* (Ch. Brisout, 1866)**

1 ex., Aranjuez, Espagne (N°3351).
Portugal, Espagne, Baléares.

***Entomoderus (Pseudorhinus) variegatus* (Motschulsky, 1849)**

1 ex., Carthagène, Espagne (N°4846).
Espagne.

Entiminae

Alophini

***Graptus triguttatus triguttatus* (Fabricius, 1775)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ploujean, Finistère
(29) 1883 (N°480).
Angleterre, France, Italie, Suisse, Autriche,
Allemagne, Tchéquie, Hongrie, Moldavie, Ukraine,
Russie.

***Rhytideres plicatus* (Olivier, 1790)**

4 ex., France, lieu non mentionné ; 1 ex., Espagne
(N°3348) ; 2 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom de
var. *siculus* (N°2238).
Espagne, France, Sicile, Grèce, Turquie.

Brachyderini

***Brachyderes (Brachyderes) incanus* (Linnaeus, 1758)**

3 ex., Rochefort, Charente-Maritime (17) ; 1 ex.,
Fontainebleau, Seine-et-Marne (77) ; 1 ex.,
Barcelone, Espagne (N°4458) ; 2 ex., Portugal sous
le nom de *brucki* (N°9493) ; 1 ex., L'Escorial,
Espagne sous le nom de *gracilis* (N°3015) ; 1 ex.,
Espagne sous le nom d'*alboguttatus* (N°5261) ;
Presque toute l'Europe jusqu'en Russie et
Scandinavie.

***Brachyderes (Brachyderes) marginellus* Graells, 1858**

1 ex., Andalousie, Espagne (N°3016).
Espagne, Portugal.

***Brachyderes (Brachyderes) pubescens* Boheman, 1833**

1 ex., Bône (Annaba), Algérie sous le nom
d'*angustus* (N°5262) ; 1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-
Orientales (66) (N°2520) ; 5 ex., Vernet-les-Bains,
Pyrénées-Orientales (66) (N°1900).
France, région méditerranéenne, Espagne,
Maghreb.

***Brachyderes (Brachylophus) lusitanicus* (Fabricius, 1781)**

3 ex., Font-Romeu, Pyrénées-Orientales (66)
(N°1717).
France, Sud-Ouest, Espagne.

***Caulostrophus subsulcatus* (Boheman, 1833)**

1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°9350) ; 5 ex.,
Bonifacio, Corse sous le nom de *delarouzei*
(N°1838) ; 1 ex., Grèce (N°9591).
Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile,
Croatie, Albanie, Grèce, Slovaquie.

***Pholicodes pancaucasicus* Davidyan, 1992**

1 ex., Caucase, Russie (N°9353).
Pologne, Russie, Turquie.

***Strophomorphus porcellus* (Schoenherr, 1832)**

1 ex., Carcassonne, Aude (11) sous le nom
d'*hispidus* (N°6098).
Espagne, France, Corse, Sardaigne, Autriche, Sicile,
Slovénie, Bosnie, Albanie, Grèce, Hongrie,
Roumanie, Bulgarie, Suède, Turquie, Chypre.

***Strophosoma (Neliocarus) faber* (Herbst, 1784)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 4 ex., Roscoff,
Finistère (29) 1887, 1891 (N°458) ; 1 ex., Espagne
var. *ebenista* (N°5257).

Europe, Scandinavie, Turquie.

***Strophosoma (Neliocarus) flavipes* Chevrolat, 1869**

1 ex., Espagne (N°5258).
Portugal, Espagne.

***Strophosoma (Neliocarus) nebulosum* Stephens, 1831
(= *Curculio retusum* Marsham, 1802)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *retusum* ;
1 ex., Barnenez, Plouezoch, Finistère (29) 1888 ;
2 ex., Terenez, Finistère (29) 1885 ; 1 ex., Rostrenen,
Côtes-d'Armor (22) 1884 (N°1282).
Espagne, Portugal, France, Irlande, Angleterre, Pays-
Bas, Allemagne, Autriche, Hongrie.

***Strophosoma (Neliocarus) sus* Stephens, 1831
(= *Strophosoma laterale* Paykull, 1792)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de
laterale ; 1 ex., Barnenez, Plouezoch, Finistère (29)
1892 ; 1 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) sous le nom
de *limbatus* ; 1 ex., Lourdes, Hautes-Pyrénées (65)
(N°2221).

Europe de l'Ouest et Scandinavie.

***Strophosoma (Strophosoma) capitatum* (De Geer,
1775)**

(= ***Strophosomus rufipes* Stephens, 1831)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*obesus* ;
3 ex., Pennelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère
(29) 1878, 1888, 1890 ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean,
Finistère (29) 1890 ; 1 ex., Tréfeunteuiou, Ploujean,
Finistère (29), 1902 (N°2275).
Europe septentrionale, Russie.

***Strophosoma (Strophosoma) erinaceus* Chevrolat,
1865**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., L'Escorial,
Espagne (N°3361).
Portugal, Espagne, France, Suisse, Italie, Belgique,
Angleterre.

***Strophosoma (Strophosoma) fulvicorne* Walton, 1846
(= *Strophosomus curvipes* C.G. Thomson, 1865)**

2 ex., Allemagne, sous le nom de *curvipes* (N°7404).
France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Pologne,
Finlande, Suède, Norvège, Angleterre.

***Strophosoma (Strophosoma) globulus* Seidlitz, 1870**

1 ex., Portugal (N°9489).
Portugal, Espagne.

***Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum*
melanogrammum (Forster, 1771)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *coryli* ;
1 ex., Pennelé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère
(29) ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29)
1887 ; 1 ex., Kergollo, Ploujean, Finistère (29)
(N°457) ; 3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
fagi (N°6281)
Toute l'Europe, Scandinavie, Russie du Nord.

***Strophosoma (Strophosoma) tuberculole* (Fairmaire,
1852)**

3 ex., Auch, Gers (32) (N°6685).
Sud-Ouest France, assez rare, Espagne.

Cneorhinini

***Attactagenus dispar* (Graells, 1858)**

1 ex., Espagne (N°9945).
Espagne.

***Attactagenus plumbeus* (Marsham, 1802)**

4 ex., Abbeville, Somme (80) ; 1 ex., Lille, Nord (59)
(N°7102).
Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Danemark, Suède, Angleterre.

***Attactagenus pyriformis* (Boheman, 1833)**

2 ex., Espagne (N°2964).
Espagne.

***Philopodon plagiatum* (Schaller, 1783)**

8 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°454) ; 1 ex., Morlaix,
Finistère (29) sous le nom de *parapleurus* (N°8481).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Polydus heydeni* (Tournier, 1874)**

2 ex., Portugal (N°9030).
Portugal.

***Polydus hispanus hispanus* (Herbst, 1797)**

5 ex., Espagne (N°7405).
Portugal, Espagne.

***Polydus prodigus* (Fabricius, 1798)**

1 ex., Portugal. (N°2518).
Espagne.

***Pseudocneorrinus obesus* Roelofs, W., 1873**

1 ex., Sibérie, Russie.
Russie.

Cyphicerini

***Chloebius immeritus* (Schoenherr, 1826)**

3 ex., Caucase, Russie (N°9362).
Russie, Turquie.

***Ptochus porcellus* Boheman, 1834**

2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2784).
Russie, Ukraine, Turquie.

Geonemini

***Barynotus (Barynotus) alternans* Boheman, 1834**

1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65)
(N°6734).
France, Allemagne, Suisse, Autriche, Slovaquie,
Croatie.

***Barynotus (Barynotus) moerens* (Fabricius, 1792)
(= *Curculio elevatus* Marsham, 1802)**

2 ex., Ploujean, Finistère (29) 1888 sous le nom
d'*elevatus* ; 2 ex., Villefranche-sur-Saône, Rhône (69)
(N°8495).

Europe septentrionale, Scandinavie, Russie.

***Barynotus (Barynotus) obscurus obscurus* (Fabricius,
1775)**

4 ex. Suisse (N°456).

Europe septentrionale, Scandinavie, Russie.

***Barynotus (Barynotus) squamosus* Germar, 1824**

1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) (N°5255)

4 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) var.
illaesirostris ; 1 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-
Orientales (66) var. *illaesirostris* (N°2448).

France, Irlande, Angleterre, Islande, Danemark,
Suède, Norvège.



Barynotus squamosus (© RL)

***Barynotus (Barynotus) umbilicatus umbilicatus*
Dufour, 1851**

1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65)
(N°4668).

France endémique (Pyrénées).

***Barynotus (Barynotus) unipunctatus* Dufour, 1851**

1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65)
(N°6733).

France (Pyrénées). Espagne.

***Barynotus (Margaritius) maculatus* Boheman, 1842**

2 ex., Montgenèvre, Hautes-Alpes (05) (N°6097).

France (région alpine), Suisse, Italie.

***Barynotus (Margaritius) margaritaceus* Germar, 1824**

4 ex., Suisse (N°3125).

France (région alpine), Suisse, Autriche, Allemagne,
Italie.

***Geonemus flabellipes* (Olivier, 1807)**

2 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Menton, Alpes-
Maritimes (06) ; Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66)
(N°2527).

Sud de la France, Espagne.



Geonemus flabellipes (© RL)

Omiini

***Bryodaemon hanakii* (Frivaldszkyi 1865)**

1 ex., Hongrie (N°9347).

Bulgarie, Ukraine.

***Humeromima rufipes* (Boheman, 1834)**

1 ex., Roumanie (N°9073).

Autriche, Croatie, Pologne, Roumanie, Ukraine.

***Baromiamima concinna* (Boheman, 1834)**

6 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex.,
Menton, Alpes-Maritimes (06) sous le nom
d'*oblongus* (N°2710).

France, Suisse, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie,
Hongrie, Pologne, Moldavie.

***Omius murinus* (Boheman, 1843)**

1 ex., Russie (N°6379).

Russie, Ukraine, Turquie.

***Omius puberulus* (Boheman, 1834)**

(= *Omius rotundatus* (Fabricius, 1792)

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de
rotundatus ; 3 ex., Autriche sous le nom de
rotundatus ; 1 ex., Sarepta (Sarafand), Liban sous le
nom de *rotundatus* (N°2847).

France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse,
Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Croatie, Bosnie, Bulgarie, Roumanie,
Moldavie, Ukraine, Turquie.

***Omius seminulum* (Fabricius, 1801)**

1 ex., Hongrie (N°7106).

Allemagne, Suisse, Autriche, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine, Grèce, Bulgarie, Roumanie.

***Omius verruca* Steven, 1829**

1 ex., Caucase, Russie (N°9586).

Ukraine, Russie, Turquie.

***Rhinomias forticornis* (Boheman, 1846)**

7 ex., Carniole, Slovénie (N°5371).

Espagne, France, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie,
Bosnie, Serbie, Macédoine, Hongrie, Tchéquie,
Slovaquie, Pologne, Turquie.

***Urometopus strigifrons* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Caucase, Russie (N°9074).
Ukraine, Russie.

Otiorhynchini***Cirrorhynchus argenteus* (Stierlin, 1861)**

1 ex., Hongrie (N°9920)
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Moldavie.

***Cirrorhynchus cribrosus* (Germar, 1817)**

5 ex., Istrie, Croatie (N°6170).
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie,
Macédoine, Bulgarie.

***Cirrorhynchus crinipes* (Miller, 1863)**

2 ex., Bosnie (N°8307).
Slovaquie, Hongrie, Bosnie, Albanie.

***Cirrorhynchus plumipes* (Germar, 1817)**

5 ex., Carinthie, Autriche (N°3399)
Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie,
Serbie, Macédoine.

***Dodecastichus consentaneus* (Boheman, 1843)**

1 ex., Toscane, Italie (N°5404).
Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie.

***Dodecastichus dalmatinus* (Gyllenhal, 1834)**

4 ex., Istrie, Croatie (N°7137).
Italie, Croatie, Bosnie.

***Dodecastichus dolomitae* (Stierlin, 1872)**

1 ex., Tyrol, Autriche (N°9918).
Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Montenegro,
Macédoine.

***Dodecastichus geniculatus* (Germar, 1817)**

5 ex., Carinthie, Autriche ; 1 ex., Istrie, Croatie
(N°4197).
Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Pologne,
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie,
Bulgarie.

***Dodecastichus inflatus* (Gyllenhal, 1834)**

4 ex., Istrie, Croatie (N°6171).
Allemagne, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie, Bulgarie.

***Dodecastichus mastix* (Olivier, 1807)**

6 ex., Autriche (N°7485) ; 3 ex., Dalmatie sous le nom
de *pruinus* (N°7019).
Suède, Lituanie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie,
Serbie, Macédoine, Albanie, Bulgarie.

***Dodecastichus obsoletus* (Stierlin, 1861)**

4 ex., Carinthie, Autriche (N°3582).
Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Hongrie,
Bulgarie.

***Dodecastichus pulverulentus* (Germar, 1824)**

2 ex., Carinthie, Autriche (N°3559) ; 1 ex., Styrie,
Autriche sous le nom de *periscelis* (N°7018).
Italie, Autriche, Croatie, Bosnie, Pologne, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.

***Otiorhynchus (Aleutinops) elegantulus* Germar, 1824**

3 ex., Carniole, Slovénie (N°5606).
Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine.

***Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis* Gyllenhal, 1834**

4 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Murcie, Espagne
(N°2535).
Littoral méditerranéen, France, Italie, Sardaigne,
Sicile, Afrique du Nord.

***Otiorhynchus (Arammichnus) juvenus juvenus* Gyllenhal, 1834**

2 ex., Hyères, Var (83) sous le nom de *tomentosus*
(N°3558). Littoral méditerranéen de la France et de
l'Italie, Baléares, Malte, Afrique du Nord, Turquie.

***Otiorhynchus (Arammichnus) neapolitanus* Stierlin, 1861**

2 ex., Malte ? (N°5051).
Sicile.

***Otiorhynchus (Aranihus) frescati* Boheman, 1843**

1 ex., Italie (N°9921).
Italie, Suisse, Autriche, Slovénie, Bosnie, Hongrie.

***Otiorhynchus (Aranihus) guttula guttula* Fairmaire, 1859**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°5283), sous le nom
d'*affinis*.
Corse, endémique, Sardaigne.

***Otiorhynchus (Aranihus) ligneus ligneus* (Olivier, 1807)**

(= *Otiorhynchus setosus* Stierlin, 1858)
3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Pennelé, Saint-
Martin-des-Champs, Finistère (29) ; 1 ex., Roscoff,
Finistère (29) (N°2056).
Répandue et assez commune dans toute la France.

***Otiorhynchus (Aranihus) parvicollis* Gyllenhal, 1834**

4 ex., Oran, Algérie (N°8980).
Espagne, Pologne, Afrique du Nord.

***Otiorhynchus (Aranihus) squamifer* Boheman, 1843**

1 ex., Grèce (N°3268).
Grèce.

***Otiorhynchus (Bytosomeus) multicostatus* Stierlin, 1861**

1 ex., Carniole, Slovénie (N°8811).
Italie, Autriche, Slovénie, Bosnie, Macédoine,
Bulgarie.

- Otiorynchus (Choilisanus) caucasicus Stierlin, 1872**
2 ex., Caucase, Russie (N°9316).
Russie, Ukraine.
- Otiorynchus (Choilisanus) raucus (Fabricius, 1777)**
(= *Curculio tristis* Fabricius, 1775)
(= *Curculio fulvus* Fabricius, 1787)
2 ex., Alsace ; 2 ex., Bohême, Autriche (N°2848).
Est, Centre, bassin de la Seine.
- Otiorynchus (Choilisanus) velutinus Germar, 1824**
2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban, sous le nom d'*exilis*
(N°2793) ; 3 ex., Autriche (N°7487).
Rare en France, Pyrénées-Orientales, Alpes, Puy-de-Dôme, Autriche, Allemagne, Belgique, Europe centrale et méridionale, Asie centrale.
- Otiorynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus, 1758)**
(= *Otiorynchus ledereri* Stierlin, 1873)
(= *Otiorynchus brachypterus* F. Solari, 1932)
4 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°473).
Europe, Turquie.
- Otiorynchus (Dorymerus) sulcatus (Fabricius, 1775)**
6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°472) ; 3 ex., Grèce, sous le nom de *linearis* ; 2 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06), sous le nom de *linearis* (N°3267).
Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande.
- Otiorynchus (Duphanastus) apfelbecki Stierlin, 1887**
2 ex., Croatie (N°8455).
Pologne, Ukraine, Autriche, Italie, Croatie, Bosnie.
- Otiorynchus (Duphanastus) auricomus Germar, 1824**
(= *Otiorynchus nivalis* Stierlin, 1862)
2 ex., Carinthie, Autriche (N°3561).
Très rare en France. Alpes orientales, Suisse, Autriche.
- Otiorynchus (Duphanastus) eremicola Rosenhauer, 1847**
1 ex., Styrie, Autriche sous le nom de *tenuicornis* (N°8316).
Suisse, Autriche, Italie.
- Otiorynchus (Duphanastus) fraxini Germar, 1824**
3 ex., Istrie, Croatie ? (N°6174).
Allemagne, Suisse, Autriche, Italie.
- Otiorynchus (Edelengus) planithorax Boheman, 1842**
1 ex., Bône (Annaba), Algérie (N°5406).
Algérie, Maroc, Tunisie.
- Otiorynchus (Elechranus) densatus Boheman, 1843**
4 ex., Valais, Suisse (N°1931).
Italie, Suisse. Très rare en France.
- Otiorynchus (Ergiferanus) marmota Stierlin, 1861**
2 ex., Transylvanie, Roumanie (N°7397).
Hongrie, Roumanie.
- Otiorynchus (Ergiferanus) nubilus nubilus Boheman, 1843**
(= *Otiorynchus partialis* Boheman, 1843)
1 ex., Alpes suisses (N°5407).
Assez commun dans la région alpine.
- Otiorynchus (Ergiferanus) tener tener Stierlin, 1861**
(= *Otiorynchus grajus* K. Daniel & J. Daniel, 1898)
2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°9760).
Toute la région alpine.
- Otiorynchus (Jelenantus) affaber Boheman, 1843**
1 ex., Bône (Annaba), Algérie (N°5286).
Espagne, Italie, Sicile, Madère, Afrique du Nord.
- Otiorynchus (Lolatismus) costipennis Rosenhauer, 1856**
4 ex., Transylvanie, Roumanie (N°7021).
Allemagne, Autriche, Italie, Croatie.
- Otiorynchus (Lolatismus) porcatus (Herbst, 1795)**
1 ex., Lieu inconnu (N°470).
Europe centrale et septentrionale. Nord, est et centre de la France, peu commun.
- Otiorynchus (Magnanotius) austriacus (Fabricius, 1801)**
1 ex., Hongrie sous le nom de *carinatus* (N°7399) ;
1 ex., Styrie, Autriche (N°7105).
Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Italie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Bulgarie.
- Otiorynchus (Magnanotius) equestris (Richter, 1820)**
1 ex., Moravie, Tchéquie, sous le nom d'*aerifer* (N°6363).
Pologne, Europe centrale, Balkans.
- Otiorynchus (Magnanotius) kollari Gyllenhal, 1834**
5 ex., Carpates, Roumanie (N°6821).
Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Ukraine.
- Otiorynchus (Majetnecus) lepidopterus (Fabricius, 1794)**
4 ex., Hongrie ; 2 ex., Simplon, Valais, Suisse (N°2534).
Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Ukraine.
- Otiorynchus (Majetnecus) squamosus Miller, 1859**
5 ex., Carinthie, Autriche (N°3556).
Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Croatie.
- Otiorynchus (Melasemnus) bisphaericus Reiche, 1857**
1 ex., Thessalie, Grèce (N°9320) ; 1 ex., Grèce (N°8782).
Grèce, Turquie.

Otiorrhynchus (Melasemnus) nitidus Reiche, 1857

1 ex., Liban (N°5531).

Macédoine, Grèce, Turquie, Liban.

Otiorrhynchus (Melasemnus) ovalipennis Boheman, 1843

2 ex., Constantinople (Istanbul), Turquie (N°6484).

Grèce, Bulgarie, Turquie.

Otiorrhynchus (Mesaniomus) longipennis Stierlin, 1861

1 ex., Morée, Grèce (N°9072).

Autriche, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine.

Otiorrhynchus (Mesaniomus) polycoccus Gyllenhal, 1843

2 ex., Hongrie (N°7395).

Hongrie, Croatie, Albanie, Turquie.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) cancellatus Boheman, 1843(= **Otiorrhynchus clairi** Stierlin, 1880)

1 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) (N°7861).

Assez commun dans les Alpes-Maritimes.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) difficilis Stierlin, 1858

2 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) (N°3700).

Rare en France, Alpes suisses et italiennes, Vosges.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) impressiventris Fairmaire, 1859

1 ex., Gannat, Allier (03) ; 1 ex., Croatie (N°5281).

Pyrénées, Massif central, mont Ventoux, Europe.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) pupillatus Gyllenhal, 1834(= **Otiorrhynchus subdentatus** Stierlin, 1858)3 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) (N°1930) ; 5 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) sous le nom d'*angustipennis* (N°7863) ; 7 ex., Suisse, sous le nom de var. *subdentatus*.

Vosges, Alpes, Pyrénées.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) singularis (Linnaeus, 1767)(= **Otiorrhynchus chevrolati** Gyllenhal, 1843)(= **Otiorrhynchus corniculatus** Reitter, 1914)

3 ex., Epinal, Vosges (88) (N°9051) ;

2 ex., Bonifacio, Corse (N°7023).

Europe.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) varius Boheman, 1842(= **Otiorrhynchus maritimus** Stierlin, 1883)

2 ex., Splügen, Suisse (N°6072).

Alpes savoyardes, Cévennes, Valais.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) veterator Uyttenboogaart, 19323 ex., Morlaix (29) sous le nom d'*impressiventris* ssp. *veterator* (N°1101).

Nord-ouest et sud-ouest de la France, Belgique, Hollande, Allemagne.

Otiorrhynchus (Mierginus) auricapillus Germar, 1824

3 ex., Carinthie, Autriche (N°3564).

Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Hongrie, Turquie.

Otiorrhynchus (Mierginus) montivagus Boheman, 1843

6 ex., Carniole, Slovaquie (N°8317).

Alpes italiennes, Tyrol, Slovaquie, Croatie.

Otiorrhynchus (Misenatus) lugens (Germar, 1817)

4 ex., Grèce ; 1 ex., Carinthie, Autriche (N°1107).

Espagne, Italie, Sicile, Croatie, Grèce, Turquie.

Otiorrhynchus (Nehrodistus) populeti Boheman, 1843

2 ex., Hongrie (N°6367).

Italie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Turquie.

Otiorrhynchus (Nehrodistus) scitus Gyllenhal, 1843

2 ex., Turquie (N°7394).

Bosnie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

Otiorrhynchus (Nihus) proximus Stierlin, 1861

1 ex., Carpates, Roumanie (N°6820).

Europe centrale et Pologne.

Otiorrhynchus (Nihus) scaber (Linnaeus, 1758)1 ex., lieu inconnu, sous le nom de *septentrionis* (N°1106).

Europe moyenne et du Nord, Vosges, Alpes-Maritimes, Massif central, Pyrénées-Orientales.

Otiorrhynchus (Nihus) uncinatus Germar, 18245 ex., Autriche ; 1 ex., Valais, Suisse ; 2 ex., Moravie, Tchéquie (N°5285) ; 1 ex., Valais, Suisse, sous le nom de *setifer* (N°8941).

Europe moyenne, assez commun en montagne en France.

Otiorrhynchus (Nihus) venustus Stierlin, 1880

2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°8035).

France (Alpes-Maritimes), Italie (Piémont).

Otiorrhynchus (Nubidanus) coyeyi Marseul, 1868

1 ex., Liban (N°5532).

Liban.

Otiorrhynchus (Otiolus) anthracinus (Scopoli, 1763)(= **Otiorrhynchus cratoscelis** Reitter, 1812)1 ex., Balkans (N°8783) ; 1 ex., Carniole, Slovaquie, sous le nom d'*helveticus* (N°6175).

Zone alpine et subalpine, Pyrénées, Caucase, Turquie, Calabre.

Otiorynchus (Otirolehus) tristis (Scopoli, 1763)

2 ex., Pologne (N°4387).

Europe à l'est du Rhin jusqu'à la Scandinavie et la Russie, Italie, Europe centrale.

Otiorynchus (Otiomimus) carceli Gyllenhal, 1843

1 ex., Grèce (N°9922).

Grèce.

Otiorynchus (Otiorynchus) amplipennis Fairmaire, 1859

5 ex., Monte Rosa, Italie (N°4224).

Valais suisse, Piémont italien.

Otiorynchus (Otiorynchus) armadillo (Rossi, 1792)

(= **Otiorynchus obsitus Gyllenhal, 1834**)

4 ex., Carinthie, Autriche ; 1 ex., Chamonix, Haute-Savoie (74), mont Blanc, Alpes (N°4133) ; 5 ex., Carinthie, Autriche, sous le nom d'*obsitus* (N°6095) ; 3 ex., Carinthie, Autriche, sous le nom de *scabripennis* (N°3560) ; 2 ex., Mont Baldo, Italie (N°8124).

Rare sur le territoire français. Vosges, Alpes. Europe Centrale.

Otiorynchus (Otiorynchus) aurifer Boheman, 1842

(= **Otiorynchus morulus Boheman, 1843**)

4 ex., Bonifacio, Corse (N°1841) ; 1 ex., Dalmatie, Croatie (N°1841).

Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Balkans, Turquie.

Otiorynchus (Otiorynchus) auropunctatus Gyllenhal, 1834

(= **Otiorynchus fossor Boheman, 1843**)

(= **Otiorynchus rufipes Boheman, 1843**)

(= **Otiorynchus tumefactus Stierlin, 1861**)

5 ex., Vernet-les-Bains (N°2714) ; 1 ex. Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66), sous le nom de *rufipes* (N°3401).

Répandu et commun dans toute la région pyrénéenne, Gironde et Massif central. Ecosse et Irlande.

Otiorynchus (Otiorynchus) bisulcatus (Fabricius, 1781)

4 ex., Styrie, Autriche (N°3701).

De la Lombardie aux Carpates.

Otiorynchus (Otiorynchus) caudatus (Rossi, 1792)

5 ex., Trente, Italie (N°6705).

Italie, Alpes ligures, Vénétie, Campanie, Sicile.

Otiorynchus (Otiorynchus) coecus coecus Germar, 1824

(= **Curculio niger Fabricius, 1775**)

(= **Otiorynchus villosopunctatus Gyllenhal, 1834**)

(= **Otiorynchus montanus Boheman, 1843**)

(= **Otiorynchus rugipennis Boheman, 1843**)

5 ex., Autriche, sous le nom de *niger* (N°2106) ; 2 ex., Carinthie, Autriche, sous le nom *niger* var. *caeca* (N°5088).

Europe centrale, Vosges, Jura, Haute-Savoie.

Otiorynchus (Otiorynchus) fortis Rosenhauer, 1847

2 ex., Tyrol, Suisse (N°6365).

Sud Tyrol, Vénétie, Trentin.

Otiorynchus (Otiorynchus) ghilianii Fairmaire, 1857

2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06), 1900 (N°6488).

Assez rare. Alpes-Maritimes, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Italie ?, Islande.

Otiorynchus (Otiorynchus) giraffa Germar, 1824

4 ex., Dalmatie, Croatie (N°4134).

Balkans, Europe centrale, Russie.

Otiorynchus (Otiorynchus) griseopunctatus Boheman, 1843

2 ex., Monte Rosa, Italie (N°4205).

Nord de l'Italie, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Valais.

Otiorynchus (Otiorynchus) grouvellei Stierlin, 1883

4 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06), sous le nom *griseopunctatus* v. *grouvellei* (N°7862).

Abondante dans les Alpes-Maritimes.

Otiorynchus (Otiorynchus) hungaricus Germar, 1824

1 ex., Hongrie (N°5405).

Europe centrale.

Otiorynchus (Otiorynchus) laevigatus (Fabricius, 1792)

3 ex., Bohême, Autriche (N°4191).

Europe centrale.

Otiorynchus (Otiorynchus) insubricus Comolli, 1837

(= **Otiorynchus lanuginosus Boheman, 1843**)

(= **Otiorynchus neglectus Stierlin, 1858**)

1 ex., Valais, Suisse sous le nom de *lanuginosus* (N°7138) ; 2 ex., Monte Rosa, Italie, sous le nom de *lanuginosus* (N°1227) ; 6 ex., Saint-Martin-Lantosque, (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) sous le nom de *lanuginosus* (N°7138).

Alpes maritimes françaises et italiennes, Suisse, Tyrol.

Otiorynchus (Otiorynchus) meridionalis Gyllenhal, 1834

(= **Otiorynchus civis Stierlin, 1861**)

(= **Otiorynchus peyrissaci Stierlin, 1886**)

(= **Otiorynchus subvestitus Reitter, 1913**)

1 ex., Briançon, Hautes-Alpes (05) (N°2225).

Sud-ouest de l'Europe, France méditerranéenne. En expansion vers l'ouest et le nord.

Otiorynchus (Otiorynchus) multipunctatus (Fabricius, 1792)

1 ex., Pologne, sous le nom d'*irritans* (N°4386) ;

3 ex., Hongrie. (N°4136)

Europe centrale et Balkans.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) nudus Stierlin, 1861

1 ex., Caucase (N°3566).

Aucune information (Europe centrale)

Otiorhynchus (Otiorhynchus) pyrenaicus pyrenaicus Gyllenhal, 1834

4 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65), 1900. (N°2530)

Très commune dans toutes les Pyrénées, Aude, Gironde.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) repletus Boheman, 1843

6 ex., Pologne (N°5921).

Europe centrale.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) rhacusensis (Germar, 1822)

3 ex., Carniole, Slovénie (N°2528).

Italie (Raguse), Balkans.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) sellae vesulianus Reitter, 1913(= *Otiorhynchus griseopunctatus* Boheman, 1843)(= *Otiorhynchus joachim* Merceron, 1994)2 ex., Monte Rosa, Italie sous le nom de *griseopunctatus* (N°4205).

Nord de l'Italie, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Valais.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) stomachosus Gyllenhal, 1834(= *Otiorhynchus pubens* Boheman, 1842)2 ex., Briançon, Hautes-Alpes (05), sous le nom *stomachosus* var. *pubeus* (N°6071).

Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) stricticollis stricticollis Fairmaire, 1859(= *Otiorhynchus gallicus* Stierlin, 1861)

6 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (N°6486).

Endémique des Hautes-Pyrénées.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) sulfurifer (Fabricius, 1801)

3 ex., Carinthie, Autriche ; 1 ex., Istrie, Croatie ; 1 ex., Carniole, Slovénie (N°4192).

Autriche, Italie, Hongrie, Slovénie, Croatie.

Otiorhynchus (Otiorhynchus) tenebricosus (Herbst, 1784)(= *Curculio clavipes* Bonsdorff, 1785)(= *Curculio fuscipes* Olivier, 1807)(= *Otiorhynchus substriatus* Silbermann, 1833)(= *Otiorhynchus fagi* Gyllenhal, 1834)(= *Otiorhynchus erythropus* Boheman, 1843)(= *Otiorhynchus subglaber* Reitter, 1913)5 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06), sous le nom d'*elongatus* (N°6094) ; 4 ex., Lille (59), sous le nom de *clavipes* ; 1 ex., Lyon (69), sous le nom de *clavipes* (N°1994) ; 4 ex., Morlaix (29), sous le nom de *tenebricosus* ;1 ex., Rennes (35), sous le nom de *clavipes* (N°469) ; 6 ex., Epinal, Vosges (88), variété *francolinus* (N°2395) ; 2 ex., Allemagne, sous le nom de *fuscipes* (N°2224).

Du sud de l'Angleterre au nord de l'Italie, Allemagne jusqu'aux Carpates. Vosges, Massif central, Alpes.

Otiorhynchus (Padilehus) pinastris (Herbst, 1795)

3 ex., Autriche (N°3402).

Allemagne, Danemark, Pologne, Ukraine, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie.

Otiorhynchus (Paracryphiphorus) alutaceus (Germar, 1817)2 ex., Dalmatie, Croatie sous le nom de *punctatissimus* (N°7486) ; 3 ex., Autriche ? (N°4138).

Italie, Croatie, Slovaquie, Bulgarie, Grèce.

Otiorhynchus (Paracryphiphorus) bicostatus Boheman, 1843

1 ex., Crète (N°9071).

Grèce, Bulgarie, Turquie, Crète.

Otiorhynchus (Paracryphiphorus) luteus Stierlin, 1862

1 ex., Grèce (N°8095).

Grèce.

Otiorhynchus (Paracryphiphorus) orbicularis (Herbst, 1795)

4 ex., Hongrie (N°6822).

Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie, Macédoine, Roumanie, Bulgarie.

Otiorhynchus (Paracryphiphorus) picimanus Stierlin, 1861

2 ex., Grèce (N°8038).

Grèce.

Otiorhynchus (Pendragon) desertus Rosenhauer, 18475 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66), sous le nom de *muscorum* (N°9350).

Alpes et Pyrénées, rare ailleurs en France, Angleterre, Tyrol, Bulgarie, Suède, Finlande.

Otiorhynchus (Pendragon) ovatus ovatus (Linnaeus, 1758)

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Lille, Nord (59) (N°474).

Toute la France, Europe, Asie centrale, Amérique du Nord.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) arcticus arcticus Fabricius, 1780

5 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (65) (N°1105).

Pyrénées, France, Espagne.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) corsicus
Fairmaire, 1859

(= *Otiorhynchus balachowskyi* Hoffmann, 1934)

2 ex., Bonifacio, Corse (N°1843).

Haute montagne de Corse. Endémique.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) cuprosparsus
Fairmaire, 1859

(= *Otiorhynchus crinitarsis* Stierlin, 1861)

1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06), sous le nom de
crinitarsis (N°9759).

Nord de l'Italie, Alpes-Maritimes.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) dentipes Graells,
1859

3 ex., Navacerrada, Espagne (N°6280) ; 1 ex.,
Espagne sous espèce *asturiensis* (N°7103).

Espagne.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) fulvipes Gyllenhal,
1834

3 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie),
Alpes-Maritimes (06) (N°6489).

Répandu et assez commun dans la zone alpine de
toutes les Alpes méridionales françaises.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) glabratus
Krynicky, 1834

1 ex., Hongrie (N°7104).

Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Bulgarie, Ukraine.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) malefidus
Gyllenhal, 1834

2 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65)
sous le nom *planidorsis* (N°5284) ; 3 ex., Monte Rosa,
Italie ? Douteux (N°2226) ; 4 ex., pic du Midi, Hautes-
Pyrénées (65), sous le nom *praelongus* (N°3424).

Assez rare. Endémique des Pyrénées centrales et
occidentales.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) morio morio
(Fabricius, 1781)

(= *Otiorhynchus ebeninus* Gyllenhal, 1834)

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 3 ex., Bagnères-de-
Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) (N°1948) ; 3 ex., col de
Tortes, Pyrénées-Atlantiques (64) (N°1696) ; 1 ex.,
Autriche (N°6364) ; 3 ex., Carpates, Roumanie, sous
le nom *morio* var. *ebeninus* (N°6916).

Des sierras ibériques aux Carpates.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) noui Fairmaire,
1862

1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (N°3400).

Rare et méconnu. Pyrénées-Orientales.

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) politus Gyllenhal,
1834

1 ex., Görz, Autriche (N°8810).

Finlande, Russie, Lettonie, Estonie, Ukraine,
Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Serbie, Bosnie,

Croatie, Slovénie, Hongrie, Autriche, Tchéquie,
Slovaquie.

Otiorhynchus (Pliadonus) brachialis Boheman, 1843

1 ex., Caucase, Russie N°9322.

Caucase.

Otiorhynchus (Podoropelmus) fullo (Schrank, 1781)

1 ex., Banat, Roumanie, sous le nom de *zebra*
(N°7027).

Suisse, Allemagne, Autriche, Europe orientale.

Otiorhynchus (Podoropelmus) scopularis Hochhuth,
1847

5 ex., Turquie (N°7400).

Russie, Finlande, Ukraine, Bulgarie, Turquie.

Otiorhynchus (Postaremus) nodosus (O. F. Muller,
1764)

(= *Curculio dubius* Ström, 1765)

(= *Otiorhynchus bructeri* Germar, 1824)

(= *Otiorhynchus pauper* Boheman, 1843)

(= *Otiorhynchus comosellus* Boheman, 1843)

(= *Otiorhynchus aurosus* Mulsant & Rey, 1859)

(= *Otiorhynchus tournieri* Stierlin, 1875)

(= *Otiorhynchus pseudopauper* Reitter, 1913)

2 ex., Vernet-les-bains, mont Canigou, Pyrénées-
Orientales (66), sous le nom de *dubius* ; 1 ex.,
Suisse (N°2632).

Montagnes du nord et de l'est de l'Europe. Massif
central.

Otiorhynchus (Prilisvanus) asplenii Miller, 1868

1 ex., Hongrie (N°6362).

Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine,
Hongrie, Roumanie, Ukraine.

Otiorhynchus (Prilisvanus) corvus Boheman, 1843

3 ex., Pologne (N°5920).

Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie,
Croatie.

Otiorhynchus (Prilisvanus) cymophanus Germar,
1839

2 ex., Hongrie (N°6368).

Autriche, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Croatie,
Bosnie, Serbie, Macédoine.

Otiorhynchus (Prilisvanus) dives Germar, 1839

2 ex., Bannat, Hongrie (N°3699).

Suisse, Autriche, Slovénie, Hongrie, Roumanie,
Bulgarie.

Otiorhynchus (Prilisvanus) gemmatus (Scopoli,
1763)

5 ex., Istrie, Croatie, sous le nom de *chlorophanus*
(N°6188) ; 4 ex., Carniole, Slovénie (N°2635).

Alpes-Maritimes, Alpes centrales et orientales d'Italie
du Nord, Suisse, Autriche, Hongrie, Bosnie, Croatie.

Otiorhynchus (Prilisvanus) granicollis Boheman, 1843

1 ex., Hongrie (N°8037).

Ukraine, Roumanie, Hongrie, Croatie.

Otiorhynchus (Prilisvanus) longiventris Kuster, 1859

1 ex., Transylvanie, Roumanie (N°9310).

Ukraine, Roumanie, Hongrie.

Otiorhynchus (Prilisvanus) obsidianus Boheman, 1843

1 ex., Autriche ; 1 ex., Pologne (N°5282).

Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Ukraine.

Otiorhynchus (Prilisvanus) opulentus Germar, 1834

4 ex., Hongrie ; 1 ex., Pologne (N°4136).

Pologne, Roumanie, Hongrie, Ukraine.

Otiorhynchus (Prilisvanus) peregrinus Stierlin, 1861

1 ex., Turquie (N°7396).

Grèce, Turquie européenne.

Otiorhynchus (Prilisvanus) rugosus (Hummel, 1827)5 ex., Russie méridionale (N°4327) ; 7 ex., Pologne, sous-espèce *rugosus* sous le nom d'*egregius* (N°5919) ; 1 ex., Hongrie, sous-espèce *krattereri* (N°9311).

Toute la Russie, Ukraine, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie, Pologne.

Otiorhynchus (Proremus) pauxillus Rosenhauer, 18478 ex., Valais, Suisse (N°4469) ; 6 ex., Carpates, Roumanie sous le nom de *rugirostris* (N°6823).

Forêts subalpines des Alpes, France, Suisse, Autriche, Italie, Croatie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Pologne, Slovaquie.

Otiorhynchus (Proremus) rotundus Marseul, 18722 ex., Prusse orientale, Pologne, sous le nom de *rotundatus* (N°8616).

Russie, Ukraine, Pologne, Lituanie, Finlande, Hongrie, Belgique.

Otiorhynchus (Provadilus) alpicola Boheman, 1842**(= Otiorhynchus aterrimus Boheman, 1843)****(= Otiorhynchus strigirostris Boheman, 1843)**

2 ex., Carinthie, Autriche (N°3565) ; 2 ex., Alpes suisses (N°5408).

Toutes les Alpes jusqu'en Bosnie, Europe centrale.

Otiorhynchus (Provadilus) moestus Gyllenhal, 1834

5 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) (N°6485).

Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes italiennes.

Otiorhynchus (Provadilus) pedemontanus Stierlin, 1861

5 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) (N°6490).

Alpes maritimes françaises et italiennes, Ligurie.

Otiorhynchus (Provadilus) rugifrons (Gyllenhal, 1813)**(= Otiorhynchus dillwynii Stephens, 1831)****(= Otiorhynchus impoticus Boheman, 1843)**

4 ex., Santec, Finistère (29) ; 6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2346).

Toute la France, commun en montagne, plus rare en plaine, Europe septentrionale et centrale, Amérique du Nord.

Otiorhynchus (Provadilus) strigirostris Boheman, 1843

2 ex., Toscane, Italie (N°8954).

Alpes.

Otiorhynchus (Rosvolestus) globus Boheman, 1843

2 ex., Italie (N°8315).

Suisse, Italie.

Otiorhynchus (Satnalistus) duinensis Germar, 1824

6 ex., Istrie, Croatie (N°6173).

Italie, Croatie, Hongrie.

Otiorhynchus (Satnalistus) signatipennis Gyllenhal, 18342 ex., Illyrie, Dalmatie sous le nom d'*illyricus* (N°7025) ; 4 ex., Hongrie (N°7170).

Suisse, Italie, Autriche, Croatie, Bosnie.

Otiorhynchus (Stupamacus) denigrator Boheman, 1843

1 ex., Transylvanie, Roumanie (N°6370).

Pologne, Slovaquie, Ukraine, Hongrie, Slovénie, Croatie, Macédoine, Bulgarie, Grèce.

Otiorhynchus (Thalycrynychus) perdix (Olivier, 1807)

3 ex., Styrie, Autriche (N°4137).

Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Montenegro, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, Hongrie.

Otiorhynchus (Tournieria) anatolicus Boheman, 1843

1 ex., Turquie (N°5409).

Turquie.

Otiorhynchus (Tournieria) frater Stierlin, 1861

3 ex., Turquie (N°8040).

De l'est de la Bulgarie au nord-ouest de l'Anatolie (Turquie).

Otiorhynchus (Troglorhynchus) anophthalmoides (Reitter, 1914)1 ex., Istrie, Croatie, sous espèce *istriensis* (N°7239).

Italie, Slovénie, Croatie.

Otiorhynchus (Troglorhynchus) prolixus Rosenhauer, 1847

1 ex., Tyrol (N°6369).

Italie.

Otiorynchus (Ulozenus) infernalis (Germar, 1817)

2 ex., Croatie (N°7398).

Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie.

Otiorynchus (Urorrhynchus) nobilis Germar, 1824

6 ex., Carinthie, Autriche (N°3555).

Autriche, Italie, Slovénie, Croatie.

Otiorynchus (Urorrhynchus) sabulosus Gyllenhal, 1834

3 ex., Istrie, Croatie (N°6366).

Tchéquie, Autriche, Hongrie, Slovénie, Croatie.

Otiorynchus (Urorrhynchus) sabulosus latipennis Boheman, 1843

1 ex., Croatie (N°8781).

Croatie.

Otiorynchus (Urorrhynchus) sensitivus (Scopoli, 1763)

5 ex., Carniole, Slovénie (N°2529).

Allemagne, Autriche, Italie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie.

Otiorynchus (Urorrhynchus) truncatus Stierlin, 1861

2 ex., Istrie, Croatie (N°6172).

Tchéquie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Albanie.

Otiorynchus (Viroprius) asiaticus Stierlin, 1861

1 ex., Grèce (N°7401).

Grèce, Turquie.

**Otiorynchus (Tithonus) chrysochomus Germar, 1824
(= Otiorynchus laevigaticollis Gredler, 1857)**

1 ex., Styrie, Autriche (N°9919) ; 5 ex., Styrie, Autriche (N°3557).

Alpes de Savoie, Haute-Savoie, Autriche, Hongrie.

**Otiorynchus (Zadrehus) atroapterus (De Geer, 1775)
(= Otiorynchus arenosus Stierlin, 1861)**

2 ex., Santec, Finistère (29) ; 1 ex., Barnévez, Plouézoch, Finistère (29) (N°1947).

Littoral atlantique et de la Manche, de l'embouchure de la Loire à la Somme, Europe du Nord, Angleterre, Irlande.



Otiorynchus atroapterus (© RL)

Otiorynchus (Zavodesus) glabellus Rosenhauer, 1847

3 ex., Görz, Autriche (N°8809).

Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Turquie.

Otiorynchus (Zustalestus) rugosostriatus (Goeze, 1777)

4 ex., Valais, Suisse ; 4 ex., Saint-Jean-du-Doigt, Finistère (29), sous le nom de *scabrosus*, 1870, 1892 (N°471).

Répandu dans toute la France, sauf en Corse, Europe moyenne et Balkans, nord de l'Afrique, Grèce.

Stomodes gyrosicollis Boheman, 1842

5 ex., Hongrie (N°6824).

France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie, Roumanie.

Stomodes rotundicollis Frivaldszky, 1880

1 ex., Turquie (N°8784).

Bulgarie.

Myrorhinini

Apsis albolineata (Fabricius, 1792)

2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2965)

Belgique, Autriche, Hongrie, Bulgarie, Russie, Turquie.

Peritelini

Centricnemus leucogrammus (Germar, 1824)

5 ex., Autriche (N°4140).

Très rare en France, Allemagne, Suisse, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Grèce, Ukraine, Russie.

Gymnomorphus nigrans (Fairmaire, 1862)

2 ex., Carcassonne, Aude (11) (N°2537) ; 1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66).

France : Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Lozère.

Heteromeira laticrobs (Desbrochers, 1871)

4 ex., Bonifacio, Corse (20) sous le nom d'*uniformis* (N°3737) ; 1 ex., Corse (20) (N°5288).

Corse, Sardaigne.

Lepretius noxius (Boheman, 1834)

4 ex., Toscane, Italie, sous le nom de *Peritelus noxius* (N°8856).

France, Italie.

Leptomeira squamulata (Reiche, 1862)

1 ex., Bonifacio, Corse (20) sous le nom de *Peritelus squamatus*, corsicus (N°5287).

Endémique de Corse.

Meira crassicornis crassicornis Jacquelin du Val, 1852

5 ex., Nice, Alpes-Maritimes (06) (N°7864).

Endémique de la France méridionale.

***Meirella elongatula* (Fairmaire, 1859)**

2 ex., Plan-d'Aups, Sainte-Beaume, Var (83) (N°5054).
Endémique du Sud de la France.

***Meirella grouvellei* Stierlin, 1882**

6 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°7125).
Endémique des Alpes-Maritimes (Menton).

***Meirella suturella* (Fairmaire, 1859)**

(= *Meira florentina* Stierlin, 1885)

(= *Peritelus balachowskyi* Hoffmann, 1938)

2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) sous le nom de *Peritelus suturellus* (N°8042) ; 1 ex., Italie, sous le nom de *florentina* (N°8785).

France, Espagne, Italie.

***Peritelus familiaris* Boheman, 1834**

2 ex., Hongrie (N°6380).

Russie, Ukraine, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie.

***Peritelus sphaeroides* Germar, 1824**

4 ex., Fontainebleau, Seine-et-Marne (77) (N°481).
France, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre.

***Pseudomeira adusticornis* (Kiesenwetter, 1851)**

2 ex., Barcelone, Espagne (N°4141).
Espagne.

***Pseudomeira ferdinandi* (Sainte-Claire Deville, 1914)**

1 ex., Bonifacio, Corse (20) sous le nom de *Peritelus obscurus* ssp. *ferdinandi* (parvulus) (N°5290).
Endémique de Corse.

***Pseudomeira flavipennis* (Jacquelin du Val, 1852)**

4 ex., Nyons, Drôme (26) sous le nom de *Peritelus flavipennis* ; 1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) sous le nom de *Peritelus flavipennis* ; 1 ex., Vals-les-Bains, Ardèche (07) sous le nom de *Peritelus flavipennis* (N°8875) ; 1 ex., Dalmatie, Croatie, sous le nom de *Peritelus flavipennis* (N°9325).

France méridionale, Italie, Croatie.

***Pseudomeira foveithorax* (Desbrochers, 1875)**

3 ex., Bonifacio, Corse (20) (N°5289).
Endémique de Corse.

***Pseudomeira muscorum* (Desbrochers, 1871)**

1 ex., Bonifacio, Corse (20) (N°3736).
Endémique de Corse.

***Pseudomeira necessaria* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06), sous le nom de *Peritelus necessaria* (N°9923).
Endémique de la France méridionale.

***Pseudomeira nicaeensis* (Stierlin, 1883)**

7 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06), sous le nom de *Peritelus nicaeensis* (N°6617).
France, endémique des Alpes-Maritimes.

***Pseudomeira rustica* (Boheman, 1842)**

3 ex., Nyons, Drôme (26) sous le nom de *Peritelus rusticus* (N°8874).
Endémique du Sud de la France.

***Pseudoperitelus senex* Boheman, 1834**

1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) ; 5 ex., La Bernerie, Loire-Atlantique (44) ; 1 ex., Concarneau, Finistère (29), 1885 (N°4492).
France, Espagne, Autriche, Italie.

***Simo hirticornis* (Herbst, 1795)**

4 ex., Suisse ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2536).

France, Espagne, Suisse, Autriche, Italie, Allemagne, Danemark, Tchéquie, Pologne, Suède, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine.

***Simmeiopsis cremieri* (Boheman, 1842)**

1 ex., Digne, Alpes-de-Haute-Provence (04) (N°5292).

France : basse Provence, Bouches-du-Rhône, Basses Alpes, Italie.

***Simmeiopsis platysoma* (Seidlitz, 1865)**

4 ex., Rompon, Ardèche (07) sous le nom de *subdepressus* (N°2058).

France méridionale : Bouches-du-Rhône, Ardèche et Pyrénées-Orientales.

***Simmeiopsis schoenherri* (Boheman, 1842)**

3 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°1582).
France : région littorale de Provence, Italie.

Phyllobiini

***Oedecnemidius varius* (Brullé, 1832)**

2 ex., Constantinople (Istanbul), Turquie (N°6491).
Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Turquie.

***Parascythopus apollinis* (Miller, 1862)**

4 ex., Corfou, Grèce (N°3707).
Grèce.

***Phyllobius (Alsus) brevis* Gyllenhal, 1834**

1 ex., sud de la Russie (N°5299).
Allemagne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Belarussie, Lituanie, Russie, Turquie.

***Phyllobius (Dieletus) argentatus* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29), 1885, 1886 ; 1 ex., Kerlaudy, Plouéan, Finistère (29) 1883 (N°1342).

Toute l'Europe sans exception, jusqu'en Sibérie et au Japon.

***Phyllobius (Dieletus) mediatu*s Reitter, 1888**

2 ex., Caucase, Russie (N°9332).
Georgie, Turquie, Ukraine, Caucase.

***Phyllobius (Ectomogaster) fulvago* Gyllenhal, 1834**

4 ex., Syrie (N°4664) ; 1 ex., Anatolie, sous le nom d'*akbesianus* (N°9930).
Bosnie, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus* (Scopoli, 1763)**

(= *Curculio calcaratus* Fabricius, 1792)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *calcaratus* ; 1 ex., Allemagne sous le nom de *calcaratus* ; 6 ex., Lille, Nord (59) (N°1949) ; 1 ex., Belgique, sous le nom d'*atrovirens* ; 1 ex., la Grande Chartreuse, Isère (38) sous le nom d'*atrovirens* (N°5298).

Europe entière, septentrionale et centrale.

***Phyllobius (Metaphyllobius) pilicornis* Desbrochers, 1873**

1 ex., Constantinople (Istanbul), Turquie (N°6597).
Pologne, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie, Macédoine, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Turquie.

***Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus* Gyllenhal, 1834**

(= *Curculio urticae* De Geer, 1775)

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*urticae* ; 1 ex., Guingamp, Côtes-d'Armor (22) sous le nom d'*urticae* ; 1 ex., Lille, Nord (59) sous le nom d'*urticae* (N°2230).

Europe septentrionale jusqu'en Sibérie.

***Phyllobius (Nanoschetus) cylindricollis* Gyllenhal, 1834**

1 ex., Russie (N°8044) ; 1 ex., sud de la Russie sous le nom d'*hebes* (N°5300) ; 2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban, sous le nom de *crassicornis* (N°2783).
Russie, Turquie.

***Phyllobius (Nemoicus) oblongus* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°1386).

Europe entière septentrionale et centrale.



Phyllobius oblongus (© RL)

***Phyllobius (Parnemoicus) roboretanus* Gredler, 1882**

11 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°801) ; 1 ex., Tyrol, Autriche (N°8787).

Espagne, France, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Moldavie, Lituanie, Lettonie, Angleterre, Irlande. Europe entière septentrionale et centrale.

***Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis* (Fabricius, 1792)**

6 ex., Autriche (N°4132).

Europe septentrionale et centrale.

***Phyllobius (Phyllobius) arborator* (Herbst, 1797)**

3 ex., Hongrie ; 1 ex., Monte Rosa, Italie, (N°3706).

France, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie, Russie, Finlande, Bulgarie.

***Phyllobius (Phyllobius) betulinus* (Bechstein & Scharfenberg, 1805)**

(= *Curculio betulae* Fabricius, 1801)

7 ex., Hongrie, sous le nom d'*aurifer* (N°5944) ; 5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliozou, Ploujean, Finistère (29) 1886 (N°477).

Toute l'Europe continentale du Portugal à la Russie, Turquie.

***Phyllobius (Phyllobius) etruscus* Desbrochers, 1873**

1 ex., Istrie, Autriche (N°9929).

Italie.

***Phyllobius (Phyllobius) longipilis* Boheman, 1843**

1 ex., Italie sous le nom de *fulvipilis* (N°9928).

Italie, Croatie, Bulgarie.

***Phyllobius (Phyllobius) pellitus* Boheman, 1843**

1 ex., Sardaigne, Italie (N°4470).

Corse, Sardaigne.

***Phyllobius (Phyllobius) pyri* (Linnaeus, 1758)**

10 ex., Morlaix, Finistère (29) 1884 (N°1272).

Toute l'Europe.

***Phyllobius (Phyllobius) thalassinus* Gyllenhal, 1834**

1 ex., Autriche sous le nom de *scutellaris* (N°9927).

Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, Russie.

***Phyllobius (Phyllobius) tuberculifer* Chevrolat, 1865**

2 ex., Madrid, Espagne (N°3362).

Espagne, Portugal.

***Phyllobius (Phyllobius) vespertinus* (Fabricius, 1792)**

1 ex., Hongrie, sous le nom d'*artemisiae* (N°9587).

Espagne, Angleterre, France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Tchèque, Pologne, Moldavie, Ukraine, Belgique, Lituanie, Lettonie, Russie, Suède.

***Phyllobius (Plagijs) montanus* Miller, 1862**

9 ex., Dalmatie, Croatie (N°7383).
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie,
Macédoine, Grèce, Slovaquie, Hongrie.

***Phyllobius (Plagijs) pallidus* (Fabricius, 1792)**

4 ex., Autriche, sous le nom d'*incanus* ; 2 ex.,
Toscane, Italie (N°6745).
Suisse, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie,
Bosnie, Albanie, Macédoine, Grèce, Bulgarie,
Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis* Germar, 1824**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Penalliorzou,
Ploujean, Finistère (29), 1886, 1890 (N°4424).
Toute l'Europe, Angleterre, Sibérie.

***Phyllobius (Subphyllobius) armeniacus* Kirsch, 1878**

1 ex., Caucase, Russie (N°9334).
Russie, Pologne, Hongrie.

***Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris* (Laicharting, 1781)**

6 ex., Lille, Nord (59) sous le nom de *pomona* ; 4 ex.,
Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Barcelone, Espagne
(N°2108) ; 1 ex., France Sud ; 1 ex., Santec, Finistère
(29) 1870 ; 1 ex., Saint-Efflam, Plestin-les-Grèves (22)
1878 (N°5302).
Toute l'Europe, Iles Britanniques, Turquie.

***Pseudomylocerus (Argoptochus) bisignatus* (Germar, 1824)**

5 ex., Toscane, Italie ; 1 ex., Istrie, Croatie (N°5865).
Italie, Autriche, Croatie, Bosnie, Hongrie, Ukraine.

***Pseudomylocerus (Argoptochus) quadrisignatus* (Bach, 1856)**

3 ex., Thuringe, Allemagne (N°8456).
Allemagne, Pologne, Slovaquie, Ukraine.

***Pseudomylocerus (Pseudomylocerus) canescens magnanoi* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999**

4 ex., France Sud sous le nom de *mus* ; 1 ex., Tessin,
Suisse sous le nom de *cinerascens* (N°5301).
Italie.

***Pseudomylocerus (Pseudomylocerus) sinuatus* (Fabricius, 1801)**

5 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Lille, Nord
(59) (N°2162).
Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine, Bulgarie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne,
Moldavie, Turquie.

***Rhinoscythrops serripes* (Desbrochers, 1873)**

1 ex., Grèce (N°9333).
Croatie, Bosnie, Albanie, Macédoine, Bulgarie, Grèce,
Turquie.

Psallidiini***Psallidium maxillosum* (Fabricius, 1792)**

2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2778).
Europe orientale.

***Psallidium sculpturatum* Boheman, 1839**

2 ex., Turquie (N°7412).
Hongrie, Grèce.

***Psallidium spinimanum* Reiche, 1861**

1 ex., Grèce (N°9357).
Grèce.

Sciaphilini***Barypeithes indigens indigens* (Boheman, 1834)**

1 ex., Portugal (N°9490).
Portugal.

***Barypeithes sulcifrons sulcifrons* (Boheman, 1843)**

1 ex., Guadarrama, Espagne (N°4848).
France, Espagne, Angleterre.

***Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785)**

5 ex., Bohême, Tchéquie (N°4997).
Toute l'Europe septentrionale, Russie, Turquie.

***Brachysomus hirtus* (Boheman, 1845)**

1 ex., Dobrudscha, mer Noire, Bulgarie (N°8790).
Europe occidentale.

***Brachysomus hispidus* (Redtenbacher, 1849)**

1 ex., Dalmatie, Croatie (N°9588).
Pologne, Autriche, Italie, Slovaquie, Hongrie,
Roumanie, Ukraine.

***Brachysomus setiger* (Gyllenhal, 1840)**

6 ex., Autriche (N°4143).
Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Slovénie,
Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Roumanie,
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Ukraine.

***Brachysomus subnudus* (Seidlitz, 1868)**

6 ex., Hongrie ; 1 ex., Autriche (N°6825).
Allemagne, Pologne, Autriche, Hongrie, Tchéquie,
Slovaquie, Ukraine.

***Brachysomus villosulus* (Germar, 1824)**

2 ex., Prague, Tchéquie (N°5176).
Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Roumanie,
Ukraine.

***Chiloneus meridionalis* (Boheman, 1838)**

1 ex., Sicile (N°9343).
Sicile

***Edmundia claviceps* Schilsky in Kuster, 1911**

1 ex., Caucase, Russie (N°9344).
Arménie.

***Eusomatus taeniatus* (Krynicky, 1834)**

4 ex., Dobrudscha, mer Noire, Bulgarie, (N°7029)
Russie.

***Eusomus beckeri* Tournier, 1874**

1 ex., Russie méridionale (N°5260).
Russie, Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Grèce,
Turquie.

***Eusomus ovulum* Germar, 1824**

1 ex., lieu inconnu (France) (N°459).
Europe centrale jusqu'en Russie, Turquie.

***Exomias araneiformis araneiformis* (Schrank, 1781)**

(= ***Barypeithes araneiformis* (Schrank, 1781)**)

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-
Rhin (67) (N°2538).
Europe occidentale.

***Exomias carpathicus* (Reitter, 1885)**

(= ***Barypeithes carpathicus* (Reitter, 1885)**)

1 ex., Hongrie (N°9938).
Ukraine.

***Exomias chevrolati* (Boheman, 1843)**

(= ***Barypeithes chevrolati* (Boheman, 1843)**)

4 ex., Vienne, Autriche (N°4942).
France, Italie, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Croatie,
Bosnie, Serbie, Macédoine, Pologne, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Suède.

***Exomias companyonis* (Boheman, 1843)**

(= ***Barypeithes companyoi* (Boheman, 1843)**)

3 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66)
(N°2826).
Sud de la France.

***Exomias mollicomus* (Ahrens, 1812)**

(= ***Barypeithes mollicomus* (Ahrens, 1812)**)

5 ex., Bohème, Tchéquie ; 1 ex., Morlaix, ?? (Erreur
d'étiquetage ?) Finistère (29) (N°5000) douteux.
Une partie de l'Europe jusqu'en Russie et
Scandinavie. France, rare.

***Exomias pellucidus pellucidus* (Boheman, 1834)**

(= ***Barypeithes pellucidus* (Boheman, 1834)**)

10 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1349).
Toute l'Europe centrale et septentrionale.

***Exomias tenex* (Boheman, 1843)**

(= ***Barypeithes tenex* (Boheman, 1843)**)

7 ex., Prague, Tchéquie (N°5607).
France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Tchéquie,
Autriche, Hongrie.

***Foucartia chloris* Kiesenwetter, 1864**

2 ex., Grèce (N°9346).
Grèce.

***Foucartia cremieri* Jacquelin du Val, 1854**

1 ex., Loudun, Vienne (86) (N°6096).
France, Espagne.

***Foucartia elegans* Kraatz, 1859**

1 ex., Crète (N°9345).
Grèce, Crète.

***Foucartia liturata* (Stierlin, 1884)**

3 ex., Hongrie (N°8454).
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Ukraine.
Turquie.

***Foucartia squamulata* (Herbst, 1795)**

2 ex., Prague, Tchéquie (N°5604).
France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche,
Pologne, Slovaquie, Slovaquie, Croatie, Bosnie,
Serbie, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Russie,
Moldavie, Suède.

***Paophilus hampei* (Seidlitz, 1867)**

6 ex., Prague, Tchéquie (N°5605).
Bulgarie.

***Pleurodirus (Pleurodirus) carinula* (Olivier, 1808)**

3 ex., Guadarrama, Espagne sous le nom de
crisatus (N°3022) ; 1 ex., Espagne (N°9935).
Espagne, très rare en France.

***Pleurodirus (Pleurodirus) fairmairii* (Kiesenwetter, 1851)**

4 ex., Barcelone, Espagne, sous le nom d'*ovipennis*
(N°6928).
Sud de la France, Espagne.



Pleurodirus fairmairei (© RL)

***Pleurodirus (Pseudometallites) murinus* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., sud de la France (N°5267) ; 4 ex., Nyons,
Drôme (26) sous le nom de *globosus* (N°8873).
Sud de la France.



Pleurodirus murinus (© RL)

***Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2057).
Toute l'Europe.

***Sciaphilus costulatus* Kiesenwetter, 1851**

1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) (N°5259).
Espagne, France, Pyrénées.

***Sciaphobus caesius* (Hampe, 1870)**

1 ex., Transylvanie, Roumanie (N°8046).
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie.

***Sciaphobus scitulus* (Germar, 1824)**

1 ex., Suisse ; 5 ex., Autriche (N°3226)
Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Albanie.

***Sciaphobus smaragdinus* (Boheman, 1839)**

1 ex., Dalmatie (N°7403).
Italie, Croatie, Bosnie.

***Sciaphobus squalidus* (Gyllenhal, 1834)**

4 ex., Dobrudscha, mer Noire, Bulgarie (N°7023).
Europe centrale, Russie, Turquie.

***Sciaphobus vittatus* (Gyllenhal, 1834)**

4 ex., Dalmatie (N°4131).
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine.

Sitonini***Andrion regensteinense* (Herbst, 1794)**

(= *Sitona regensteinensis* (Herbst, 1794))

7 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°461).
Europe, Russie.



Andrion regensteinense (© RL)

***Charagmus cachectus* Gyllenhal, 1834**

(= *Sitona cachectus* Gyllenhal, 1834)

2 ex., cap Palos, Espagne (N°8125) ; 1 ex., Bône (Annaba), Algérie sous le nom de *subcostatus* (N°3283) ; 2 ex., France (N°7407).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Grèce.

***Charagmus gressorius* (Fabricius, 1792)**

(= *Sitona gressorius* (Fabricius, 1792))

1 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) ;
2 ex., Bonifacio, Corse (N°460).
Europe, Russie, Suède, Crète, Chypre, Turquie.

***Charagmus griseus* (Fabricius, 1775)**

(= *Sitona griseus* (Fabricius, 1775))

5 ex., Hyères, Var (83) ; 1 ex., France ; 1 ex., Santec, Finistère (29) (N°2228).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Charagmus intermedius* Küster, 1847**

(= *Sitona intermedius* Küster, 1847)

1 ex., Bonifacio, Corse sous le nom *vestitus* (N°2521).
Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Charagmus variegatus* Fähræus, 1840**

(= *Sitona formaneki* Reitter, 1903)

4 ex., Santec, Finistère (29) sous le nom de *variegatus* (N°7407). 2 ex., Bône (Annaba), Algérie sous le nom de *setulifer* (formaneki) (N°4467).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile.

***Coelositona cambricus* Stephens, 1831**

(= *Sitona cambricus* Stephens, 1831)

3 ex., Pannelé, Saint-Martin-des-Champs (29) 1892 (N°2342).
Europe de l'Ouest, Turquie.



Coelositona cambricus (© RL)

***Coelositona limosus* Rossi, 1892**

(= *Sitona limosus* Rossi, 1892)

1 ex., Grèce sous le nom d'*ambulans* (N°7030) ;
1 ex., Grèce (N°9355).
Portugal, Espagne, France, Italie, Sardaigne, Grèce, Crète, Chypre, Turquie.

***Sitona brucki* Allard, 1870**

1 ex., Barcelone, Espagne (N°9066).
Espagne, Portugal, Turquie.

***Sitona cinnamomeus* Allard, 1863**

1 ex., Bône (Annaba), Algérie (N°5264)

Portugal, Espagne, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Albanie, Grèce, Bulgarie, Turquie.

***Sitona cylindricollis cylindricollis* Fåhraeus, 1840**

6 ex., Barcelone, Espagne (N°6829).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sitona discoideus* Gyllenhal, 1834**

3 ex., Ajaccio, Corse ; 1 ex., Carthagène, Espagne (N°3078) ; 1 ex., Turquie, sous le nom de *biseriatus* (N°7408).

Portugal, Espagne, France, Corse, Autriche, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Chypre.

***Sitona gemellatus* Gyllenhal, 1834**

2 ex., Angers, Maine-et-Loire (49) ; 1 ex., Troyes, Aube (10) (N°2709).
Europe de l'Ouest, Turquie.

***Sitona hispidulus* (Fabricius, 1776)**

8 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1224) ; 1 ex., Mongolie, sous le nom de *foedus* (N°9941).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Sitona humeralis* Stephens, 1831**

4 ex., Lyon, Rhône (69) ; 1 ex., La Salette, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) 1890 ; 3 ex., Kerarmel, Plouezoch, Finistère (29) 1891 ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) (N°2523).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Sitona inops* Gyllenhal, 1832**

2 ex., Autriche (N°5265).
Une partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1075).
Toute l'Europe, Russie, Turquie

***Sitona lividipes lividipes* Fåhraeus, 1840**

1 ex., Alexandrie, Egypte (N°9042).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Bulgarie, Turquie.

***Sitona longulus* Gyllenhal, 1834**

2 ex., Turquie (N°9061).
Europe, Russie, Turquie.

***Sitona macularius macularius* (Marsham, 1802)**

(= *Curculio crinitus* Herbst, 1795)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *crinitus* (N°2229) ; 1 ex., Egypte sous le nom de *seriestosus* (N°9940).

Toute l'Europe.

***Sitona obsoletus obsoletus* Gmelin, 1790**

(= *Curculio flavescens* Marsham, 1802)

(= *Sitona lepidus* Gyllenhal, 1834)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *lepidus* ;
1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) sous le nom de *lepidus* (N°1345)

Toute l'Europe de l'Islande à La Turquie.

***Sitona puncticollis* Stephens, 1831**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2502).

Europe entière, Russie, Turquie.

***Sitona striatellus* Gyllenhal, 1834**

(= *Sitona tibialis* (Herbst, 1795))

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *tibialis* ;
1 ex., Kerbaul, Ploujean, Finistère (29) sous le nom de *tibialis*, 1891 ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) sous le nom de *tibialis*, 1888 (N°1344).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Sitona sulcifrons sulcifrons* (Thunberg, 1798)**

1 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1096).

Toute l'Europe.

***Sitona suturalis* Stephens, 1831**

7 ex., Lille, Nord (59) (N°8894) ; 1 ex., Morlaix (29) sous le nom de *lateralis* (N°1094).

Toute l'Europe.

***Sitona tenuis* Rosenhauer, 1847**

1 ex., Béziers, Hérault (34) sous le nom de *callosus* (N°6079).

Espagne, France, Suisse, Autriche, Italie, Slovaquie, Pologne, Ukraine.

***Sitona verecundus* Rossi, 1890**

3 ex., Ajaccio, Corse (N°3077).

Espagne, France, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Crète, Turquie.

***Sitona waterhousei schaeferi* Ruter, 1945**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kerarmel Plouezoch, Finistère (29) 1891 ; 1 ex., Santec, Finistère (29) 1869 (N°5511).

Europe de l'Ouest.

***Sitona waterhousei waterhousei* Walton, 1846**

1 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex., Alger, Algérie (N°5511).

Toute l'Europe de l'Ouest.

Polydrusini

***Homapterus subnudus* (Fairmaire, 1856)**

2 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) (N°5268).

Espagne, France, Pyrénées.

***Liophloeus (Liophloeodes) gibbus* Boheman, 1842**

3 ex., Carpates, Roumanie (N°6318).

Pologne, Ukraine, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie.

***Liophloeus (Liophloeodes) herbstii* Gyllenhal, 1834**

2 ex. Hongrie (N°7406).

Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Ukraine.

***Liophloeus (Liophloeodes) lentus* Germar, 1824**

1 ex., Autriche (N°6595) ; 1 ex., Hongrie (N°8847).

Espagne, France (assez rare), Autriche, Europe centrale.

***Liophloeus (Liophloeus) ophthalmicus* Stierlin, 1889**

1 ex., Istrie, Croatie (N°9946).

Italie, Hongrie, Croatie, Bosnie.

***Liophloeus (Liophloeus) tessulatus* (Muller, 1776)**

8 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°405) ; 3 ex., Loèche, Valais, Suisse (N°9445) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) var *germinatus* (N°3238) ; 4 ex., Riom, Puy-de-Dôme (63) var *atricornis* (N°4466) ; 1 ex., Isère (38) (N° ?).

Europe, Scandinavie, Russie.

***Pachyrhinus cedri* (Chevrolat, 1866)**

2 ex., Teniet-el-Kaad, Algérie (N°7588).

Espagne, Baléares, Afrique du Nord.

***Pachyrhinus glabratus* (Chevrolat, 1866)**

2 ex., L'Escurial, Espagne (N°3025).

Espagne, Portugal.

***Pachyrhinus lethierryi* (Desbrochers, 1875)**

1 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°6269).

France, Corse, Sardaigne.

***Pachyrhinus mustela* (Herbst, 1797)**

5 ex., Autriche (N°3568).

Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Bulgarie.

***Pachyrhinus squamosus* (Kiesenwetter, 1852)**

1 ex., Digne, Alpes de Haute Provence (04) (N°6090).

France, Espagne, Portugal.

***Polydrusus (Chaerodrys) setifrons* Jacquelin du Val, 1852**

4 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex., Montpellier, Hérault (34) 1894 (N°2708).

Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Croatie, Serbie.

***Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus* (Germar, 1824)**

2 ex., Hanovre, Allemagne (N°958).

Espagne, France, Europe centrale jusqu'en Russie.

***Polydrusus (Conocetus) cylindrithorax* Desbrochers, 1900**

2 ex., Grèce sous le nom de *cylindricollis* (N°8045).

Grèce, Turquie.

***Polydrusus (Conocetus) gracilicornis* Kiesenwetter, 1864**

1 ex., Grèce (N°9338).

Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie.

***Polydrusus (Conocetus) kahri* Kirsch, 1865**

1 ex., Toscane, Italie (N°2525) ; 1 ex., Görz, Autriche, sous le nom de var. *florentinus* (N°8815).

France, Corse, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Grèce, Crète, Chypre.

***Polydrusus (Eudipnus) brevipes* (Kiesenwetter, 1864)**

2 ex., Dalmatie, Croatie (N°9337).

Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine.

***Polydrusus (Eudipnus) cocciferae* Kiesenwetter, 1864**

3 ex., Morée, Grèce (N°9336).

Grèce, Crète, Chypre.

***Polydrusus (Eudipnus) formosus* (Mayer, 1779)**

(= *Curculio sericeus* Schaller, 1783)

5 ex., Morlaix, Finistère (29), sous le nom de *sericeus* ; 2 ex., Gers (32) sous le nom de *sericeus* (N°465).

Europe, Angleterre, Irlande, Suède.

***Polydrusus (Eudipnus) lateralis* Gyllenhal, 1834**

3 ex., Saint-Martin-Lentosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes (06) (N°6440).

Espagne, France, Italie, Croatie, Bosnie.

***Polydrusus (Eudipnus) mollis* (Ström, 1768)**

2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2842).

Toute l'Europe.

***Polydrusus (Eurodrusus) armipes* Brullé, 1832**

1 ex., Morée, Grèce (N°9340).

Italie, Sicile, Grèce, Crète, Chypre, Bulgarie, Turquie.

***Polydrusus (Eurodrusus) cervinus* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., La Boissière, Ploujean, Finistère (29) 1901 ; 1 ex., Lesquiffiou, Pleyber-Christ, Finistère (29) 1901 ; 2 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Suisse (N°2222).

Toute l'Europe centrale et septentrionale.

***Polydrusus (Eurodrusus) chrysocephalus* (Chevrolat, 1859)**

1 ex. Alger (N°3018).

Algérie.

***Polydrusus (Eurodrusus) confluens* Stephens, 1831**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Lot-et-Garonne (47) (N°3704) ; 1 ex., Morlaix, Finistère sous le nom

de *chrysomela* ; 3 ex., Santec, Finistère (29) 1890 ;
1 ex., Tréguier, Côtes-d'Armor (22) 1877 (N°1346).
Toute l'Europe jusqu'à la Russie.



Polydrusus confluens (© RL)

***Polydrusus (Eurodrusus) griseomaculatus*
Desbrochers, 1869**

4 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°9912).
France, montagnes de Provence.

***Polydrusus (Eurodrusus) pilosus* Gredler, 1866**

1 ex., Briançon, Hautes-Alpes (05) sous le nom
d'*arvernicus* (N°5273) ; 3 ex., Saint-Martin-Lentosque
(Saint-Martin-Vesubie), Alpes-Maritimes (06) var.
nodulosus (N°6596).
Toute l'Europe de l'Islande à la Russie.

***Polydrusus (Eurodrusus) planifrons* Gyllenhal, 1834
(= *Curculio prasinus* Olivier, 1790)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
planifrons (N°2105) ; 4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous
le nom de *bohemanii* ; 1 ex., Beauvais, Oise (60)
(N°1102).
Portugal, France, Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie,
Croatie, Bosnie, Bulgarie, Turquie.

***Polydrusus (Eurodrusus) pulchellus pulchellus*
Stephens, 1831**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *salsicola* ;
1 ex., Santec, Finistère (29) 1870 (N°4792).
Espagne, France, Angleterre, Irlande, Belgique, Pays-
Bas, Allemagne, Danemark, Biélorussie.

***Polydrusus (Eurodrusus) smaragdulus* (Fairmaire,
1859)**

2 ex., Portugal (N°9491).
Portugal, Espagne.

***Polydrusus (Eustolus) corruscus* Germar, 1824**

1 ex., Toulouse, Haute-Garonne (31) (N°5269).
France, Suisse, Allemagne, Autriche, Pologne,
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine,
Biélorussie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie.

***Polydrusus (Eustolus) impressifrons* Gyllenhal, 1834**

1 ex., lieu inconnu (N°403).
Europe centrale, France, Islande.

***Polydrusus (Eustolus) interstitialis* Perris, 1864**

5 ex., Madrid, Espagne (N°3019).
Espagne, Portugal.

***Polydrusus (Eustolus) pterygomalis* Boheman, 1840**

2 ex., Pologne (N°4388).
Toute l'Europe jusqu'en Russie.

***Polydrusus (Eustolus) variegatus* Desbrochers,
1870**

1 ex., Espagne (N°5272).
Espagne.

***Polydrusus (Leucodrusus) tibialis* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Illyrie (N°9335).
Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie,
Macédoine, Bulgarie, Turquie.

***Polydrusus (Metallites) aeratus aeratus*
(Gravenhorst, 1807)**

(= *Curculio atomarius* Olivier, 1807)

4 ex., Monte Rosa, Italie, sous le nom d'*atomarius*
(N°4227).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Suisse,
Italie, Autriche, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie,
Slovénie, Croatie, Bosnie, Pologne, Roumanie,
Ukraine, Russie.

***Polydrusus (Metallites) anchoralifer* (Chevrolat,
1859)**

3 ex., Alger, Algérie (N°3021).
Algérie.

***Polydrusus (Metallites) elegantulus* (Boheman,
1840)**

5 ex., Dalmatie, Croatie (N°7402).
Italie, Autriche, Croatie, Bosnie, Grèce.

***Polydrusus (Metallites) impar* Gozis, 1882**

4 ex., Hanovre, Allemagne (N°957).
Europe, Islande, sauf Russie et Scandinavie.

***Polydrusus (Metallites) marginatus* Stephens, 1831**

1 ex., Gannat, Allier (03) sous le nom d'*iris*
(N°5266) ; 3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom
d'*ambiguus* ; 1 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35)
(N°2343).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Belgique,
Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Autriche,
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie,
Roumanie, Bulgarie, Pologne, Norvège, Angleterre,
Irlande.

***Polydrusus (Metallites) parallelus* (Chevrolat, 1860)**

5 ex., Bonifacio, Corse (N°2834).
France, Corse, Sardaigne, Italie, Croatie, Bosnie.

***Polydrusus (Metallites) pirazzolii* Stierlin, 1857**

6 ex., Toscane, Italie (N°6746).
Italie, Sicile, Croatie, Bosnie.

***Polydrusus (Piezocnemus) paradoxus* Stierlin, 1859**
5 ex., Hongrie (N°5922).
France (très rare), Italie, Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne.

***Polydrusus (Poecilodrusus) viridicinctus* Gyllenhal, 1834**
1 ex., Constantinople (Istanbul), Turquie (N°6529).
Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie, Crète, Chypre, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine.

***Polydrusus (Polydrusus) fulvicornis* (Fabricius, 1792)**
7 ex., Autriche (N°2524).
Europe centrale jusqu'en Scandinavie et en Russie.
France, assez rare Alpes, Massif central.

***Polydrusus (Polydrusus) leucaspis* Boheman, 1840**
1 ex., Bonifacio, Corse (N°5275) ; 4 ex., Bonifacio, Corse, var. *suturellus* (N°1840).
Corse, Sardaigne.

***Polydrusus (Polydrusus) picus* (Fabricius, 1792)**
3 ex., Vénétie, Italie ; 1 ex., lieu inconnu (N°3352).
France, Europe centrale, Russie.

***Polydrusus (Polydrusus) sparsus* Gyllenhal, 1834**
1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) ; Briançon, Hautes-Alpes (05) ; 1 ex., Viareggio, Italie (N°2107).
Portugal, Espagne, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce.

***Polydrusus (Polydrusus) tereticollis* (De Geer, 1775)**
4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Lesquiffiou, Pleyber-Christ, Finistère (29) 1881 ; Kerlaudy, Plouéan, Finistère (29) 1884 (N°888).
Toute l'Europe, du Portugal à la Scandinavie et à la Russie

Tanymecini

***Chlorophanus caudatus* Fahaeus, 1840**
1 ex., Turkestan (N°9594).
Russie, Asie centrale.

***Chlorophanus excisus* (Fabricius, 1801)**
2 ex., Serbie (N°7031) ; 1 ex., Hongrie sous le nom de *fallax* (N°7409).
Suisse, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Grèce.

***Chlorophanus flavescens* Fabricius, 1787**
(= ***Chlorophanus graminicola* Schönherr, 1832**)
1 ex., Toscane, Italie sous le nom de *graminicola* (N°2526).
France, Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Biélorussie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Moldavie.

***Chlorophanus gibbosus* (Paykull, 1792)**
2 ex., Allemagne, sous le nom de *pollinosus* (N°2223).
Europe jusqu'à la Russie.

***Chlorophanus micans* Krynicki, 1832**
3 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2779).
Russie.

***Chlorophanus sellatus* (Fabricius, 1798)**
4 ex., Turquie (N°7032).
Russie.



Chlorophanus viridis viridis (© RL)

***Chlorophanus viridis viridis* (Linnaeus, 1758)**
(= ***Chlorophanus salicicola* Germar, 1824**)
(= ***Chlorophanus bompari* Rey, 1894**)
2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Le Cosquérou, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Dourduff en terre, Ploujean, Finistère (29) ; 1 ex., Tournon sur Rhône, Ardèche (07) (N°468) ; 3 ex., Tournon sur Rhône, Ardèche (07) sous le nom de *salicicola* (N°1682).
Europe occidentale et centrale, Russie.

***Cycloderes (Aramorius) exiguus* (Faust, 1887)**
1 ex., Portugal (N°9492).
Espagne.

***Cycloderes (Aramorius) guinardi* (Jacquelin du Val, 1852)**
1 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65) (N°4901).
Espagne, France (Pyrénées), Croatie.

***Cycloderes (Cycloderes) canescens* (Rossi, 1792)**
1 ex., Bougie (Annaba), Algérie (N°3434).
Espagne, Baléares, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Moldavie.

***Cycloderes (Cycloderes) depilis* (Fairmaire, 1863)**
5 ex., Bonifacio, Corse (N°3076)
France, Italie.

***Cycloderes (Cycloderes) fullo* (Erichson, 1841)**
2 ex., lieu inconnu (N°466).
Espagne.

***Cycloderes (Cycloderes) glabratus* (Gyllenhal, 1833)**
4 ex., L'Escurial, Espagne ; Madrid, Espagne (N°5279).
Espagne.

***Cycloderes (Cycloderes) pilosulus* (Herbst, 1796)**

2 ex., Prague, Tchéquie (N°3943).
Belgique, Allemagne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie,
Pologne, Biélorussie, Moldavie, Russie.

***Cycloderes (Cycloderes) tessellatus* (Gyllenhal, 1833)**

1 ex., Portugal (N°5278).
Portugal, Espagne.

***Tanymecus (Episomecus) dilaticollis* Gyllenhal, 1834**

2 ex., Dobrudscha, mer Noire, Bulgarie (N°7410) ;
1 ex., Hongrie sous le nom de *vittiger* (N°9595).
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie,
Bosnie, Serbie, Macédoine, Grèce, Bulgarie,
Roumanie, Moldavie, Ukraine.

***Tanymecus (Tanymecus) palliatus* (Fabricius, 1787)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 3 ex., Penalliorzou,
Ploujean, Finistère (29) 1886 (N°467) ; 1 ex., Toscane,
Italie, sous le nom de *revelieri* (N°8857).
Europe, Russie, Suède.

Trachyploeini

***Caenopsis fissirostris* (Walton, 1847)**

5 ex., Tréfeunténiou, Ploujean, Finistère (29), 1901 ;
1 ex., Pennalliorzou, Ploujean, Finistère (29) (N°2035).
Espagne, Portugal, France, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, Angleterre, Irlande.



Caenopsis fissirostris (© RL)

***Caenopsis larraldi* (Perris, 1858)**

1 ex., Dax, Landes (40) (N°9992).
France : Sud-Ouest, rare et localisé, Espagne.

***Caenopsis waltoni* (Boheman, 1843)**

1 ex., Kerarmel, Plouézoch, Finistère (29) ; 2 ex.,
Ploujean, Finistère (29), 1901 ; 1 ex., Roscoff,
Finistère (29) 1891 (N°2036).
France, Portugal, Espagne, Belgique, Allemagne.



Caenopsis waltoni (© RL)

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) aristatus* (Gyllenhal, 1827)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliorzou,
Ploujean, Finistère (29) 1886 ; 1 ex., Saint-Martin-
Lentosque (Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes
(06) (N°6378).
Toute l'Europe.

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) carpetanus* Uhagon, 1885**

1 ex., Espagne (N°9944).
Espagne.

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) chevrolati* Seidlitz, 1868**

2 ex., L'Escorial, Espagne (N°5297).
Espagne.

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) discors* Desbrochers, 1875**

3 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *curvipes* ;
1 ex., île de Batz, Finistère (29) 1872 sous le nom de
curvipes ; 1 ex., Kerarmel, Plouezoch, Finistère (29)
1879 sous le nom de *curvipes* ; 2 ex., Morlaix,
Finistère (29) 1884, 1885 sous le nom de *curvipes*
(N°3970) ; 1 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de
discors (N°5296).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne.

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) horrens* (Gyllenhal, 1834)**

2 ex., L'Escorial, Espagne ; 2 ex., Portugal (N°7586).
Espagne, France.

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) marqueti* Desbrochers, 1875**

3 ex., Oran, Algérie (N°8974).
Algérie, Maroc.

***Cathormiocerus (Cathormiocerus) myrmecophilus* (Seidlitz, 1868)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ile de Batz,
Finistère (29) 1872 ; 1 ex., Keramprat, Saint-Martin,
Finistère (29) 1883 (N°6639).
Portugal, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas,
Angleterre.

Cathormiocerus (Cathormiocerus) socius* Boheman, 1842*(= *Trachyphloeus maritimus* Rye, 1873)**

1 ex., Trévidy, Plouigneau, Finistère, (29) 1882 sous le nom de *maritimus* ; 1 ex., Ile de Batz, Finistère (29) sous le nom de *maritimus* ; 1 ex., Roscoff, Finistère (29) 1891 sous le nom de *maritimus* ; 1 ex., Garlan, Ploujean, Finistère (29) 1882 sous le nom de *maritimus* ; 1 ex., Primel, Plougasnou, Finistère (29) sous le nom de *maritimus* ; 1 ex., Coatconggar, Ploujean, Finistère (29) 1879 sous le nom de *maritimus* (N°2034).

France, Angleterre, Pays-Bas.

Cathormiocerus (Cathormiocerus) spinosus* (Goeze, 1777)*(= *Trachyphloeus olivieri* Bedel, 1883)**

4 ex., Valenciennes, Nord (59) (N°3166).

Toute l'Europe.

***Cathormiocerus (Schaumius) excursor* (Stierlin, 1868)**

1 ex., Grenade, Espagne (N°3349).

Espagne.

***Cathormiocerus (Schaumius) gracilior* Fairmaire, 1870**

1 ex., Espagne (N°7414).

Espagne.

Romualdius scaber* (Linnaeus, 1758)*(= *Trachyphloeus bifoveolatus* (Beck, 1817))**

4 ex., Santec, Finistère (29) sous le nom de *scaber* ; 2 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1886 sous le nom de *bifoveolatus* ; 1 ex., Kerarmel, Plouezoch, Finistère (29) sous le nom de *bifoveolatus* ; 1 ex., Espagne sous le nom de *bifoveolatus* (N°2940) ; 1 ex., Paris, Seine (75) sous le nom de *squamosus* ; 4 ex., Bugey, Ain (01) sous le nom de *bifoveolatus* ; 2 ex., Cabourg, Calvados (14) sous le nom de *bifoveolatus* (N°7585). Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Trachyphloeus (Trachyphloeus) alternans* Gyllenhal, 1834**

4 ex., Hongrie ; 1 ex., Kerarmel, Plouezoch, Finistère (29) 1891 (N°3705).

Toute l'Europe jusqu'en Russie et en Scandinavie.

***Trachyphloeus (Trachyphloeus) fusciscapus* Desbrochers, 1909**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°5295).

Endémique Corse, Sardaigne.

Trachyphloeus (Trachyphloeus) laticollis* Boheman, 1842*(= *Trachyphloeus aureocruciatus* Desbrochers, 1871)**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°5892).

Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Croatie, Albanie, Grèce, Turquie.

***Trachyphloeus (Trachyphloeus) scabriculus* (Linnaeus, 1771)**

6 ex., Lille, Nord (59) ; 1 ex., Lyon, Rhône (69) ; 1 ex., Allemagne (N°7411).

France, Angleterre, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Suède, Russie, Bulgarie, Turquie.

Trachyphloeus (Trachyphloeus) spinimanus* Germar, 1824*(= *Trachyphloeus vicinus* Hoffmann, 1945)**

4 ex., Bonifacio, Corse ; 2 ex., Autriche (N°2539).

Toute l'Europe, Russie, Turquie, Suède, Angleterre.

***Trachyphloeus (Trachyphloeus) ventricosus* Germar, 1824**

1 ex., Hongrie (N°8791).

Autriche, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine.

Tropiphorini***Tropiphorus caesius* (Frigalszky, 1879)**

1 ex., Balkans (N°8796).

Bulgarie.



Tropiphorus cucullatus (© RL)

***Tropiphorus cucullatus* Fauvel, 1888**

1 ex., Valais, Suisse (N°8942).

France, Italie, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Hongrie.

Tropiphorus elevatus* (Herbst, 1795)*(= *Curculio carinatus* O.F. Müller, 1776)**

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *mercurialis* (N°2846) ; 1 ex., Styrie, Autriche (N°9963).

Europe centrale et septentrionale, Russie.



Tropiphorus elevatus (© RL)

***Tropiphorus globatus* (Herbst, 1795)**

1 ex., Carinthie, Autriche (N°9964).
Suisse, Autriche, Slovaquie.

***Tropiphorus obtusus* (Bonsdorf, 1785)**

4 ex., Saint-Martin-Lantosque (Saint-Martin-Vésubie)
Alpes-Maritimes (06) sous le nom de *pedemontanus*
(N°6494).
Europe, Scandinavie, Islande, Russie.

***Tropiphorus styriacus* Bedel, 1883**

1 ex., Autriche (N°9965).
Allemagne, Autriche, Italie.

***Hypera (Hypera) constans* (Boheman, 1834)**

3 ex., Allemagne (N°2233).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Autriche,
Tchéquie, Slovaquie.

***Hypera (Hypera) melancholica* (Fabricius, 1792)
(= *Curculio fuscocinerea* Marsham, 1802)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *murina*
(N°482).
Europe, Russie, Turquie.

***Hypera (Hypera) miles* (Paykull, 1792)
(= *Curculio suspiciosa* Herbst, 1795)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
pedestris (N°1950).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Hypera (Hypera) nigrirostris* (Fabricius, 1775)**

7 ex., Morlaix, Finistère (29) N°(484).
Europe entière.

***Hypera (Hypera) plantaginis* (De Geer, 1775)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Epinal, Vosges
(88) (N°2545).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Hypera (Hypera) postica* (Gyllenhal, 1813)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
variabilis ; 1 ex., Bonifacio, Corse ; 1 ex.,
Strasbourg, Bas-Rhin, (67) (N°2546).
Europe entière.

***Hypera (Hypera) scolymi* (Capiomont, 1868)**

1 ex., Bône (Annaba), Algérie (N°5307).
Espagne, Sicile.

***Hypera (Hypera) venusta* (Fabricius, 1781)
(= *Curculio trilineatus* Marsham, 1802)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de
trilineata ; 1 ex., Santec, Finistère (29) sous le nom
de *trilineata* (N°1319).
Europe entière.

***Hypera (Hypera) viciae* (Gyllenhal, 1813)**

2 ex., Le Plantay, Ain (01) (N°8943).
Toute l'Europe continentale, Russie, Turquie.

Hyperinae

Hyperini

***Herpes porcellus* (Lacordaire, 1863)**

1 ex., Turquie (N°8795).
Ukraine, Moldavie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie,
Turquie.

***Hypera (Dapalinus) meles* (Fabricius, 1792)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Roscoff, Finistère
(29) 1887 ; 1 ex., Bonifacio, Corse (N°2547).
Europe continentale et centrale, Scandinavie, Russie,
Turquie.

***Hypera (Eriromorphus) arundinis* (Paykull, 1792)**

1 ex., Valenciennes, Nord (59) (N°9170).
Europe, Russie.

***Hypera (Eriromorphus) conmaculata* (Herbst, 1795)
(= *Curculio adspersa* Fabricius, 1792)**

1 ex., Saint-Père, Ille-et-Vilaine (35) sous le nom
d'*alternans* (N°9991) ; 3 ex., Morlaix, Finistère (29)
sous le nom de *pollux* ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean,
Finistère (29) 1884 ; 1 ex., Rostrenen, Côtes-d'Armor
(22) 1884 ; 1 ex., Rennes, Ille-et-Vilaine (35) (N°1347).
Toute l'Europe.

***Hypera (Eriromorphus) rumicis* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Roscoff, Finistère
(29) 1884 ; 1 ex., Huelgoat, Finistère (29) ; 1 ex.,
Digne, Alpes de Haute Provence (04) (N°2235).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.



Hypera rumicis (© RL)



Hypera arator (© RL)

***Hypera (Kippenbergia) arator* (Linnaeus, 1758)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *polygona* ;
1 ex., Concarneau, Finistère (29) 1889 ; 1 ex.,
Rennes, Ille-et-Vilaine (35) (N°483).
Europe entière, Russie, Scandinavie.

***Hypera (Trigrinellus) pastinacae* (Rossi, 1790)**

1 ex., Grèce (N°9068) ; 1 ex., Lille, Nord (59) ; 2 ex.,
Oural, sous le nom de *tigrina* (N°6089).
Grande Bretagne, France, Corse, Allemagne, Italie,
Sicile, Sardaigne, Hongrie, Moldavie, Grèce, Turquie,
Chypre.

***Coniatus (Bagoides) splendidulus* (Fabricius, 1781)**

3 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2788).
Russie, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Bulgarie,
Grèce, Turquie.

***Coniatus (Bagoides) suavis* Gyllenhal, 1834**

6 ex., Porto-Vecchio, Corse, sous le nom de
chrysochlorus (N°3079).
Espagne, France, Sardaigne, Italie, Sicile, Croatie.

***Coniatus (Coniatus) repandus* (Fabricius, 1792)**

3 ex., Carcassonne, Aude (11) ; 1 ex., Aranjuez,
Espagne (N°2236).
Espagne, France, Corse, Sardaigne, Sicile.

***Coniatus (Coniatus) tamarisci* (Fabricius, 1787)**

5 ex., sud de la France (N°816) ; 1 ex., Mont-Louis,
Pyrénées-Orientales (66) var. *deyrollei* (N°5419).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie,
Sardaigne, Sicile, Grèce, Crète, Turquie, Chypre.

*Coniatus tamarisci* (© RL)***Coniatus (Coniatus) wenckeri* Capiomont, 1868**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°5418).
France.

***Limobius borealis borealis* (Paykull, 1792)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Rouen, Seine-
Maritime (76) (N°2054).
Europe entière.

*Limobius borealis* (© RL)***Limobius mixtus* (Boheman, 1834)**

4 ex., Santec, Finistère (29) ; 1 ex., Villeneuve-sur-
Lot, Lot-et-Garonne (47) (N°3702).
Angleterre, France, Belgique, Pays-Bas.

*Limobius mixtus* (© RL)***Brachypera (Antidonus) dauci* (Olivier, 1807)**

6 ex., Santec, Finistère (29) sous le nom de
fasciculata (N°2195).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Brachypera (Antidonus) isabellinus* (Boheman, 1834)**

1 ex., Algérie (N°8797).
Sicile.

***Brachypera (Antidonus) zoilus* (Scopoli, 1763)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Cancale, Ille-et-
Vilaine (35) sous le nom de *punctatus* (N°1297).
Toute l'Europe, Russie, Turquie.

***Brachypera (Brachypera) crinita* Boheman, 1834**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°2544).
France, Corse, Italie, Sicile, Grèce, Bulgarie.

***Donus chevrolati* (Capiomont, 1868)**

2 ex., Bône (Annaba), Algérie (N°4471).
Espagne.

***Donus circumvagus* (Boheman, 1842)**

2 ex., Algérie ; 2 ex., Lot-et-Garonne (47) (N°3703).
Espagne, Sicile, Grèce.

***Donus comatus* (Boheman, 1842)**

4 ex., Styrie, Autriche (N°4147).

Allemagne, Pologne, Suisse, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Roumanie, Ukraine.

***Donus globosus globosus* (Fairmaire, 1858)**

(= *Phytonomus rotundatus* Capiomont, 1868)

2 ex., Saint-Martin-Lentosque, Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes (06) (N°6616).
France, Italie.

***Donus hispanicus* (Capiomont, 1868)**

1 ex., Espagne (N°5306).
Espagne.

***Donus ovalis* (Boheman, 1842)**

3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) ; 1 ex., Carpathes, Roumanie (N°2234).
France, Suisse, Autriche, Italie, Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Croatie, Hongrie, Roumanie.

***Donus oxalidis* (Herbst, 1795)**

1 ex., Hongrie (N°5775).
Italie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Ukraine.

***Donus palumbarius* (Germar, 1821)**

1 ex., Hesse, Allemagne (N°8457).
Allemagne, Pologne, Suisse, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Roumanie, Ukraine.

***Donus philanthus* (Olivier, 1807)**

4 ex., Bonifacio, Corse (N°2543).
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Donus rubi* (Krauss, 1900)**

1 ex., Carpathes, Roumanie.
Autriche, Hongrie, Roumanie, Pologne, Ukraine.

***Donus viennensis* (Herbst, 1795)**

2 ex., Autriche (N°8333).
Pologne, Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bulgarie, Ukraine.

***Metadonus anceps* (Boheman, 1842)**

1 ex., Transcapienne (N°9972).
Ukraine, Russie, Turquie.

Lixinae

Cleonini

***Ammocleonus aschabadensis* (Faust, 1884)**

1 ex., Turcoménie, Arménie (N°9625).
Iran.

***Asproparthenis carinicornis* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Russie méridionale (N°9953).
Roumanie, Russie, Turquie.

***Asproparthenis foveocollis* (Gebler, 1834)**

1 ex., Caucase, Russie (N°9954).
Ukraine, Russie.

***Asproparthenis lusca* (Chevrolat, 1869)**

(= *Bothynoderes meridionalis* Chevrolat, 1873)

1 ex., Carthagène, Espagne sous le nom de *meridionalis* (N°6201).
Espagne, France, Italie.

***Asproparthenis punctiventris* (Germar, 1824)**

4 ex., Dalmatie (N°4151).
France, Italie, Allemagne, Autriche, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Russie, Bulgarie, Turquie.

***Asproparthenis punctiventris nubeculosa* (Boheman, 1829)**

4 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2780).
Ukraine, Turquie.

***Bothynoderes affinis* (Schrank, 1781)**

(= *Curculio fasciatus* O.F. Müller, 1776)

4 ex., Lannidy, Plouigneau, Finistère (29) sous le nom de *Chromoderus fasciatus* ; 1 ex., Santec, Finistère (29) sous le nom de *Chromoderus fasciatus* ; 1 ex., Saint-Pol-de-Léon, Finistère (29) sous le nom de *Chromoderus fasciatus* (N°2469).
Toute l'Europe.



Bothynoderes affinis (© RL)

***Bothynoderes declivis* (Olivier, 1807)**

1 ex., Hongrie (N°7034).
Allemagne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Bulgarie, Russie.

***Cleonis pigra* (Scopoli, 1763)**

1 ex., Carcassonne, Aude (11) (N°1457) ; 1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *scutellatus* (N°2844).
Europe entière, Russie, Turquie.



Cleonis pigra (© RL)

***Coniocleonus (Augustecleonus) turbatus* (Fåhraeus, 1842)**

(= *Curculio glaucus* Fabricius, 1787)

2 ex., Epinal, Vosges (88) sous le nom de *glaucus* (sans numéro) ; 1 ex., Prague, Tchéquie sous le nom de *glaucus* var. *turbatus* (N°5121).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Coniocleonus (Plagiographus) cicatricosus* (Hoppe, 1795)**

1 ex., France, sous le nom d'*ericæ* ; 2 ex., Madrid, Espagne (N°8049).
Espagne, France, Italie, Allemagne, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Grèce, Chypre.

***Coniocleonus (Plagiographus) excoriatus* (Gyllenhal, 1834)**

3 ex., Bonifacio, Corse (N°2237).
Une bonne partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Coniocleonus (Plagiographus) nigrosuturatus* (Goeze, 1777)**

2 ex., Grenoble, Isère (38) sous le nom d'*obliquus* (N°5309).
Europe, Russie, Turquie.

***Cyphocleonus cenchrus* (Pallas, 1781)**

1 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2782).
Ukraine, Russie, Turquie

***Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790)**

(= *Curculio tigrinus* Panzer, 1789)

6 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *tigrinus* (N°2173).
Europe, Russie, Turquie.

***Cyphocleonus testatus* (Gyllenhal, 1834)**

(= *Curculio morbillosus* Fabricius, 1792)

1 ex., Nyons, Drôme (26) sous le nom de *morbillosus* ;
2 ex., Oran, Algérie, sous le nom de *morbillosus* (N°485).
Portugal, Espagne, France, Allemagne, Autriche, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Bulgarie, Turquie.

***Cyphocleonus trisulcatus* (Herbst, 1795)**

1 ex., Loiret (45) (N°5533).
Une bonne partie de l'Europe jusqu'en Russie.

***Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771)**

2 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2781).
Ukraine, Russie, Turquie.

***Leucophyes occidentalis* (Dieckmann, 1982)**

1 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *pedestris* ; 3 ex., Strasbourg, Bas-Rhin, (67) sous le nom de *pedestris* ; 1 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *pedestris* (N°486).
Europe, Russie, Turquie.

***Liocleonus clathratus* (Olivier, 1807)**

5 ex., Syrie (N°489).
Russie, Turquie.

***Lixoglyptus spartii* (Olivier, 1807)**

(= *Lixus schaeferi* Hoffman, 1950)

1 ex., Royan, Charente-Maritime (17) (N°2554).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Suède.

***Lixomorphus algerus* (Linnaeus, 1758)**

2 ex., Iles Lavazzi, Corse (N°2548).
Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Croatie.

***Mecaspis alternans* (Herbst, 1795)**

(= *Cleonus caesus* Gyllenhal, 1834)

4 ex., Bonifacio, Corse (N°2549) ; 1 ex., Centre de la France, sous le nom var. *coesus* (N°5310).
Une partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Mecaspis emarginata* (Fabricius, 1787)**

1 ex., Allier (03) sous le nom de *palmatus* (N°3536).
Espagne, France, Italie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Bulgarie, Suède, Russie.

***Mecaspis nana* (Gyllenhal, 1834)**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°3741).
Portugal, Espagne, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Turquie.

***Mecaspis striatella* (Fabricius, 1792)**

1 ex., Porto-Vecchio, Corse (N°3082).
Portugal, Espagne, Italie, Sicile, Allemagne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Suède, Russie.

***Pachycerus segnis* (Germer, 1824)**

(= *Curculio cordiger* Germer, 1819)

(= *Pachycerus maritimus* Hustache, 1926)

1 ex., Montpellier, Hérault (34), sous le nom de *scabrosus* (N°5534) ; 2 ex., Turquie (N°7035).
Portugal, Espagne, France (Rare), Suède, Europe centrale, Russie, Turquie.

***Pleurocleonus quadrivittatus* (Zoubkoff, 1829)**

1 ex., Dobrukscha, mer Noire, Bulgarie (N°8798).
Russie, Bulgarie, Ukraine.

***Porocleonus candidus* (Olivier, 1807)**

1 ex., Tunisie (N°9956).

Tunisie, Libye.

Espagne, France, Italie.

***Pseudocleonus (Neopseudocleonus) grammicus* (Panzer, 1789)**

1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2843).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Pseudocleonus (Pseudocleonus) carinatus* (Gyllenhal, 1834)**

2 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *fimbriatus* (N°3971)
Espagne, France, Italie, Sardaigne, Sicile.

***Pseudocleonus (Pseudocleonus) cinereus* (Schrank, 1781)**

1 ex., centre de la France (N°5308) ; 4 ex., France ;
1 ex., Prague, Tchéquie (N°483).
Europe, Russie, Turquie.

***Pseudocleonus (Pseudocleonus) senilis* (Rosenhauer, 1856)**

1 ex., Algérie (N°5537).
Baléares, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile.

***Rhabdorrhynchus mixtus* (Fabricius, 1792)**

1 ex. Caucase, Russie (N°9604).
France ?, Italie, Sardaigne, Croatie, Turquie.

***Conorhynchus (Conorhynchus) nigrivittis* (Pallas, 1781)**

1 ex., Caucase, Russie (N°9598).
Russie, Bulgarie, Turquie.

***Scaphomorphus vibex* (Pallas, 1781)**

1 ex., Russie méridionale (N°9957).
Russie, Turquie.

***Temnorhinus (Temnorhinus) brevirostris* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°3740).
France, Corse, Sardaigne, Sicile, Turquie, Chypre.

***Temnorhinus (Temnorhinus) mixtus* (Fabricius, 1792)
(= *Conorhynchus conicirostris* (Olivier, 1807))**

2 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *conicirostris* ; 1 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *conicirostris* (N°4900).
Espagne, France, Corse, Sardaigne, Sicile, Turquie, Chypre.

***Temnorhinus (Temnorhinus) strabus* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Sud de la Russie (N°5535).
Ukraine, Russie, Turquie.

Lixini

***Broconius subulatus* (Faust, 1891)**

1 ex., Caucase, Russie (N°9607).
Russie, Turquie.

***Larinus (Cryphopus) ferrugatus* Gyllenhal, 1835**

4 ex., Nyons, Drôme (26) (N°8871).

***Larinus (Cryphopus) suborbicularis* Capiomont, 1874**

1 ex., Algérie (N°9960).
Espagne.

***Larinus (Larinomesius) obtusus* Gyllenhal, 1835
(= *Larinus australis* Capiomont, 1874)**

1 ex., Algérie (N°9618).
France, Portugal, Italie, Sicile, Allemagne, Pologne, Slovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Serbie, Bosnie, Albanie, Macédoine, Grèce, Bulgarie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Larinus (Larinomesius) scolymi* (Olivier, 1807)
(= *Larinus flavescens* Germar, 1824)**

3 ex., Madrid, Espagne, sous le nom de *flavescens* ;
1 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *flavescens* (N°5234) ; 1 ex., Carcassonne, Aude (11) (1963) ;
1 ex., Constantine, Algérie (1963).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Belgique, Allemagne, Pologne, Croatie, Albanie.

***Larinus (Larinomesius) serratulae* Capiomont, 1874**

1 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2777).
Russie, Turquie.

***Larinus (Larinomesius) syriacus* Gyllenhal, 1835**

2 ex., Syrie (N°7108).
Ukraine, Bulgarie, Grèce, Turquie, Chypre.

***Larinus (Larinus) buccinator* (Olivier, 1807)**

1 ex., localité non renseignée (N°7416).
Sardaigne, Sicile, Grèce.

***Larinus (Larinus) carinirostris* Gyllenhal, 1835**

1 ex., Italie, (N°9959).
Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Hongrie, Albanie, Grèce, Crète, Turquie.

***Larinus (Larinus) cynarae* (Fabricius, 1787)**

3 ex., Grèce ; 2 ex., Madrid, Espagne (N°490) ;
1 ex., Algérie sous le nom de *glabrirostris* (N°9614) ;
4 ex., Dalmatie, Croatie sous le nom de *cardui* (N°4149).
Europe occidentale, Russie, Turquie.

***Larinus (Larinus) idoneus* Gyllenhal, 1835**

1 ex., Sarepta (Sarafand), Liban (N°2776).
Ukraine, Russie.

***Larinus (Larinus) inaequalicollis* Capiomont, 1874**

2 ex., Tachkent, Ouzbékistan (N°9613).
Russie, Moldavie, Turquie.

***Larinus (Larinus) latus* (Herbst, 1783)**

4 ex., Corse, sous le nom de *costirostris* (N°1847).

Corse, Allemagne, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Bosnie, Serbie, Albanie, Macédoine, Grèce, Bulgarie, Ukraine, Russie, Turquie, Chypre.

***Larinus (Larinus) maurus* (Olivier, 1807)**

1 ex., Oran, Algérie (N°5414).
Espagne, France, Italie, Sicile, Grèce.

***Larinus (Larinus) onopordi* (Fabricius, 1787)**

4 ex., Oran, Algérie (N°491) ; 4 ex., Dalmatie, Croatie, sous le nom de *maculatus* (N°7036).
France, Grèce, Ukraine, Russie, Turquie.

***Larinus (Larinus) pollinis* (Laicharting, 1781)**

(= *Curculio brevis* Herbst, 1795)

3 ex., Plan d'Aups-Sainte Beaume, Var (83) sous le nom de *brevis* (N°6687) ; 2 ex., Plan d'Aups-Sainte Beaume, Var (83) sous le nom de var *sanctaealbae* ; 1 ex., Bône (Annaba), Algérie, sous le nom de *brevis* (N°5312).
Une partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Larinus (Larinus) ursus* (Fabricius, 1792)**

(= *Curculio vittatus* Fabricius, 1781)

(= *Larinus pseudovittatus* Hoffmann, 1954)

2 ex., Bonifacio, Corse (N°1848) ; 1 ex., Oran, Algérie, sous le nom de *albicans* (N°5415) ; 3 ex., Corse, sous le nom de *degeni* (N°2240).
Portugal, Espagne, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce, Russie, Turquie

***Larinus (Larinus) vulpes* (Olivier, 1807)**

1 ex., Béziers, Hérault (34) (N°6686) ; 3 ex., Sète, Hérault (34) sous le nom de *maculosus* (N°2550).
France, Italie, Sicile, Croatie, Grèce, Slovaquie, Pologne, Ukraine, Russie, Suède, Turquie.

***Larinus (Phyllonomeus) carlinae* Olivier, 1807**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 2 ex., Hyères, Var (83) (N°2239) ; 1 ex., Caucase, Russie, (N°0062).
Toute l'Europe, Angleterre, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Larinus (Phyllonomeus) iaceae* (Fabricius, 1775)**

2 ex., Fiume, Croatie sous le nom de *stellaris* (N°8895) ; 4 ex., Troyes, Aube (10) ; 2 ex., Caucase, Russie (N°493).
Europe continentale, Suède, Russie, Turquie.

***Larinus (Phyllonomeus) longirostris* Gyllenhal, 1835**

2 ex., Nyons, Drôme (26) (N°8872).
Espagne, France, Italie, Sicile, Chypre.

***Larinus (Phyllonomeus) ovaliformis* Capiomont, 1874**

1 ex., Syrie, sous le nom de *sanctus* (N°9616).
Russie, Turquie, Syrie.

***Larinus (Phyllonomeus) rusticanus* Gyllenhal, 1835**

(= *Curculio planus* Fabricius, 1792)

1 ex., Europe centrale sous le nom de *virescens* (N°2939) ; 5 ex., Bonifacio, Corse (N°1846).

Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce, Bulgarie, Moldavie, Turquie.

***Larinus (Phyllonomeus) sturnus* (Schaller, 1783)**

5 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) (N°492) ; 1 ex., Bourges, Cher (18) sous le nom de *conspersus* (N°5313).
Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Larinus (Phyllonomeus) turbinatus* Gyllenhal, 1835**

3 ex., Troyes, Aube (10) (N°4448).
Europe continentale, Russie, Turquie.

***Nefis ochroleucus* (Capiomont, 1874)**

1 ex., Caucase, Russie (N°9617).
Turquie, Asie centrale.

***Lixus (Callistolixus) cylindrus* (Fabricius, 1781)**

(= *Curculio cylindricus* Fabricius, 1787)

3 ex., Digne, Alpes de Haute Provence (04) (N°1380).
Espagne, France, Italie, Sicile, Allemagne, Autriche, Pologne, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Russie, Turquie.

***Lixus (Callistolixus) furcatus* Olivier, 1807**

1 ex., Caucase, Russie (N°9606) ; 2 ex., Oran, Algérie, sous le nom de *inops* (N°494).
Italie, Sicile, Russie, Turquie.

***Lixus (Callistolixus) hypocrita* Chevrolat, 1866**

5 ex., Aranjuez, Espagne (N°8126).
Espagne.

***Lixus (Compsolixus) anguinus* (Linnaeus, 1767)**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°2241).
Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Croatie, Autriche, Turquie.

***Lixus (Compsolixus) juncii* Boheman, 1835**

1 ex., Italie (N°5314).
Espagne, Baléares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Allemagne, Pologne, Croatie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Chypre, Suède.

***Lixus (Compsolixus) ochraceus* Boheman, 1843**

1 ex., Santec, Finistère (29) sous le nom de *ascanii* ; 1 ex., Pornic, Loire-Atlantique (44) sous le nom de *ascanii* (N°497).
Europe occidentale et centrale, Turquie.

***Lixus (Dilixellus) bardanae* (Fabricius, 1787)**

2 ex., Berlin, Allemagne ; 1 ex., Magdebourg, Allemagne (N°5120).
Europe occidentale, Scandinavie, Russie.

***Lixus (Dilixellus) linearis* Olivier, 1807**

(= *Lixus cribricollis* Boheman, 1835)

4 ex., Strasbourg, Bas-Rhin (67) sous le nom de *cribricollis* ; 1 ex., Saint-Germain-en-Laye, Yvelines (78), sous le nom de *cribricollis* (N°2172).

Portugal, Espagne, France, Corse, Allemagne, Tchèque, Italie, Sicile, Slovénie, Croatie, Hongrie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Grèce, Turquie.

Lixus (Dilixellus) pulverulentus (Scopoli, 1763)

(= *Curculio angustatus* Fabricius, 1775)

(= *Lixus algirus* Fabricius, 1801)

(= *Lixus suetus* Boheman, 1842)

4 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*algirus* ;
1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) 1888 sous le nom d'*angustatus* ; 1 ex., Bretagne, 1891 sous le nom d'*angustatus* ; 1 ex., Iles Lavazzi, Corse, sous le nom d'*angustatus* (N°498).
Europe, Russie, Turquie.

Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman, 1835

7 ex., Ploujean, Finistère (29) (N°8496).

Europe occidentale, Russie, Suède, Turquie.

Lixus (Dilixellus) rubicundus Zoubkoff, 1833

5 ex., Bohême, Tchèque sous le nom de *flavescens* (N°5001).

France (Sud), Italie, Allemagne, Autriche, Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Ukraine, Russie, Turquie.

Lixus (Epimeces) cardui Olivier, 1807

5 ex., Bonifacio, Corse sous le nom de *pollinosus* (N°1850).

Europe, Suède, Russie, Turquie

Lixus (Epimeces) filiformis (Fabricius, 1781)

(= *Curculio elongatus* Goeze, 1777)

1 ex., France orientale, sous le nom d'*elongatus* ;
2 ex., Rennes, Ille et Vilaine (35) sous le nom d'*elongatus* ; 4 ex., Madère, Portugal, sous le nom de *filiformis* (N°499) ; 1 ex., Grèce, sous le nom d'*elongatus* (N°9611) ; 2 ex., Montpellier, Hérault (34), sous le nom d'*elongatus* (N°2449).

Europe occidentale, Angleterre, Suède, Russie, Turquie.

Lixus (Epimeces) scolopax Boheman, 1835

5 ex., Ajaccio, Corse (N°2243) ; 1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne (47), sous le nom de *lutescens* (N°7881).

Portugal, Espagne, France, Corse, Suisse, Italie, Sardaigne, Croatie, Slovaquie, Bulgarie, Grèce, Ukraine, Russie, Turquie.

Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Kerveguen, Sainte-Sève, Finistère (29) ; 1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29) 1884 ; 1 ex., Le Penquer, Plouigneau, Finistère (29) 1884 ; 1 ex., Auch, Gers (32) (N°495).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807

1 ex., Berlin, Allemagne (N°5119).

Toute l'Europe, Russie, Turquie.

Lixus (Eulixus) umbellatarum (Fabricius, 1787)

2 ex., Bonifacio, Corse (N°5053) ; 5 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom de *submaculatus* (N°2242) ; 2 ex., Bonifacio, Corse, sous le nom de *brevicaudis* (N°1849).

Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile.

Lixus (Lixus) paraplecticus (Linnaeus, 1758)

5 ex., Troyes, Aube (03) ; 1 ex., La Haye-Fouassière, Loire-Atlantique (44) ; 1 ex., Prague, Tchèque (N°4449).

Une partie de l'Europe, Russie, Turquie.



Lixus paraplecticus (© RL)

Lixus (Ortholixus) acicularis Germar, 1824

1 ex., Italie, sous le nom d'*acutus* (N°5316) ; 4 ex., Vals les Bains, Ardèche (07) (N°9440).

Portugal, Espagne, Baléares, France, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Bulgarie, Russie.

Lixus (Ortholixus) angustus (Herbst, 1795)

(= *Curculio sanguineus* Rossi, 1792)

3 ex., Berlin, Allemagne sous le nom de *sanguineus* ; 1 ex., Hongrie, sous le nom de *sanguineus* (N°5118).

Europe, Russie, Turquie.

Lixus (Ortholixus) cinerascens Schoenherr, 1832

(= *Lixus elegantulus* Boheman, 1842)

1 ex., Dalmatie sous le nom d'*elegantulus* (N°8050).
France, Italie, Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Ukraine, Russie, Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Turquie.

Lixus (Ortholixus) mucronatus (Olivier, 1790)

2 ex., Bonifacio, Corse (N°3742).

Portugal, Espagne, Baléares, France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie, Grèce.

Lixus (Ortholixus) trivittatus Capiomont, 1874

6 ex., Carcassonne, Aude (11) (N°6689).

France méditerranéenne (assez rare).

Lixus (Ortholixus) vilis (Rossi, 1790)

1 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Ploujean, Finistère (29) sous le nom de *bicolor* (N°4814).

Europe occidentale et centrale, Russie, Turquie.



Lixus vilis (© RL)

***Lixus (Phillixus) brevirostris* Boheman, 1835**

2 ex., Oran, Algérie (N°8978).
Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie
Sicile.

***Microlarinus lareynii* (Jacquelin du Val, 1852)**

2 ex., Menton, Alpes-Maritimes (06) (N°6615).
Espagne, France, Italie, Sicile, Grèce, Chypre.

***Microlarinus rhinocylloides* Hochhuth, 1847**

1 ex., Bône, Algérie (N°5311).
Grèce, Turquie.

***Rhinocyllus conicus* (Froelich, 1792)**

4 ex., Auch, Gers (32) sous le nom d'*antiodontalgicus*
(N°6688) ; 3 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom
de *latirostris* (N°496). ; 2 ex., Dalmatie, Croatie
(N°7037).
Europe, Angleterre, Suède, Russie, Turquie.

***Rhinocyllus oblongus* Capiomont, 1873**

3 ex., Grèce (?) (N°7521).
Italie.

Mesoptiliinae

Magdalidini

***Magdalis (Edo) nitidipennis* (Boheman, 1843)**

1 ex., Moravie, Tchéquie (N°9659).
Europe, Russie, Turquie

***Magdalis (Edo) ruficornis* (Linnaeus, 1758)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 5 ex., Lille, Nord (59) ;
1 ex., Strasbourg, Bas-Rhin, (67) (N°2857).
Europe entière, Russie, Turquie.

***Magdalis (Edo) exarata* (H. Brisout de Barneville, 1862)**

1 ex., Autriche ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye,
Yvelines (78) (N°7489).
Une partie de l'Europe, Russie, Turquie.

***Magdalis (Magdalis) duplicata* Germar, 1819**

6 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) ; 2 ex.,
Lille, Nord (59) (N°4565).
Europe entière, Scandinavie, Russie.

***Magdalis (Magdalis) frontalis* (Gyllenhal, 1827)**

4 ex., Autriche (N°3569).
Toute l'Europe, Russie.

***Magdalis (Magdalis) leucopleura* Fairmaire, L., 1883**

1 ex., Algérie (N°9985).
Afrique du Nord

***Magdalis (Magdalis) memnonia* (Gyllenhal, 1837)**

5 ex., Dax, Landes (40) (N°2557).
Europe occidentale, Russie.

***Magdalis (Magdalis) phlegmatica* (Herbst, 1797)**

1 ex., Innsbrück, Autriche (N°2852).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Magdalis (Magdalis) rufa* Germar, 1824**

2 ex., Gannat, Allier (03) ; 1 ex., Bonifacio, Corse
(N°2461).
Europe occidentale et centrale, Turquie.

***Magdalis (Odontomagdalis) armigera* (Geoffroy, 1785)**

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*aterrima* ;
2 ex., Tribidon, Plouézoch, Finistère (29) 1885 et
1888 (N°543).
Europe, Scandinavie, Russie.

***Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria* (Linnaeus, 1758)**

2 ex., localité non renseignée (N°3167).
Europe occidentale, Scandinavie, Russie, Turquie.

***Magdalis (Panopsis) flavicornis* (Gyllenhal, 1836)**

1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29), 1890 ;
1 ex., Coadesq, Ploujean, Finistère (29), 1888 ;
1 ex., Chuchuniou, Ploujean, Finistère (29), 1888
(N°2052).
Europe, Suède, Russie, Turquie.

***Magdalis (Panus) barbicornis* (Latreille, 1804)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29), mâle et femelle ; 2 ex.,
Prague, Tchéquie (N°4827).
Europe, Scandinavie, Turquie.

***Magdalis (Porrothus) cerasi* (Linnaeus, 1758)
(= *Magdalis stricta* Desbrochers, 1905)**

4 ex., Morlaix ; Finistère (29), mâle et femelle ; 1 ex.,
Ploujean, Finistère (29), 1890 ; 1 ex., Penalliorzou,
Ploujean, Finistère (29), 1888 ; 1 ex., Tribidon,
Plouézoch, Finistère (29), 1888 (N°542).
Europe, Scandinavie, Russie, Turquie.

Molytinae

Cycloterini

***Hyperomorphus asperatus* Perris, 1869**

2 ex., Bonifacio, Corse (N°1851).
Corse.

Hylobiini

***Hylobius (Callirus) abietis* (Linnaeus, 1758)**

3 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) (N°500).
Toute l'Europe.

***Hylobius (Callirus) albosparsus* Boheman, 1845**

1 ex., Lac Balkaï, Russie (N°9947).
Russie

***Hylobius (Callirus) transversovittatus* (Goeze, 1777)**

2 ex., Morlaix, finistère (29) sous le nom de *fatuus* ;
1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29) 1885 ;
1 ex., Cannes, Alpes-Maritimes (06) (N°6255).
Europe, Scandinavie.

***Hylobius (Callirus) verrucipennis* Boheman, 1834**

1 ex., Caucase, Russie (N°9624).
Russie.

***Hylobius (Hylobius) excavatus* (Laicharting, 1781)**

(= *Curculio piceus* De Geer, 1775)

2 ex., Chamonix, Haute Savoie (74) sous le nom de
piceus (N°6254).
France, Suisse, Autriche, Allemagne, Danemark,
Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie,
Roumanie, Ukraine, Norvège, Suède, Finlande,
Russie.

Lepyriini

***Lepyrus capucinus* (Schaller, 1783)**

6 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°2712).
Angleterre, France, Suède, Italie, Sicile, Pays-Bas,
Allemagne, Danemark, Suisse, Autriche, Hongrie,
Croatie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie Ukraine,
Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Estonie.

***Lepyrus palustris palustris* (Scopoli, 1763)**

3 ex., Vals les Bains, Ardèche (07) ; 1 ex., Angers,
Maine-et-Loire (49) (N°537).
France, Corse, Italie, Sardaigne, Sicile, Pays-Bas,
Allemagne, Danemark, Suisse, Autriche, Hongrie,
Croatie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie Ukraine,
Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Estonie.

***Lepyrus quadrinotatus* Boheman, 1842**

2 ex., Russie du Nord, sous le nom d'*arcticus*
(N°6828).
Tchéquie, Norvège, Suède, Finlande, Russie.

Molytini

***Leiosoma concinnum* Boheman, 1842**

1 ex., Autriche (N°9630).
Italie, Suisse, Autriche. Hongrie.

***Leiosoma cribrum* (Gyllenhal, 1834)**

1 ex., Carpates, Ukraine (N°6827).
France, Europe centrale.

***Leiosoma deflexum* (Panzer, 1795)**

8 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom d'*ovatulum*
(N°1112) ; 4 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-
Pyrénées (65) sous le nom de *discontignyi* (N°6530).
Europe occidentale, Scandinavie.

***Leiosoma kirschi* Gredler, 1866**

1 ex., Carniole, Slovénie (N°9628).
Allemagne, Autriche, Italie.

***Leiosoma muscorum* Ch. Brisout, 1863**

3 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65)
(N°6532).
Espagne, France.

***Leiosoma oblongulum* Boheman, 1842**

2 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) sous-
espèce lethierry (N°3960) ; 1 ex., Carniole, Slovénie
; 1 ex., forêt de Mourmal, Locquignol, Nord (59)
(N°8813).
Europe occidentale jusqu'en Ukraine.

***Leiosoma pyrenaicum* Ch. Brisout, 1867**

2 ex., Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (65)
(N°6531).
France.

***Leiosoma scrobifer* Rottenberg, 1871**

2 ex., Carniole, Slovénie (N°8812).
Italie, Sicile, Suisse, Autriche, Hongrie.

***Anisorhynchus barbarus* (Boheman, 1834)**

1 ex., Andalousie, Espagne (N°3027).
Espagne, Italie, Sicile.

***Anisorhynchus costatus* Boheman, 1842**

1 ex., Bonifacio, Corse (N°3739).
Corse, Sardaigne.

***Anisorhynchus monachus* (Germar, 1817)**

1 ex., Dalmatie, Croatie (N°7417).
Italie, Sardaigne, Sicile, Croatie.

***Anisorhynchus scabrosus* (Geoffroy, 1785)**

(= *Curculio barbatus* Rossi, 1794)

4 ex., Mont Louis, Pyrénées-Orientales (66) sous le
nom de *barbatus* (N°2197) ; 1 ex., Plan d'Aups,
Sainte Beaufort, Var (83) sous le nom de *gallicus*
(N°6492).
Espagne, France, Italie, Grèce.

***Liparus coronatus* (Goeze, 1777)**

1 ex., France, localité inconnue (N°479).
Presque toute l'Europe, Russie.

***Liparus dirus* (Herbst, 1795)**

1 ex., Saint-Martin Lantosque (St Martin Vésubie),
Alpes-Maritimes (06).
Espagne, France, Italie, Allemagne, Autriche,
Hongrie, Slovénie, Croatie, Pologne, Tchéquie,
Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie.

***Liparus germanus* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Stasbourg, Bas-Rhin (67) (N°2174) ; 2 ex., Alpenzell, Suisse (N°2847).
Angleterre, France, Italie, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Roumanie.

***Liparus glabrirostris* Küster, 1849**

4 ex., Carpates, Ukraine (N°6826) ; 1 ex., Carpates, Ukraine (N°8799).
Espagne, France, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Bosnie, Ukraine.

***Liparus (Trysibius) olivieri* Boheman, 1842**

2 ex., Grèce (N°8051).
Aucune information.

***Adexius scrobipennis* Gyllenhal, 1834**

5 ex., Hongrie (N°7107).
Espagne, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Ukraine.

***Minyops carinatus* (Linnaeus, 1767)**

3 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) sous le nom de *variolosus* (N°478) ; 1 ex., Cannes, Alpes-Maritimes (06) (N°6527).
France, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Hongrie, Croatie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Grèce.

***Mitoplinthus caliginosus caliginosus* (Fabricius, 1775)**

2 ex., Morlaix, Finistère (29) ; 1 ex., Penalliorzou, Ploujean, Finistère (29), 1886 ; 1 ex., Pennélé, Saint-Martin-des-Champs, Finistère (29) ; 1 ex., Rouen, Seine-Maritime (76) (N°886).
Espagne, France, Angleterre, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Italie.

***Plinthus (Plinthus) findelii* Boheman, 1842**

1 ex., Epinal, Vosges (88) ; 1 ex., Carinthie, Autriche (N°5773).
Espagne, France, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Albanie.

***Plinthus (Plinthus) megerlei* (Panzer, 1804)**

3 ex., Carinthie, Autriche ; 1 ex., Carniole, Slovénie (N°3567).
Suisse, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Ukraine.



Mitoplinthus caliginosus (© RL)

***Plinthus (Plinthus) tischeri* Germar, 1824**

2 ex., Carinthie, Autriche (N°5774).
Pologne, Tchéquie, Slovénie, Hongrie, Roumanie, Ukraine.

Pissodini***Pissodes castaneus* (De Geer, 1775)**

(= *Curculio notatus* Fabricius, 1787)

5 ex., Morlaix, Finistère (29) sous le nom de *notatus* ; 1 ex., Col de la Perche, La Perche, Pyrénées-Orientales (66) sous le nom de *notatus* (N°1263).
Toute l'Europe.



Pissodes castaneus (© RL)

***Pissodes harcyniae* (Herbst, 1795)**

1 ex., Hanovre, Allemagne (N°960).
France, Allemagne, Danemark, Suisse, Autriche, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Lettonie, Estonie, Norvège, Suède, Finlande.

***Pissodes piceae* (Illiger, 1807)**

3 ex., Vals-les-Bains, Ardèche (07) ; 1 ex., Gannat, Allier (03) (N°501).
Espagne, France, Suisse, Autriche, Italie, Allemagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bulgarie, Ukraine, Lettonie.

***Pissodes pini pini* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Autriche ; 2 ex., Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales (66) (N°4152).
Pratiquement toute l'Europe, Islande, Scandinavie, Russie.

***Pissodes scabricollis* Miller, 1859**

1 ex., Bohême, Tchéquie (N°9974).
Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Croatie, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Ukraine.

***Pissodes validirostris* (C.R. Sahlberg, 1834)**

(= *Pissodes validirostris* Gyllenhal, 1835)

2 ex., Dalmatie, Croatie (N°7418).
Portugal, Angleterre, Suisse, Autriche, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bulgarie, Russie, Norvège, Suède, Finlande.

Trachodini

***Trachodes hispidus* (Linnaeus, 1758)**

3 ex., Styrie, Autriche ; 1 ex., Pologne (N°4145).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie.

***Trachodes hystrix* Gyllenhal, 1836**

1 ex., Caucase, Russie (N°9631).
Russie.

***Trachodes oblongus* [Reitter, E., 1888]**

1 ex., Caucase, Russie (N°9970).
Caucase.

***Trachodes ovatus* Weise, 1879**

1 ex., lieu inconnu (N°9969).
Caucase- Transcaucase (vraisemblablement le lieu
d'origine de l'exemplaire marqué lieu inconnu)

Typoderini

***Anchonidium unguiculare* (Aubé, 1850)**

8 ex., Morlaix ; Finistère (29) (N°1113).
Espagne, France.

***Aparopion chevrolati* (Jacquelin du Val, 1854)**

1 ex., Lyon, Rhône (69) (N°8536).
France, Corse, Italie.

***Aparopion costatum* (Fåhraeus, 1843)**

4 ex., Hongrie méridionale (N°7033).
Allemagne, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie,
Ukraine.

***Styphloderes exsculptus* (Boheman, 1843)**

5 ex., Mont-Louis, Pyrénées-Orientales (66) ; 1 ex.,
Menton, Alpes-Maritimes (06) ; 1 ex., Cannes, Alpes-
Maritimes (06) (N°4786).
France, Corse, Croatie.



Boite de la collection Ernest Hervé (P. Devogel)

Orobitidinae

Orobitini

***Orobitis cyanea* (Linnaeus, 1758)**

4 ex., Morlaix, Finistère (29) (N°1469).
Europe moyenne et centrale, Scandinavie, Russie

Index

Familles

APIONIDAE, 4
 ATTELABIDAE, 3
 BRACHYGERIDAE, 10
 CURCULIONIDAE, 12
 DRYOPHTHORIDAE, 10
 ERIRHINIDAE, 11
 NANOPHYIDAE, 9
 RAYMONDIONYMIDAE, 12
 RHYNCHITIDAE, 2

Sous-familles

Bagoinae, 23
 Baridinae, 12
 Ceutorhynchinae, 24
 Conoderinae, 31
 Corimaliinae, 9
 Cossoninae, 31
 Cryptorhynchinae, 33
 Curculioninae, 13
 Cyclominae, 34
 Dryophthorinae, 10
 Entiminae, 35
 Erihinae, 11
 Hyperinae, 57
 Lixinae, 59
 Mesoptiliinae, 64
 Molytinae, 64
 Nanophyinae, 9

Genres

Acalles, 33
 Acallocrates, 33
 Acalyptus, 13
 Acentrotypus, 5
 Acentrus, 13
 Adexius, 65
 Aizobius, 4
 Aletinus, 2
 Allomalina, 9
 Alocentron, 5
 Amalorrhynchus, 24
 Amalus, 24
 Amaurorhinus, 32
 Ammocleonus, 59
 Anchonidium, 67
 Andrion, 50
 Anisorhynchus, 65
 Anoplus, 13
 Anthonomus, 13, 14
 Aparopion, 67
 Apion, 4, 9
 Apoderus, 3
 Apsis, 45
 Archarius, 15
 Aspidapion, 5
 Asproparthenis, 59
 Attactagenus, 36
 Attelabus, 4

Orobitidinae, 67
 Raymondionyminae, 12
 Rhynchitinae, 2
 Rhynchophorinae, 10

Tribus

Acalyptini, 13
 Acentrusini, 13
 Alophini, 35
 Amalini, 24
 Anoplini, 13
 Anthonomini, 13
 Apionini, 4
 Aplemonini, 4
 Apoderini, 3
 Apostasimerini, 12
 Arthrostenini, 11
 Aspidapiini, 5
 Attelabini, 4
 Auletini, 2
 Baridini, 12
 Brachycerini, 10
 Brachyderini, 35
 Byctiscini, 2
 Camptorhinini, 33
 Ceratapiini, 5
 Ceutorhynchini, 24
 Choerorhinini, 31
 Cionini, 14
 Cleonini, 59
 Cnemogonini, 29

Cneorhinini, 36
 Coryssomerini, 31
 Cossonini, 31
 Cryptorhynchini, 33
 Curculionini, 15
 Cycloterini, 64
 Cyphicerini, 36
 Dichotrachelini, 34
 Dryotribini, 32
 Ellescini, 15
 Erihiniini, 11
 Exapiini, 5
 Gasterocercini, 34
 Geonemini, 36
 Hipporhinini, 34
 Hylobiini, 64
 Hyperini, 57
 Hypurini, 29
 Ixapiini, 6
 Kalcapiiini, 6
 Lepyrini, 65
 Litosomini, 10
 Lixini, 61
 Madarini, 13
 Magdalidini, 64
 Malvapiini, 6
 Meciniini, 17
 Metapiini, 6
 Molytini, 65
 Mononychini, 30
 Myorhinini, 45
 Omiini, 37

Onycholipini, 32
 Orobitini, 67
 Otiorrhynchini, 38
 Oxystomatini, 6
 Pentarthrini, 32
 Peritelini, 45
 Phyllobiini, 46
 Phytobiini, 30
 Piezotrachelini, 8
 Pissodini, 66
 Polydrusini, 51
 Psallidiini, 48
 Rhamphini, 18
 Rhynchitini, 2
 Rhyncholini, 32
 Sciaphilini, 48
 Scleropterini, 31
 Sitonini, 50
 Smicronychini, 19
 Sphenophorini, 11
 Storeini, 20
 Styphlini, 20
 Tanymecini, 54
 Tanysphyrini, 11
 Trachelophorini, 3
 Trachodini, 66
 Trachyploeini, 55
 Tropiphorini, 56
 Tychiini, 20
 Typoderini, 67

Aubeonymus, 20
 Aulacobaris, 12
 Auletes, 2
 Auletobius, 2
 Auleutes, 29
 Bagous, 23, 24
 Baris, 12
 Baromiamima, 37
 Barynotus, 36, 37
 Barypeithes, 48, 49
 Betulapion, 6
 Boragosirocalus, 24
 Bothynoderes, 59
 Brachonyx, 14
 Brachycerus, 10
 Brachyderes, 35
 Brachypera, 58
 Brachysomus, 48
 Brachytemnus, 32
 Bradybatus, 14
 Broconius, 61
 Bryodaemon, 37
 Byctiscus, 2
 Caenopsis, 55
 Caenorhinus, 2
 Calosirus, 24
 Camptorhinus, 33
 Catapion, 7
 Cathormiocerus, 55, 56
 Caulostrophus, 35
 Centricnemus, 45
 Ceratapion, 5
 Ceuthorhynchus, 27
 Ceuthorrhynchus, 27, 28
 Ceutorhynchus, 24, 25, 26
 Charagmus, 50
 Chiloneus, 48
 Chloebius, 36
 Chlorophanus, 54
 Choerorhinus, 31
 Chonostropheus, 2
 Cionellus, 14
 Cionus, 14
 Cirrorhynchus, 38
 Cleonis, 59
 Cleonus, 60
 Cleopomiarus, 17
 Cleopus, 14
 Coeliastes, 26
 Coeliodes, 26
 Coeliodinus, 26
 Coelositona, 50
 Compsapoderus, 3
 Coniatus, 58
 Coniocleonus, 59, 60
 Conorhynchus, 61

Corimalia, 9
 Coryssomerus, 31
 Cosmobaris, 12
 Cossonus, 31
 Cotaster, 32
 Cryptorhynchus, 33
 Cucubaris, 13
 Curculio, 3, 4, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 Cyanapion, 7
 Cycloderes, 54
 Cyphocleonus, 60
 Datonychus, 26, 27
 Deporaus, 2
 Derelomus, 13
 Dichotrachelus, 34
 Dichromacalles, 34
 Dieckmanniellus, 9
 Diplapion, 5
 Dodecastichus, 38
 Donus, 58, 59
 Dorytomus, 15, 16
 Drupenatus, 27
 Dryophthorus, 10
 Echinodera, 33

Echinomorphus, 32	Limobius, 58	Paracyncotrachelus, 3	Rhynchaenus, 18, 19, 20, 27, 30
Edmundia, 48	Liocleonus, 60	Parascythopus, 46	Rhynchites, 3
Ellescus, 16	Liophloeus, 51, 52	Parethelcus, 28	Rhyncholus, 32
Entomoderus, 34, 35	Liparus, 65	Pelenomus, 30	Rhyncolus, 32
Eomesauletes, 2	Lixoglyptus, 60	Pentarthrum, 32	Rhytideres, 35
Eremobaris, 12	Lixomorphus, 60	Perapion, 4	Romualdius, 56
Ethelcus, 27	Lixus, 60, 62, 63	Pericartiellus, 10	Rutera, 33
Eubrychius, 30	Magdalis, 64	Peritelus, 46	Rutidosoma, 31
Eucoeliodes, 27	Malvapion, 6	Philopedon, 36	Scaphomorphus, 61
Eusomatus, 48	Marmaropus, 30	Phloeophagus, 32	Sciaphilus, 49
Eusomus, 48, 49	Maurobaris, 12	Pholicodes, 35	Sciaphobus, 50
Eutrichapion, 7	Mecaspis, 60	Phrydiuchus, 29	Scleropterus, 31
Exapion, 5, 6	Mecinus, 17	Phyllobius, 46, 47, 48	Sibiria, 20, 21
Exomias, 49	Mecorhis, 3	Phytobius, 30	Simmeiropsis, 46
Ferreria, 12	Meira, 45, 46	Phytonomus, 58	Simo, 46
Foucartia, 49	Meirella, 45, 46	Piazomias, 10	Sirocalodes, 29
Gasterocercus, 34	Melanapion, 6	Pirapion, 8	Sitona, 50, 51
Geonemus, 37	Melanobaris, 13	Pissodes, 66	Sitophilus, 10
Geranorhinus, 20	Melicius, 32	Pleurocleonus, 60	Smicronyx, 19
Glodianus, 27	Mesites, 31	Pleurodirus, 49	Sphenophorus, 11
Graptus, 35	Mesoletobius, 2	Plinthus, 66	Squamapion, 6
Gronops, 34	Metadonus, 59	Polydius, 36	Stenocarus, 29
Grypus, 11	Metapion, 6	Polydrusus, 52, 53, 54	Stenoptera, 8
Gymnetron, 17, 18	Miarus, 17	Poophagus, 29	Stenoscelis, 32
Gymnomorphus, 45	Micrelus, 27	Porocleonus, 60	Stereocorynes, 32
Hadroplontus, 27	Microlarinus, 63	Prisistus, 29	Stereonychus, 14, 15
Helianthemapion, 4	Microplontus, 27	Procas, 11	Stomodes, 45
Hemitrichapion, 7	Minyops, 66	Protapion, 8, 9	Strophomorphus, 35
Herpes, 57	Mitoplinthus, 66	Protopirapion, 8	Strophosoma, 35, 36
Heteromeira, 45	Mogulones, 28	Psallidium, 48	Strophosomus, 36
Hexarthrum, 32	Mononychus, 30	Pselactus, 32	Styphloderes, 67
Holotrichapion, 7	Nanodiscus, 9	Pseudapion, 6	Styphlus, 20
Homapterus, 51	Nanomimus, 9	Pseudaplemonus, 4, 5	Synapion, 8
Humeromima, 37	Nanophyes, 9, 10	Pseudocleonus, 60	Tachyerges, 19
Hylobius, 64	Nedyus, 28	Pseudocneorrhinus, 36	Taeniapion, 6
Hypera, 57	Nefis, 62	Pseudomeira, 46	Tanymecus, 55
Hyperomorphus, 64	Neocoenorrhinus, 3	Pseudomyloccerus, 48	Tanyphyrus, 11
Hypophyes, 9	Neoglocianus, 28	Pseudoperapion, 5	Taphrotopium, 5
Hypurus, 29	Neophytobius, 30	Pseudoperitelus, 46	Tapinotus, 31
Involvulus, 2	Notaris, 11	Pseudophloeophagus, 32	Tatianaerhynchites, 3
Ischnoptera, 8	Oedecnemidius, 46	Pseudophytobius, 29	Temnocerus, 3
Isochnus, 18	Omius, 37	Pseudoprotapion, 9	Temnorhinus, 61
Jekelia, 11	Omphalapion, 5	Pseudorchestes, 19	Thamioecolus, 29
Kalcapion, 6	Onychapion, 4	Pseudostenapion, 5	Thryogenes, 11
Kykliocalles, 33, 34	Oprohinus, 28	Pseudostyphlus, 20	Tournotaris, 11
Labiaticola, 12	Orchestes, 18, 19	Ptochus, 36	Trachodes, 66, 67
Larinus, 61, 62	Orobitis, 67	Rhabdorrhynchus, 60	Trachyphloeus, 55, 56
Lasiorrhynchites, 2, 3	Orthochaetes, 20	Rhamphus, 19	Trichocaulus, 11
Leiosoma, 65	Oryxolaemus, 8	Rhinocyllus, 63, 64	Trichoptera, 6
Lepidapion, 6	Otiorhynchus, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	Rhinomias, 37	Trichosirocalus, 29
Lepretius, 45	Oxystoma, 8	Rhinoncus, 30, 31	Tropiphorus, 56
Leptomeira, 45	Pachycerus, 60	Rhinoscythropus, 48	Tychius, 20, 21, 22
Lepyrus, 65	Pachyrhinus, 52	Rhinusa, 17, 18	Urometopus, 38
Leucomigus, 60	Pachytychius, 20	Rhodocytus, 3	Zacladus, 29
Leucophyes, 60	Palaeocalles, 34	Rhopalapion, 6	
Lignyodes, 20	Paophilus, 49		
Limnobaris, 12			

Sous-genres

Acanephodus, 5	Anthomorphus, 13	Aramorius, 54	Auletobius, 2
Aleutinops, 38	Antidonus, 58	Aranihus, 38	Axenomimetus, 32
Alocentron, 5	Apeltarius, 21	Argoptochus, 48	Bagoides, 58
Alsus, 46	Apiops, 7	Aspidapion, 5	Barynotus, 36, 37
Alyctus, 18	Arammichnus, 38	Augustecleonus, 59	Bothyorrhynchapion, 7

- Brachyderes, 35
 Brachylophus, 35
 Brachypera, 58
 Bytosmesus, 38
 Caenocossonus, 31
 Callirus, 64
 Callistolixus, 62
 Cathormiocerus, 55
 Geratapion, 5
 Chaerodrys, 52
 Chalybodontus, 19
 Chlorapion, 8
 Chlorodrosus, 52
 Choilisanus, 38, 39
 Cnemapion, 7
 Cobosotherium, 8
 Coccygorrhynchites, 2
 Compsolixus, 62
 Coniatus, 58
 Conocetus, 52
 Conorhynchus, 61
 Cossonus, 31
 Cryphiphorus, 39
 Cryphopus, 61
 Cyanapion, 7
 Cycloderes, 54
 Dapalinus, 57
 Dichotychius, 20
 Dieletus, 46
 Dilixellus, 62
 Dimesomyops, 7
 Dorymerus, 39
 Duphanastus, 39
 Echinostroma, 5
 Ectomogaster, 46
 Edelengus, 39
 Edo, 64
 Elechranus, 39
 Epimeces, 62, 63
 Epirhynchites, 3
 Episomecus, 55
 Ergiferanus, 39
 Eririnomorphus, 57
 Eroosapion, 4
 Eudipnus, 52
 Eulixus, 63
 Eurodrusus, 52, 53
 Eustolus, 53
 Eutrichapion, 7
 Glaberacalles, 33
 Hidryocneme, 6
 Holotrichapion, 7
 Hylobius, 64
 Hypera, 57
 Involvulus, 2
 Ischnopterapion, 8
 Jelenantus, 39
 Kippenbergia, 57
 Koestlinia, 5
 Kyklioacalles, 33, 34
 Larinomesius, 61
 Larinus, 61, 62
 Lasiorhynchites, 2
 Legaricapion, 7
 Lepidapion, 6
 Leucodrusus, 53
 Liophloeodes, 51
 Liophloeus, 52
 Lixus, 63
 Lolatismus, 39
 Magdalis, 64
 Magnanotius, 39
 Majetnecus, 39
 Margaritius, 37
 Mecorhis, 3
 Melasemnus, 39, 40
 Mesaniomus, 40
 Metallites, 53
 Metaphyllobius, 47
 Metopiorrhynchus, 40
 Mierginus, 40
 Misenatus, 40
 Nanoschetus, 47
 Nehrodistus, 40
 Nelasiorhynchites, 2
 Neliocarus, 35, 36
 Nemoicus, 47
 Neocoenorhynchus, 3
 Neocoenorrhinus, 3
 Neopseudocleonus, 60
 Nihus, 40
 Nubidanus, 40
 Odontomagdalis, 64
 Orchestes, 18, 19
 Ortholixus, 63
 Otiolehus, 40
 Otiomimus, 41
 Otiorrhynchus, 41, 42
 Padilehus, 42
 Panopsis, 64
 Panus, 64
 Paracryphiphorus, 42
 Parnemoicus, 47
 Pendragon, 42
 Perapion, 4
 Phalantorrhynchus, 42, 43
 Phillixus, 63
 Phrissotrichum, 4
 Phyllobius, 47
 Phyllonomeus, 62
 Piezocnemus, 53
 Plagiographus, 59, 60
 Plagiatus, 47
 Pleurodirus, 49
 Pliadonus, 43
 Plinthus, 66
 Podoropelmus, 43
 Poecilodrusus, 53
 Polydrusus, 53, 54
 Porrothus, 64
 Postaremus, 43
 Prilisvanus, 43, 44
 Proremus, 44
 Provadilus, 44
 Pseudocleonus, 60
 Pseudomecorhis, 3
 Pseudometallites, 49
 Pseudomyllocerus, 48
 Pseudorhinus, 34, 35
 Psilocalymna, 7
 Pterygorrhynchus, 48
 Rhynchites, 3
 Rhyncolus, 32
 Rosvolestus, 44
 Satnalistus, 44
 Schaumius, 56
 Schiskyapion, 4
 Schoenitemnus, 3
 Sibiria, 21
 Smicronyx, 19
 Stenopterapion, 8
 Stenorhynchites, 3
 Strophosoma, 36
 Stupamacus, 44
 Subphyllobius, 48
 Tanymecus, 55
 Temnorhinus, 61
 Teretriorhynchites, 2
 Thalycrynchus, 44
 Tinocyba, 7
 Tithonus, 45
 Tournieria, 44
 Trachyphloeus, 56
 Trigrinellus, 57
 Troglorhynchus, 44
 Trysibius, 65
 Tychius, 21, 22
 Ulozenus, 44
 Urorrhynchus, 44, 45
 Viroprius, 45
 Zadrehus, 45
 Zavodesus, 45
 Zustalestus, 45

Espèces

- A**
- abbreviatulus, 28
abbreviatus, 11
abietis, 64
acaloides, 29
aciculare, 4
acicularis, 63
acridulus, 11
acuminirostris, 21
adspersa, 57
adusticornis, 46
aeneicollis, 24
aeneopiceus, 32
aeneovirens, 3
aeneum, 5
aequatus, 3
aeratus, 53
aethiops, 3, 7, 11
affaber, 39
affine, 4
affinis, 16, 21, 29, 59
alauda, 14
albicinctus, 30
albilateratus, 21
albolineata, 45
albopictus, 34
albosignatus, 28
albosparsus, 64
albovittatus, 28
alcyoneum, 7
algericus, 24
algirus, 10, 60, 62
alismaticus, 23
alliariae, 24
alni, 18
alpicola, 44
alternans, 36, 56, 60
alutaceus, 42
amoenus, 52
amplicollis, 21
amplipennis, 41
amygdali, 13
analis, 12
anatolicus, 44
anceps, 59
anchoralifer, 53
anguinus, 62
angulosus, 26
angustatus, 62
angustulus, 25
angustus, 63
anophthalmoides, 44
anthracinus, 40
antirrhini, 17
apfelbecki, 39
apicalis, 24
apollinis, 46
apricans, 8
aptus, 33
aquitanus, 31
araneiformis, 49
arator, 24, 58
arborator, 47
arcticus, 42
arenariae, 21
arenosus, 45
argentatus, 21, 46
argenteus, 38
argillaceus, 23
aristatus, 55
armadillo, 41
armeniacus, 48
armigera, 64
armillatus, 11
armipes, 52
arquatus, 26
artemisiae, 4, 12
arundinis, 57
aschabadensis, 59
asellus, 18
asiaticus, 45
asper, 34
asperatus, 20, 49, 64
asperifoliarum, 28
asplenii, 43
assimile, 8
assimilis, 24
astragali, 9, 21
ater, 32
aterrimus, 44
atomarium, 6
atomarius, 53
atomus, 24
atratulum, 8
atricolor, 12
atroapterus, 45
attalica, 21
atticus, 34
aubei, 33
auratus, 3
aureocruciatus, 56
aureolus, 21
auricapillus, 40
auricomus, 39
aurifer, 41
auropunctatus, 41
aurosus, 43
australis, 61
austriacus, 39
avellanae, 19
- B**
- bacchus, 3
balachowskyi, 42, 46
barbareae, 24
barbarus, 10, 17, 33, 65
barbatus, 65
barbicornis, 64
bardanae, 62
barnevillei, 29
baudii, 34
beccabungae, 17
beckeri, 48
bedeli, 20
bertrandi, 29
besseri, 30
betulae, 2, 15, 47
betuleti, 18
betulinus, 47
beuthini, 5
bewickianus, 32
bicastatus, 42
bifoveolatus, 56
bimaculata, 11
bipunctatus, 16
bipustulata, 18
bisignatus, 48
bisphaericus, 39
bisulcatus, 41
bivittatus, 21
bompari, 54
bonvouloiri, 34
borealis, 58
borraginis, 28
brachialis, 43
brachypterus, 39
brannani, 20
brevipes, 52
brevirostre, 5
brevirostris, 61, 63
brevis, 9, 46, 61
brisouti, 33
bruchoides, 30
brucki, 50
bructeri, 43
brunnipes, 5
brunnirostris, 11
buccinator, 61
- C**
- cachectus, 50
caeruleus, 2
caesius, 50, 56
caesus, 60
calcar, 18
calcaratus, 47
calceatus, 18
caliginosus, 66
callosus, 10
cambricus, 50
camelus, 33
campanulae, 17
campestris, 27
canaliculatus, 30
cancellatus, 40
candidatus, 60
candidum, 6
candidus, 60
canescens, 48, 54
capitatum, 36
capucinus, 21, 31, 65
carbonaria, 64
carceli, 41
cardui, 29, 62
carduorum, 5
carinatus, 56, 60, 66
carinicollis, 20, 59
carinirostris, 61
carinula, 49
carlinae, 62
carpathicus, 49
carpetanus, 55
carpini, 13
castaneus, 66
castor, 30
caucasicus, 33, 38
caudatus, 41, 54
cavifrons, 2
cedri, 52
cenchrus, 60
cerasi, 64
cerdo, 8
cervinus, 52
chalybaeus, 24
chamaeropsis, 13
chevrolati, 5, 40, 49, 55, 58, 67
chloris, 49
chlorizans, 12
chlorophanus, 25
chrysanthemi, 27
chrysocephalus, 52
chrysocomus, 45
cicatricosus, 59
cinctus, 26
cinerascens, 63
cinereus, 19, 60
cinnamomeus, 21, 50
circulatus, 17
circumvagus, 58
civis, 41
clairi, 40
clathratus, 60
claudicans, 23
claviceps, 48
clavipes, 42
cocciferae, 52
cochleariae, 25
coecus, 19, 41
coeruleocephalus, 3
coerulescens, 12
coeruleus, 3
collignensis, 23
collina, 18
columbinum, 7
comari, 30
comatus, 58
commari, 30
comosellus, 43
companyoi, 49
companyonis, 49
concinna, 37
concinnum, 65
confluens, 5, 52
confundatus, 19
conicirostris, 61
conicus, 63
conmaculata, 57
consentaneus, 38
conspersus, 13
consputus, 21, 28
constans, 57
constrictus, 25
contractus, 25
cordiger, 60
corniculatus, 40

coronatus, 65
 corruscus, 53
 corsicus, 19, 42
 corsosardous, 21
 corticalis, 10
 corvus, 43
 coryli, 3
 costatum, 67
 costatus, 65
 costipennis, 39
 costulatus, 49
 coyei, 40
 cracca, 8
 crassicornis, 45
 cratoscelis, 40
 cremieri, 46, 49
 cretaceum, 6
 creutzeri, 14
 cribricollis, 38, 62
 cribripennis, 3
 cribrosus, 38
 cribrum, 65
 crinipes, 38
 crinita, 58
 crinitarsis, 43
 crinitus, 51
 crispatus, 34
 cruentatum, 4
 crux, 15
 cucullatus, 56
 culinaris, 32
 cuneipennis, 32
 cunipes, 31
 cupreus, 2
 cuprifer, 22
 cuprirostris, 12
 cuprosparus, 43
 curtirostre, 4
 curtisii, 7
 curtulum, 7
 curvipes, 36
 curvirostre, 5
 cyanea, 67
 cyaneus, 19
 cylindricollis, 47, 50
 cylindricus, 31, 62
 cylindrithorax, 52
 cylindrus, 24, 32, 62
 cymophanus, 43
 cynarae, 61
 czwalinai, 23

D

dalmatinus, 38
 dauci, 58
 dawsoni, 29
 dealbatus, 60
 declivis, 59
 decoratus, 19
 deflexum, 65
 deformis, 34
 dejeani, 15
 denigrator, 44
 densatus, 39
 dentatus, 27

denticollis, 33
 denticulatus, 27
 dentipes, 8, 43
 depilis, 54
 depressicollis, 29
 depressirostris, 34
 desertus, 42
 difficile, 5
 difficilis, 40
 difforme, 8
 dilatatus, 35
 dilaticollis, 55
 dillwynii, 44
 diocletianus, 34
 dirus, 65
 discoideus, 51
 discors, 55
 dispar, 5, 36
 dissimile, 8
 distinctus, 14, 27
 dives, 43
 dolomitae, 38
 dorsalis, 15
 dromedarius, 34
 dryados, 26
 dubius, 43
 duinensis, 44
 duplicata, 64

E

ebeninum, 8
 ebeninus, 43
 echinatus, 33, 48
 edoughensis, 15
 elegans, 23, 49
 elegantulum, 9
 elegantulus, 38, 53, 63
 elephas, 15
 elevatus, 37, 56
 elongatula, 45
 elongatum, 6
 elongatus, 17, 32, 63
 emarginata, 60
 enucleator, 20
 epilobii, 29
 equestris, 39
 equiseti, 11
 eremicola, 39
 ericae, 27
 erinaceus, 36
 ervi, 7
 erysimi, 25
 erythroleucus, 26
 erythropterus, 3
 erythropus, 18, 42
 etruscus, 47
 exarata, 64
 excavatus, 64
 excisus, 54
 excoriatus, 60
 excursor, 56
 exiguum, 32
 exiguus, 29, 54
 exsculptus, 67

F

faber, 35
 fabrilis, 25
 fagi, 18, 42
 fairmairii, 49
 familiaris, 46
 fasciatus, 59
 ferdinandi, 46
 ferrugatus, 27, 61
 festucae, 11
 figuratus, 27
 filiformis, 63
 filirostre, 8
 filirostris, 15
 findelii, 66
 fissirostris, 55
 flabellipes, 37
 flavescens, 51, 54, 61
 flavicornis, 25, 64
 flavidus, 10
 flavifemoratus, 8
 flavipennis, 46
 flavipes, 16, 36
 flavomarginatus, 25
 flavus, 22
 floralis, 26
 florentina, 46
 foliorum, 18
 formaneki, 50
 formosus, 52
 forticornis, 37
 fortis, 41
 fossor, 41
 foveicollis, 10
 foveithorax, 46
 foveocollis, 59
 frater, 44
 fraxini, 14, 39
 frescati, 38
 frit, 23
 frontalis, 64
 frumentarium, 4
 fullo, 43, 54
 fulvago, 46
 fulvicorne, 36
 fulvicornis, 53
 fulvipes, 9, 43
 fulvirostre, 6
 fulvitaris, 25
 fulvus, 39
 furcatus, 62
 fuscipes, 42
 fuscirostre, 6
 fusciscapus, 56
 fuscocinerea, 57

G

gallicus, 42
 gemellatus, 51
 gemmatus, 43
 geniculatus, 38
 genistae, 6, 22
 geographicus, 28
 geranii, 29

germanicus, 3
 germanus, 65
 ghilianii, 41
 gibbifrons, 14
 gibbosus, 54
 gibbus, 51
 giganteus, 3
 giraffa, 41
 glabellus, 45
 glabratus, 43, 52, 54
 glabrostris, 65
 glandium, 15
 glaucus, 47, 59
 globatus, 56
 globosus, 58
 globulus, 9, 31, 36
 globus, 44
 gracilicollis, 7
 gracilicornis, 52
 gracilior, 56
 gracilis, 9, 32
 grajus, 39
 gramineus, 30
 graminicola, 54
 graminis, 17
 graminosus, 31
 grammicus, 60
 granarius, 10
 granicollis, 43
 grenieri, 25
 gressorius, 50
 griseomaculatus, 53
 griseopunctatus, 41, 42
 griseus, 50
 grouvellei, 41, 45
 guinardi, 54
 guttula, 38
 gyllenhalii, 7
 gyroscollis, 45

H

haematocephalus, 20
 haemorrhous, 24
 hampei, 49
 hanakii, 37
 harcyniae, 66
 hemisphaericus, 9
 hepaticus, 25
 herbarum, 18
 herbstii, 51
 heydeni, 36
 hirticornis, 46
 hirtipennis, 15
 hirtulus, 25
 hirtus, 48
 hispanicus, 58
 hispanus, 36
 hispida, 18
 hispidulus, 51
 hispidus, 48, 66
 histrio, 13
 holosericeum, 6
 hookerorum, 5
 hordei, 20
 horrens, 55

horridus, 29
hortorum, 19
hortulanus, 14
humeralis, 51
hungaricus, 41
huttoni, 32
hydrolapathi, 4
hypocrita, 33, 62
hystrix, 66

I

iaceae, 62
ictericus, 17
ictor, 16
idoneus, 61
ilicis, 26
immeritus, 36
immune, 8
impar, 53
impoticus, 44
impressicollis, 35
impressifrons, 53
impressiventris, 40
inaequalicollis, 61
incanus, 35
inconspectus, 30
indigena, 21
indigens, 48
infernalis, 44
infirmus, 16
inflatus, 38
inops, 51
insignis, 20
insubricus, 41
intermedium, 8
intermedius, 50
interpunctatus, 3
interruptus, 35
intersetosus, 25
interstitialis, 53
iridis, 63
irroratus, 19
isabellinus, 58

J

janthinus, 17
javetii, 28
joachim, 42
jota, 19
junceus, 22
juncii, 62
jungermanniae, 19
junix, 10
juvencus, 38

K

kahri, 52
kellneri, 14
kirschi, 20, 65
kollari, 39

L

labilis, 17
laesirostris, 35
laetus, 25
laevicolle, 9
laevigaticollis, 45
laevigatum, 5
laevigatus, 41
lamii, 26
lanigera, 18
lanigerum, 7
lanuginosum, 7
lanuginosus, 41
lapathi, 33
lareynii, 63
larraldi, 55
larvatus, 28
laterale, 36
lateralis, 52
laticollis, 13, 56
laticrobs, 45
laticusculus, 17
latus, 61
ledereri, 39
lemnae, 11
lemoroi, 4
lemur, 33
lentisci, 34
lentus, 51
lepidii, 12
lepidopterus, 39
lepidus, 51
leprieuri, 25
lethierryi, 52
leucaspis, 54
leucogaster, 30
leucogrammus, 45
leucopleura, 64
leucorhamma, 25
lignarius, 32
ligneus, 38
ligustici, 39
limbata, 12
limonii, 5
limosus, 23, 50
linariae, 18
linderi, 34
linearis, 31, 62
lineatulus, 22
lineatus, 51
littorea, 18
litura, 27
litrata, 49
lividipes, 51
longiceps, 3
longicollis, 14, 22
longimanus, 16
longipennis, 40
longipilis, 11, 47
longirostre, 6
longirostris, 17, 62
longiusculus, 17
longiventris, 43
longulus, 22, 35, 51
loniceriae, 19
loti, 8

lucasi, 20
luctuosus, 34
lugens, 40
lunatus, 34
lusca, 59
lusitanicus, 35
luteus, 42
lutosus, 10, 23
lutulentus, 23
lutulosus, 23
maculaalba, 28

M

macularius, 51
maculatus, 37
maculicornis, 48
maculipennis, 2
majalis, 16
malefidus, 43
malvae, 6
mannerheimii, 2
marchicum, 4
margaritaceus, 37
marginatus, 53
marginellus, 35
maritimus, 40, 55, 60
marmoratus, 10
marmota, 39
marqueti, 12, 55
mastix, 38
maurus, 19, 61
maxillosum, 48
mediatus, 46
medicaginis, 22
megerlei, 66
melanarium, 17
melanarius, 24
melancholica, 57
melanogrammum, 36
melanophthalmus, 16
melanostictus, 27
meles, 57
meliloti, 8, 22
memnonia, 64
meridionalis, 11, 17, 20, 41, 48, 59
merkli, 14
micans, 25, 54
micros, 17
miles, 57
miniatum, 4
minimum, 6
minutus, 3, 25
mirabilis, 27
misellus, 33
mixtus, 29, 58, 60, 61
moelleri, 27
moerens, 37
moestus, 44
moguntiacus, 24
molitor, 27
mollicomus, 49
mollis, 52
monachus, 65
montanus, 41, 47

montivagus, 40
morawitzi, 22
morbillosus, 60
morio, 13, 43
morulus, 41
mucronatus, 63
multicostatus, 38
multipunctatus, 41
muricatus, 10
murinus, 37, 49
muscorum, 34, 46, 65
mustela, 52
myagri, 63
myrmecophilus, 55

N

nana, 60
nanus, 3, 25
napi, 25
nasturtii, 27
navieresi, 34
neapolitanus, 38
nebulosum, 36
nebulosus, 16
necessaria, 46
neglectus, 41
nereis, 11
neta, 18
nicaeensis, 46
niger, 41
nigrans, 45
nigrinus, 29
nigrirostris, 57
nigritarse, 9
nigrivittis, 61
nigrosuturatus, 60
nitens, 4
nitidipennis, 64
nitidulus, 9
nitidus, 39
nivalis, 39
nobilis, 44
nodosus, 43
nodulosus, 23
notata, 11
notatus, 66
noui, 43
noxius, 45
nubilus, 39
nucum, 15
nudus, 41

O

obesus, 36
oblongulum, 65
oblongus, 47, 64, 66
obscurus, 37
obsidianus, 44
obsitus, 41
obsoletus, 29, 38, 51
obtusus, 56, 61
occalescens, 16
occidentalis, 60

ochraceus, 62
 ochreateus, 15
 ochroleucus, 62
 ochropus, 8
 offensus, 31
 olens, 14
 olivaceus, 2
 olivieri, 14, 55, 65
 ononicola, 9
 ononidis, 9
 ononis, 7
 onopordi, 5, 61
 opeticum, 8
 ophthalmicus, 52
 opulentus, 44
 orbicularis, 42
 oryzae, 10
 ovaliformis, 62
 ovalipennis, 40
 ovalis, 58
 ovatus, 42, 67
 ovulum, 49
 oxalidis, 59

P

palliatu, 55
 pallida, 9
 pallidactylus, 25
 pallidicornis, 28
 pallidipennis, 31
 pallidulus, 9
 pallidus, 47
 pallipes, 6, 25
 palumbarius, 59
 palustris, 65
 pancaucasicus, 35
 paradoxus, 53
 parallelepipedus, 31
 parallelus, 22, 53
 paraplecticus, 63
 partialis, 39
 parvicollis, 38
 parvulus, 25, 33
 pascuorum, 17
 pastinacae, 57
 pauper, 43
 pauxillus, 3, 44
 pavidum, 7
 pedemontanus, 44
 pedicularius, 13
 pellitus, 15, 47
 pellucens, 21
 pellucidus, 49
 penetrans, 5
 penicillus, 20
 perdix, 44
 peregrinus, 28, 44
 pericarpus, 31
 perpendicularis, 31
 perrisii, 4
 petro, 23
 peyrissaci, 41
 phalerata, 21
 philanthus, 59
 phlegmatica, 64
 phyllocola, 13
 piceae, 66
 piceus, 11, 64
 picicornis, 12
 picimanus, 42
 picirostris, 22
 picitarsis, 26
 picturata, 12
 picus, 54
 pigra, 59
 pilicornis, 47
 pillumus, 20
 pilosellus, 27
 pilosulus, 54
 pilosus, 19, 53
 pilumnus, 20
 pinastri, 42
 pineti, 14
 pini, 66
 pirazzolii, 53
 pisi, 7
 plagiatum, 36
 plagiella, 18
 planatus, 31
 planifrons, 53
 planithorax, 39
 plantaginis, 57
 plantaris, 13
 plantarum, 17
 planus, 62
 plasoni, 35
 platalea, 7
 platysoma, 46
 pleurostigma, 24
 plicatus, 10, 35
 plumbeus, 36
 plumipes, 38
 politus, 2, 43
 pollinarius, 28
 pollinis, 61
 polycoccus, 40
 polylineatus, 22
 pomaceus, 47
 pomonae, 8
 pomorum, 13
 populeti, 40
 populi, 2, 18
 populicola, 18
 porcatus, 32, 39
 porcellus, 35, 36, 57
 posthumus, 26
 postica, 9, 57
 potentillae, 21
 pradiéri, 10
 praeustus, 2
 prasinus, 53
 pratensis, 19
 primita, 21
 prodigus, 36
 prolixus, 44
 proximus, 40
 pseudopauper, 43
 pseudovittatus, 61
 pterygomalis, 53
 ptinoides, 33
 phalerata, 21
 pubens, 42
 puberulus, 37

pubescens, 2, 7, 35
 pubicollis, 29
 pulchellus, 14, 53
 pulicarius, 19
 pullus, 19
 pulverulentus, 38, 62
 pulvinatus, 26
 pumilio, 26
 pumilus, 22
 punctaticollis, 33
 punctatulus, 32
 puncticollis, 26, 51
 punctiger, 7, 27
 punctiventris, 59, 62
 punctumalbum, 30
 pupillatus, 40
 pusillus, 20, 22
 pyraeter, 17
 pyrenaeum, 65
 pyrenaeus, 42
 pyri, 13, 47
 pyriformis, 36
 pyrrhoceras, 15
 pyrrhodactyla, 21
 pyrrhorhynchus, 26

Q

quadraticollis, 13
 quadricorniger, 30
 quadricornis, 30
 quadrimaculatus, 28
 quadrinodosus, 30
 quadrinotatus, 65
 quadrisignatus, 48
 quadrituberculatus, 30
 quadrivirgata, 9
 quedenfeldtii, 19
 querceti, 26
 quercicola, 29
 quercus, 19
 quinquepunctatus, 22

R

radiolus, 5
 rana, 26
 raphani, 28
 raucus, 39
 ravouxi, 32
 reflexum, 7
 reflexus, 32
 regensteinense, 50
 regensteinensis, 50
 repandus, 58
 repletus, 42
 retusum, 36
 revelieri, 4, 23
 rhacusensis, 42
 rhinocylloides, 63
 rinderae, 24
 roberti, 26
 roboretanus, 47
 roboris, 13

rostellum, 17
 rotundatus, 37, 58
 rotundicollis, 45
 rotundus, 44
 rubens, 4
 ruber, 26
 rubi, 14, 59
 rubicundus, 26, 62
 rubidus, 15
 rubiginosus, 27
 rubricus, 10
 rubrirostris, 16
 rufa, 64
 rufatus, 16
 rufescens, 6
 ruficornis, 29, 64
 rufipes, 36, 37, 41
 rufirostre, 6
 rufirostris, 22
 rufitarsis, 19
 rufulum, 6
 rufulus, 16, 29
 rufus, 14
 rugicolle, 4
 rugifrons, 44
 rugipennis, 41
 rugosostriatus, 45
 rugosus, 2, 44
 rugulosus, 27
 rumicis, 57
 rusci, 18
 rustica, 46
 rusticanus, 62
 rusticus, 26

S

sabulosus, 45
 salicicola, 54
 salicinus, 16
 salicis, 16, 19
 salicivorus, 15
 salicorniae, 29
 sanguineum, 4
 sanguineus, 63
 sanguisorbae, 2
 sareptanum, 5
 scaber, 40, 56
 scabricollis, 66
 scabriculus, 56
 scabrosus, 65
 scalptum, 5
 scanicus, 16
 schaeferi, 60
 schneideri, 22
 schoenherri, 14, 16, 26, 46
 scirpi, 11
 scirrhosus, 11
 scitulus, 50
 scitus, 40
 scolopacea, 12
 scolopax, 63
 scolymi, 57, 61
 scopularis, 43
 scortillum, 24
 scrobifer, 65

- scrobipennis, 65
scrophulariae, 14
sculpturatum, 48
scutellare, 8
scutellaris, 10
sedi, 4
segnis, 60
sellae, 42
sellatus, 20, 31, 54
seminiger, 2
seminulum, 37
semirufus, 18
semivittatum, 6
senex, 46
seniculus, 7
senilis, 60
sensitivus, 45
sequensi, 18
seriata, 21
seriatosetosulum, 7
sericeus, 2, 52
serratulae, 61
serratus, 31
serripes, 48
setifrons, 52
setiger, 20, 48
setosus, 17, 38
setulipennis, 33
shevnini, 19
signata, 21
signatipennis, 44
signatus, 29
simile, 6
simum, 5
singularis, 40
sinuatus, 48
sisymbrii, 29
smaragdinus, 50
smaragdulus, 53
socius, 55
sodalis, 20
solani, 14
soricinus, 28
spadix, 32
sparsus, 19, 54
sparsutus, 20
spartii, 60
spencii, 7
sphaeroides, 46
spilotus, 14
spinimanum, 48
spinimanus, 56
spinosus, 55
splendidulus, 58
spoliata, 12
squalidus, 31, 50
squamifer, 38
squamigerum, 6
squamosus, 20, 37, 39, 52
squamulata, 45, 49
squamulatus, 22
stableaui, 35
statua, 33
stephensi, 22
stierlini, 34
stigma, 19
stolidum, 5
stomachosus, 42
strabus, 61
strangulatus, 32
striatella, 60
striatellus, 51
striatopunctatus, 11
striatulus, 22
striatum, 8
stricta, 64
stricticollis, 42
strigifrons, 38
strigirostris, 44
sturnus, 62
styriacus, 56
suavis, 58
subaeneus, 19
subcarinatus, 23
subdentatus, 40
subfasciatus, 19
subglaber, 42
subhirtus, 19
submuricata, 32
subnudus, 48, 51
suborbicularis, 61
substriatus, 42
subsulcatus, 35
subulatus, 61
subvestitus, 41
suetus, 62
sulcatus, 39
sulcicollis, 26
sulcifrons, 5, 48, 51
sulfurifer, 42
sulphureus, 22
suratus, 16
sus, 36
suspiciosa, 57
suturalis, 28, 51
suturella, 46
symphiti, 28
syriacus, 61
syrites, 26
- T**
- t-album, 12, 28
taeniatus, 16, 48
tamarisci, 4, 9, 58
tataricus, 19
telonensis, 15
tempestivus, 24
tenebricosus, 42
tener, 39
tenex, 49
tenue, 8
tenuis, 51
tereticollis, 54
terminatus, 24
tessellatus, 54
tessulatus, 52
testaceus, 18
testatus, 60
teter, 34
tetra, 18
tetrastigma, 9
thalassinus, 47
thapsicola, 18
thoracicus, 22
tibialis, 22, 51, 53
tigrinus, 60
tischeri, 66
tomentosus, 3, 19, 22
topiarius, 29
tortrix, 16
tournieri, 43
transversealbofasciatus, 26
transversovittatus, 64
transversus, 9
tremulae, 16
triangulum, 27
trifasciatus, 26
trifolii, 9
triguttatus, 35
trilineatus, 57
trimaculatus, 27
trisinatus, 28
tristis, 2, 39, 40
trisulcatus, 60
trivittatus, 63
truncatus, 45
truncorum, 32
tuberculatus, 34
tuberculifer, 47
tuberculosis, 14
tubericolle, 36
tubicen, 2
tubiferum, 4
tubulus, 24
tumefactus, 41
turbatus, 59
turbatus, 62
typhae, 26
tyrrhenicum, 6
- U**
- uliciperda, 6
ulicis, 6
ulmi, 14
umbellatarum, 63
umbilicatus, 37
uncinatus, 40
uncipes, 32
undatus, 10
undulatus, 14
ungarica, 3
unguiculare, 67
unipunctatus, 37
urens, 29
ursus, 61
urticae, 47
urticarium, 6
- V**
- valida, 33
validirostris, 16, 66
validum, 5
validus, 10, 24
variabilis, 35
varians, 13
variata, 21
variegatus, 35, 50, 53
variolosus, 4
varipes, 9
varius, 40, 46
velatum, 4
velutinus, 39
velutus, 30
venosus, 15
ventricosus, 56
venusta, 57
venustus, 40
verecundus, 51
veronicae, 17
verruca, 37
verrucatus, 27
verrucipennis, 64
verrucosus, 34
vespertinus, 47
vestita, 18
veterator, 40
vibex, 61
viciae, 7, 57
vicinum, 6
vicinus, 56
viduatus, 29
viennensis, 59
vilis, 63
villae, 13
villosopunctatus, 41
villosulum, 17
villosulus, 16, 48
villosus, 15
violaceum, 4
virens, 8
virideaeris, 48
viridicinctus, 53
viridicollis, 47
viridis, 54
viscariae, 21
vittata, 21
vittatus, 50, 61
vorax, 7
vulpes, 62
- W**
- waltoni, 30, 55
waterhousei, 51
wenckeri, 4, 58
- X**
- xylostei, 19
- Z**
- zoilus, 58

Sous-espèces

- | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| acaloides, 29 | fuscirostre, 6 | melanogrammum, 36 | rufatus, 16 |
| aeratus, 53 | globosus, 58 | meteoricus, 33 | schaeferi, 51 |
| analis, 12 | grandicollis, 20 | morio, 43 | schoenherri, 14 |
| araneiformis, 49 | guttula, 38 | nubeculosa, 59 | semivittatum, 6 |
| arcticus, 42 | hispanus, 36 | nubilus, 39 | sensu, 31 |
| astragali, 9 | impressicollis, 35 | obscurus, 37 | serratus, 31 |
| ater, 32 | indigenus, 48 | obsoletus, 51 | simile, 6 |
| borealis, 58 | irroratus, 19 | ochreatus, 15 | spadix, 32 |
| brevis, 9 | juvencus, 38 | onopordi, 5 | stableaui, 35 |
| caeruleus, 2 | knechti, 34 | ovatus, 42 | stricticollis, 42 |
| caliginosus, 66 | laesirostris, 35 | palustris, 65 | sulcifrons, 48 |
| candidum, 6 | latipennis, 45 | pellucidus, 49 | tener, 39 |
| caullei, 5 | lemur, 33 | peninsularis, 33 | triguttatus, 35 |
| coecus, 41 | ligneus, 38 | pivicornis, 12 | umbilicatus, 37 |
| coerulescens, 12 | lividipes, 51 | pini, 66 | urticarium, 6 |
| crassicornis, 45 | longicollis, 14 | pradieri, 10 | venosus, 15 |
| cuprirostris, 12 | longirostris, 17 | pulchellus, 53 | vesulianus, 42 |
| cylindricollis, 50 | macularius, 51 | pyrenaeus, 42 | violaceum, 4 |
| depressirostris, 34 | magnanoi, 48 | quadraticollis, 13 | viridis, 54 |
| fagi, 18 | marmoratus, 10 | quinquepunctatus, 22 | waterhousei, 51 |
| fulvipes, 9 | marqueti, 12 | radiolus, 5 | |

Recommandations aux auteurs

La revue *Invertébrés Armoricaïns* publie des articles originaux, des articles de synthèses et des notes consacrés à l'étude de la faune des invertébrés armoricaïns sous tous ses aspects : systématique, biologie, écologie, biogéographie, biodiversité, gestion conservatoire de la faune, gestion des milieux ...

Des numéros spéciaux sont consacrés à un thème particulier, à la publication de comptes rendus de colloques ou de résultats d'études. Le mode opératoire lié à leur parution est spécifique.

Sa publication est aperiodique.

Les articles publiés dans *Invertébrés Armoricaïns* n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Il est toutefois recommandé à chaque auteur de soumettre pour lecture son article à un collègue-référent. Si ce n'est pas le cas, le comité de rédaction pourra soumettre celui-ci à un spécialiste de son réseau.

Les articles envoyés doivent être des originaux.

S'ils ont déjà été publiés dans une autre revue, ceci doit être signalé dès l'envoi initial. Le comité de rédaction se donne le droit de refuser.

Le gestionnaire de la Base de données du GRECIA peut être contacté par les auteurs en amont pour la consultation de données ou la réalisation de cartographies : jb.lehebel-peron@gretia.org.

PRESENTATION DES MANUSCRITS

Textes

Les articles destinés à la revue peuvent être fournis sous forme de manuscrits lisibles ou de textes dactylographiés. La préférence, pour des questions de rapidité de mise en page, demeure l'un des formats informatiques suivants (.txt ou .rtf ou à défaut .doc.). Dans ce cas, les textes ne seront pas mis en page (pas de puces, de formats automatiques de mise en pages ou autres formats spéciaux, de renvois de pages, de caractères gras, de mots en majuscule...). La première mention du nom scientifique d'un taxon sera suivie du nom du descripteur et de l'année de description.

Les nom, prénom, adresse postale et, si possible, électronique de l'auteur (ou de chaque auteur) seront spécifiés.

A l'exception des notes courtes d'une page, chaque article comportera un résumé en français, et, si possible en anglais, ainsi qu'une courte liste de mots clés (jusqu'à 5).

Il n'existe aucune limite de taille pour les articles, car selon celle-ci, ils pourront être orientés vers un numéro multithématique ou vers un numéro spécial.

Tableaux et illustrations

Dans le cas d'une mise en page complexe (cas des clés de détermination), les auteurs pourront joindre, en plus du texte brut, le texte intégral mis en page, incluant les tableaux et graphiques, au mieux en PDF, ou sur Open office (.odt, .doc), à défaut sur Word (.doc).

Tous les éléments à insérer dans le texte doivent être enregistrés séparément, numérotés et appelés dans le texte sous ce nom, et enfin accompagnés de leur légende.

Les graphiques et schémas seront fournis

- d'une part, dans leurs fichiers au format d'origine (le logiciel utilisé sera indiqué : PSD, XCF...).

- d'autre part, enregistrés dans un format "image" (Tiff, Jpeg, PNG...) sans compression.

La résolution minimale des illustrations doit être de 300 dpi.

Références bibliographiques

La bibliographie doit être présentée de la façon suivante :

CHEVIN H., 1981a.- Les Hyménoptères Symphytes ou Tenthredes. Morphologie, biologie, classification, répartition. *Penn ar Bed*, **13** (105) : 74-86.

DERJANSCHI V. & PERICART J., 1962.- *Hémiptères Pentatomoïdeas euro-méditerranéens. Volume 1 : généralités, systématique : première partie*. Faune de France 90. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris. 494 p.

FOUILLET P., 1992.- L'entomofaune des dunes et des zones humides de la réserve naturelle de la Mare de Vauville : espèces remarquables et mesures à intégrer à la gestion du site. Rapport d'étude OPIE / GONm. 38 p.

ROUALT E., 2014.- "Curculionidae Curculioninae Trachyphloeini", in Tronquet M. (coord.), *Catalogue des Coléoptères de France*, Association Roussillonnaise d'Entomologie, p. 710-711.

SEMERIA Y. & BERLAND L., 1988.- *Atlas des névroptères de France et d'Europe*. Société nouvelle des éditions Boubée, Paris. 190 p.

Les dates seront présentées ainsi : 23-VIII-2009.

Références de sites internet

Nom du site - « Titre » [En ligne] Adresse du site (date de dernière mise à jour ou date de consultation).

SOUSSION D'UN MANUSCRIT ET DELAI DE PUBLICATION

Chaque article sera préférentiellement et préalablement soumis par courrier électronique (avec détection anti-virale préalable) à : secretariat@gretia.org. Si un accès par courrier électronique est impossible, ou si les fichiers annexés sont trop volumineux, les fichiers peuvent être gravés sur un CD et envoyés à :

GRETIA (Revue)
Bâtiment 25
Campus de Beaulieu
35042 Rennes cedex

Les auteurs reçoivent un accusé de réception par courrier électronique ou postal. Les épreuves sont renvoyées par courrier électronique au format PDF.

Invertébrés armoricaïns étant une revue aperiodique, un nouveau numéro est publié lorsque que les articles soumis sont assez nombreux. Aucun délai de publication ne peut être donné mais le comité de rédaction s'engage à ce qu'il soit le plus réduit possible.

TIRES-A-PART

Les tirés-à-part (TAP) des articles sont fournis à l'auteur, au format PDF, de préférence par courriel et un exemplaire papier du numéro est envoyé.

Chaque auteur envoyant un article s'engage tacitement à accepter que celui-ci puisse être mis en ligne sur le site du GRECIA, ceci dans un délai d'au minimum six mois après sa publication.

COMMUNICATION DES DONNEES /IMAGES

Une donnée publiée est une donnée vivante ! Afin de favoriser la transmission des connaissances pour laquelle nous œuvrons, nous demandons aux auteurs de communiquer, les données qui ont été nécessaires à la rédaction de leur article publié dans « *Invertébrés armoricaïns* ». En cas de données sensibles, un statut spécifique pourra leur être donné. Ces données publiques détaillées seront transmises sous forme de tableur au gestionnaire de la base de données de l'association :

jb.lehebel-peron@gretia.org

