





# ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE EN BRETAGNE



- Évolution\* du trait de côte**
- Accrétion supérieure à 0,5 m/an
  - Accrétion inférieure à 0,5 m/an
  - Érosion inférieure à 0,5 m/an
  - Érosion supérieure à 0,5 m/an

\* Classe «non perceptible» non affichée sur la carte pour cause de lisibilité.



L'indicateur national de l'érosion côtière est basé sur les taux de l'évolution passée du trait de côte, observée sur ortho-photographies entre deux dates éloignées de plusieurs décennies.  
Les prises de vues aériennes sont issues :  
- pour les plus anciennes, des archives traitées par l'Ifremer, de la BD Ortho historique de l'IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,  
- pour les plus récentes, de l'Ortholittoral V2 du MEDDE sur la période 2011-2014 et de la BD Ortho de l'IGN sur la période 2005-2012.

Données : issue des données produites pour l'indicateur national d'érosion côtière, dans le cadre de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, Cerema et MEDDE, 2016  
Fonds : © IGN BDCARTO © 2013

Réalisation : Observatoire de l'environnement en Bretagne - Mars 2020

En savoir plus : [bretagne-environnement.fr](http://bretagne-environnement.fr)